




	硬瘫/痉挛性瘫痪	软瘫/弛缓性瘫痪
栗子	内囊出血	脊髓灰质炎
病变部位	上运动神经元及其发出的纤维	下运动神经元及其发出的纤维
肌电图看周围神经(只能展示软瘫)	正常	异常
肌力	减弱	减弱
肌张力/肌紧张（牵张反射（深反射））	增强（失去高位中枢抑制）	减弱（反射弧出问题）
腱反射	增强	减弱
病理征	阳性（原始反射被释放）	阴性
浅反射	减弱（不能易化浅反射）	减弱
肌萎缩 N营养作用	不明显	明显
麻痹范围	广泛	局限

大脑喜欢肤浅,不喜欢深奥 大脑 易化→浅反射 抑制→深反射

1.2014N118-120 A 男性，29 岁，从 3 楼跌落，臀部着地，双下肢完全不能活动，双侧腹股沟平面感觉丧失，尿潴留。

广→脊髓 T12-3=第9胸椎

118.患者最可能的诊断是

A.第 4 胸椎骨折

B.第 5 腰椎骨折

C.第 10 胸椎骨折 选最接近的

D.骨盆骨折

119.不必立即采取的检查项目是

A.MRI 检查

B.心电图及血气分析检查

C.下肢肌电图检查 在恢复过程中看外周神经传导速度(软瘫)，急性期时没有什么价值

D.X 线检查

120.应采取的最佳治疗措施是 骨折导致脊髓受累一定要手术

A.高压氧治疗

B.给予维生素 B 及激素药物治疗

①骨折脱位压到了脊髓
②碎骨片进到椎管压到了脊髓
③活动性出血压到了脊髓

骨折不一定会引起脊髓损伤

Jefferson骨折:C1寰椎前后弓双侧骨折,骨折块多向椎管四周移位

