（三）肱骨近端骨折

1.多见于中老年骨质疏松，好发于外科颈（肱骨大小结节移行为肱骨干的交界处）

易发生于中老年骨质疏松:肱骨近端骨折、股骨近端骨折(如股骨颈骨折、股骨转子间骨折)、桡骨远端骨折

2.Neer 分型标准：头、干、大结节、小结节的移位程度（**移位＞1cm 或成角＞45°**）你老公近






图 61-10　肱骨近端骨折的 Neer 分型
（1）一部分骨折　（2）两部分骨折　（3）三部分骨折　（4）四部分骨折





3.合并损伤：胸长神经（翼状肩）、腋神经（方肩）、腋血管（咦胸长的叶芳）


4.治疗（1 无 2 轻三角巾、2 重 3 非 4 内定）

一般:手法复位外固定
特殊:肱骨近端的Neer重度II型、III型、非老年IV型:切开复位内固定

Neer I型（无移位）、轻度移位的II型	三角巾悬吊
Neer 重度II型、III型、非老年IV型	切开复位+内固定
老年 Neer IV型	人工肱骨头置换术

老年人的四肢(尤其是下肢)骨折后,卧床时间长,并发症多,建议直接做手术

（四）肱骨干骨折



1.可损伤桡神经（肱骨干中下 1/3 后外侧有桡神经沟）垂腕、垂指

桡神经损伤考点:①肱骨干骨折(最常考)②肱骨髁上骨折③肘关节问题(比如脱位)
桡骨头(肘关节)脱位仅损伤深支(仅有伸指、l指外展障碍)

2.移位和治疗（金钱缘尽：近折端-前、远折端-近，三角肌内、三角肌外）

移位	近折端	远折端	治疗（远找近折端对接）
骨折线 在三角肌止点以上	内、前 （胸大肌牵拉）	外、近端 （三角肌、肱二头肌牵拉）	内收位牵引
骨折线 在三角肌止点以下	外、前 （三角肌牵拉）	近端 （肱二头肌牵拉）	外展位牵引




图 61-11　肱骨干骨折的移位
（1）骨折在三角肌止点以上　（2）骨折在三角肌止点以下

