（六）肘关节脱位

尺骨鹰嘴向后突出

①后脱位多见，**肘后三角关系改变**（特征），弹性固定，肘后空虚感，肘向后突出处于半屈位

②环抱式手法复位+外固定（长臂石膏托固定+三角巾悬吊）






图 61-18　肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形







图 61-19　肘关节后脱位的复位方法


图 61-20　手法复位后石膏托固定



（七）桡骨头半脱位


桡骨头与肱骨髁间隙增大→环状韧带嵌顿进来

①多见于**＜5 岁**（环状韧带没有发育好），**手、腕被动向上牵拉史**，X 线唯一**阴性**的脱位

②**不用麻醉**即手法复位，复位后**不需固定**（饶了我不、三个不）

X线一般看不到韧带











图 61-21　桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处，将前臂作旋后及旋前活动。

（八）前臂骨折和脱位

①盖氏 **G**aleazzi 骨折：**桡**骨干**下** 1/3 **骨折+尺骨头脱位**（桡下痒痒）

②孟氏 **M**onteggia 骨折：**尺**骨干**上** 1/3 **骨折+桡骨头脱位**，先复位桡骨（痴人说梦）

这个X线适合考试



靠上面大一点:尺骨
靠下面大一点:桡骨



盖氏Galeazzi骨折



孟氏Monteggia骨折