一般达到功能复位即可,达到解剖复位一般要手术(会对骨膜造成损伤,影响骨折愈合)

③前臂双骨折的治疗 ttsx 前臂一般都是双骨折(两根骨头间有骨间膜)

需**解剖复位**，注意防止畸形和旋转	**对位对线均好** 前臂的旋转功能必须解剖复位才能达到
先复位稳定性骨折	稳定性骨折如横形骨折　尺骨上端大,表浅
均为不稳定性骨折（如斜形或螺旋形）	发生在**下**段**先复位桡骨**、**中上**段**先复位尺骨**（挠下痒痒）
功能锻炼	术后 2 周开始手指屈伸、腕关节活动，4 周开始肘、肩关节活动，**8-10 周** X 线证实骨折已愈合才进行前臂**旋转功能锻炼**（九转大肠）

桡骨下端大
先搞容易的,谁大就容易搞





图 61-22　尺、桡骨骨干双骨折的类型
（1）由直接暴力引起的骨折　（2）由间接暴力引起的骨折　（3）由旋转暴力引起的骨折



尺桡骨均骨折伴成角畸形,桡骨粉碎
双骨折才容易出现成角畸形




图 61-25　尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

（九）桡骨远端骨折

1.多见于**中老年**骨质疏松



10岁以下小孩,力量传到桡骨远端不会断,传到肱骨髁上断了,因为有30度-50度的前倾角



2.**伸直型/Colles 骨折常见** 无论伸直型/屈曲型均向桡侧(薄弱)移位

①手**掌**着地，**远折端向桡侧、背侧移位**，近折端向掌侧移位，可伴下尺桡关节脱位、尺骨茎突骨折

②正位呈**枪刺刀**畸形（正面拼刺刀）、侧位呈**餐叉/银叉**畸形 远折端往背面移位所致

③手法复位+外固定（屈腕尺偏位石膏）与移位方向相反







