


图 61-27　伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
（1）“银叉”畸形　（2）“刺刀样”畸形




图 61-28　伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

3.**屈曲型/Smith** 骨折：手**背**着地，**远**折端向**桡**侧、**掌**侧移位，近折端向背侧移位
（桡侧薄弱，come 的手背离得远、stop 的手掌离得远）

4.**Barton** 骨折
①桡骨远端**关节面骨折伴腕关节脱位**（bar ton）像掰手腕的声音
②表现**多数类似 Colles 骨折**、少数类似 Smith 骨折（反 Barton 骨折）



图 61-31　桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（Barton 骨折）骨折断端的典型移位
（1）掌侧 Barton 骨折　（2）背侧 Barton 骨折



图 61-29　伸直型桡骨远端骨折的手法复位

注意：手掌着地时
＜10 岁：伸直型肱骨髁上骨折（远折端向后移位）
中老年：伸直型桡骨远端骨折（远折端向背侧移位）
（力量传导至桡骨远端-老年人受不了；再传导至肱骨远端-30-50°的前倾角是肱骨髁上骨折的解剖基础）

二、下肢骨折和关节脱位

（一）髋关节脱位

股骨头直接怼向髋臼,容易大失血

1.后脱位多见；中心脱位最凶险（可合并腹膜后血肿、休克）　一般不是摔跤导致,因为髋关节周围结构比较牢固,所以很严重损伤(如车祸、高处坠落)才出现髋关节脱位

