
（二）股骨颈骨折

1.多见于**中老年**骨质疏松 肱骨近端、桡骨远端、股骨近端





股骨头最重要的血供:骺外侧动脉(旋股内侧动脉的分支)
股骨头缺血坏死:①外伤:股骨颈骨折、髋关节脱位②内伤:GC地易建联

2.分型

①骨折线部位：**头下型（最重）**、经颈型、基底型（最轻）
血供中断最严重




图 63-9　股骨颈骨折按骨折部位的分类





图 63-10　股骨颈骨折按骨折线方向分类
（1）内收型骨折　（2）外展型骨折

②**Pauwels 角**（骨折线与髂嵴夹角）外面泡小三、内人打我

外展型：<30°（稳定）

内收型：>50°（不稳定）



③**移位程度（Garden）**

I不完全骨折、或嵌插骨折

II完全骨折**不移位**

III完全骨折**部分移位**但股骨颈与股骨头有接触（最常见）

IV完全骨折**完全移位**




图 63-11　股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型
（1）Ⅰ型：不完全骨折或嵌插骨折　（2）Ⅱ型：无移位的完全骨折　（3）Ⅲ型：完全骨折，部分移位　（4）Ⅳ型：完全骨折，完全移位

VS前倾角(肱骨干和肱骨髁形成的):30度-50度

④**颈干角/内倾角**（股骨颈与股骨干轴线夹角）小医大四

髋内翻：≤110°

髋外翻：≥140°




图 63-5　股骨的颈干角




图 63-6　股骨颈前倾角

