（四）股骨干骨折

1.移位：中 1/3 向外成角，下 1/3 近折端向前、远折端向后（外面的金丝猴、喜欢金钱的猿猴）




图 63-18　股骨干不同部位骨折移位方向
（1）股骨干上 1/3 骨折　（2）股骨干中 1/3 骨折　（3）股骨干下 1/3 骨折




图 63-19　儿童的垂直悬吊皮肤牵引

2.合并损伤

①脂肪栓塞（富含黄骨髓）、休克　骨盆骨折、髋关节中心脱位、股骨干骨折：出血量大


②下 1/3 骨折：腘血管、胫神经、腓总神经（坐骨神经腘窝平面分支）、骨筋膜室综合征



3.治疗

＜3 岁：垂直悬吊皮牵引（儿童禁止骨牵引）。若牵引力过大可致骨折延迟愈合或不愈合（损伤骨骺，影响生长）

＞3 岁：手术



（五）髌骨骨折

1.**直接**暴力致**粉碎**性骨折；**间接**暴力致**横形**骨折（股四头肌收缩）









2.可合并交叉韧带、侧副韧带、半月板等损伤

3.治疗（均在功能位固定（如手外伤-握球位，髌骨骨折-伸直位））

①无移位、有移位＜0.5cm 保守。膝关节**伸直位**固定（髌骨：伸膝作用）

②若严重粉碎骨折无法恢复软骨面完整→摘除髌骨

（六）胫腓骨骨折

1.好发部位

①腓骨骨折：腓骨**颈**

②胫骨干骨折：**三棱形和四边形交界处（胫骨干中下 1/3）**（应力交汇处）

