2.合并损伤

（1）腓骨颈骨折：损伤**腓总神经**

运动障碍:外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足,跨阈步态
感觉障碍:小腿前外侧、足背内

（2）胫骨骨折

①**感染（多为开放性骨折）**胫骨位置表浅

②**创伤性关节炎** 胫骨平台骨折属于关节内骨折

③**上 1/3**→下肢**严重缺血坏死**、**骨筋膜室综合征**（胫后A）

中 1/3→**骨筋膜室综合征**、远端血供减弱致**延迟愈合或不愈合**

下 1/3→远端血供减弱致**延迟愈合或不愈合**，螺旋形骨折常伴后踝骨折

无肌肉附着→无骨筋膜室综合征

3.开放性小腿双骨折的治疗

①时间短污染轻：清创+内固定 牢靠

②时间长污染重：清创+外固定架外固定




图 63-37 胫腓骨骨折类型

（1）横形骨折 （2）短斜形骨折 （3）粉碎性骨折 （4）长斜形骨折 （5）螺旋形骨折 （6）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（正位） （7）胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折（侧位）

（七）踝部扭伤

1.踝关节的韧带

①内侧副韧带/三角韧带：最强

②外侧副韧带：最薄弱 崴脚易往外崴


③下胫腓韧带/胫腓横韧带

2.**跖屈位**易发生损伤

下楼梯时易崴脚

3.急性期立即冷敷 减少局部肿胀





（八）踝部骨折

关节内骨折害怕创伤性关节炎,建议手术

三踝骨折的治疗：切开复位+内固定（内螺外板 43 后）

①内踝螺钉内固定

②外踝接骨板内固定 钢板也是对的

③影响胫骨 1/4-1/3 关节面的后踝骨折也要内固定




图 63-41 双踝骨折切开复位内固定术

（九）跟骨骨折

跟骨结节关节角/Bohler 角改变（宝贝跟我走）




图 63-45 跟骨结节关节角

小结：请臭宝们在讲义最开始的图中，标注不同骨折、脱位的治疗方法