真题解析·四肢骨折和脱位

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N88 A 儿童肘部外伤后，鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠的体征是
   A.畸形
   B.肿胀明显
   C.活动明显受限
   D.肘后三角关系改变

2. 2014N149-150 B
   A.Barton 骨折 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位
   B.Smith 骨折 屈曲型桡骨远端骨折
   C.Colles 骨折 伸直型桡骨远端骨折
   D.Galeazzi 骨折
   桡骨远端屈曲型骨折，骨折近端向背侧移位，远端向掌侧、桡侧移位，称之为 come的手背离得远,stop的手掌离得远
   桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位，称之为 挠下痒痒

3. 2016N149-150 B
   A.＞110°
   B.≤110°
   C.≥140°
   D.＜140°
   髋内翻的颈干角范围是 小医大四
   髋外翻的颈干角范围是

4. 2016N179 X 髌骨骨折的治疗原则有
   A.尽可能地保留髌骨
   B.解剖复位，保持关节面平整 关节内骨折怕创伤性关节炎,所以要追求解剖复位
   C.稳定固定情况下早期活动 所有骨折都应这样,前臂双骨折也是如此,8-10周X线证实骨折已愈合才进行前臂旋转功能锻炼
   D.屈曲位膝关节固定 功能位-伸直位

若年龄为90岁→预期寿命较短→半髋/股骨头置换术
若年龄为70岁→预期寿命较长,有移位→全髋置换术

5. 2017N65 A 男性，80 岁，摔倒后致右髋部疼痛 2 天，平素体健。X 线检查示右股骨颈头下型骨折，有移位。该患者最合适的治疗方法是
   A.切开复位内固定
   B.人工股骨头置换术
   C.皮牵引
   D.卧床休息，穿防旋转鞋




图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

6. 2018N164 X 关于肱骨外科颈骨折，下列说法正确的有
   A.多见于中老年人 肱骨近端、桡骨远端、股骨近端
   B.可合并血管神经损伤
   C.可合并肱骨头碎裂骨折

答案:1-6 D BD BC ABC B ABC