随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 骨科疾病

核心精讲·骨折概论

（性感认识：把握特点和指征，与各论结合复习）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原因

e.g车祸:小腿被撞到,小腿胫腓骨骨折

①直接暴力：胫骨干骨折、**髌骨粉碎**性骨折等

②间接暴力（受伤部位远处）：肱骨髁上骨折、桡骨远端骨折、**髌骨横形**骨折、髂前上棘撕脱骨折等

娃娃　力量传过去　中老年　股四头肌强烈收缩　抢篮板

③病理骨折：骨骼本身疾病（**骨髓炎、骨肿瘤等**）受轻微外力发生骨折

④疲劳/应力/行军骨折：反复轻微外力致特定部位因积累性劳损而骨折，好发于**腓骨干下 1/3、第 2 和 3 跖骨、肋骨**（123 妃子累）。疲劳骨折早期诊断用 **MRI、核素** 因为骨折线不明显　VS 胫骨太粗,不发生疲劳骨折

早期诊断往往MRI和核素:
①股骨头骨软骨病
②骨髓炎
③骨关节结核

拍X线不一定能发现



图 60-1　直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折




图 60-2　间接暴力致桡骨远端骨折





图 60-3　间接暴力致髌骨骨折



二、分类

①**稳定**性骨折（骨折端不易发生移位）：**横形、青枝、嵌插、裂缝、压缩骨折如椎体和跟骨**（横青插裂压）

②**不完全**骨折：**青枝、裂缝**骨折（吴青峰）

Garden I型　压缩<1/3,支具固定,否则手术




图 60-5　肱骨骨折不同的分类示意图
（1）横形骨折　（2）斜形骨折　（3）螺旋形骨折　（4）粉碎性骨折　（5）T 形骨折






图 60-6　股骨颈嵌插骨折





图 60-7　椎体压缩骨折

三、开放性骨折

①骨折端与**外界相通**　无论是直接相通(如胫骨骨折、屈曲型的肱骨髁上骨折)
还是间接相通(如骨折端把尿道/膀胱/直肠刺破)




图 58-4　开放性骨折示意图
1. 充盈的膀胱及覆盖其上的腹膜破裂后，尿液可流入腹腔，引起腹膜炎　2. 腹膜外膀胱破裂后，尿液流入耻骨后间隙（斜线示意）　3. 耻骨骨折伴有后尿道破裂　4. 尿液外渗浸润耻骨后直肠前间隙（小黑点示意）　5. 尾骨骨折可引起直肠破裂






图 60-33　股骨下段开放性骨折，骨折与外界相通，有被细菌污染而致感染的风险

②应将开放**转为闭合**。若骨折端戳出伤口**已污染者严禁急救复位**　容易并发感染