随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、补充血容量

失血量＜10%（500ml）	不输血
10-20%（500-1000）	晶体液、胶体液
20-30%（1000-1500）	晶体液、胶体液、浓缩红
＞30%（＞1500）	晶体液、胶体液、1/2 浓缩红、1/2 全血（三全凌汤圆：馅和皮各一半）

四、血制品

浓缩红 （最常用）	最适合心功能不全等 Hb＞100 不输血、＜70 输浓缩红、70-100 根据情况（心衰可输）
洗涤红 （洗过肾更健康） 针对过敏人群	①去除抗体如 IgA：最适合 IgA 低下者（易过敏）防止过敏 ②含无功能白细胞和血小板：适合多次输血、经产妇 产生针对白细胞的抗体 ③含少量血浆：适合肾功能不全 肾脏负担小
少/去白红	最适合多次输血、经产妇、预期需反复输血如再障/地贫/白血病（翻白眼）
辐照红（灭活淋巴细胞）	适合准备移植者为预防 GVHD 如白血病（伊芙琳）减少针对白细胞的抗原抗体反应
冰冻血浆 冷沉淀	适合凝血障碍如肝疾病（凝结成冰） 适合纤维蛋白原缺乏症、甲型血友病（遗传缺乏凝血因子 8）你冷 8 冷

新鲜冰冻血浆在4°C沉淀，含较高浓度Ⅰ、Ⅴ、Ⅷ、vWF（提高Ⅴ、Ⅷ稳定性）

真题解析 • 输血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2020N161 X 失血时输血的原则中，正确的有

A.失血量低于总血容量 10%时，不需输血，可待其自行代偿（相当于500ml以内）

B.失血量达总血容量 10%-20%时，输入晶体和胶体液

C.失血量达总血容量 20%-30%时，可适当输入浓缩红细胞

D.失血量超过总血容量 30%时，应全部输入全血 三全凌汤圆

以题带动 知识点复习

思维导图 • 输血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄