
随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.静脉补 KCl 的原则

补钾 **40-80**mmol/d（KCl **3-6g**/d）	2×4=8
浓度＜**40**mmol/L（3g KCl）	nong-4 个字母
速度＜**20**mmol/h	su-2 个字母
尿量＞**40**ml/h 补钾	见尿补钾
补钾后未改善考虑合并**低镁**血症	美甲



复习幽门梗阻：低钾、低氯、代谢性碱中毒，补 KCl+平衡盐（或 5%葡萄糖盐水、生理盐水）

复习《内科学》DKA 的补钾原则：

血 K^+＜3.5	立即补钾
血 K^+正常+尿量＞40ml/h	立即补钾 补液稀释钾离子+使用胰岛素促进钾转入细胞
血 K^+正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、待尿量增加后补钾
血 K^+＞5.5	暂缓补钾

四、钙失衡

（一）高钙血症（血 Ca^{2+}＞2.75）

过量PTH兴奋破骨细胞　　多发性骨髓瘤D-S分期:Ca2+的上限是2.65

①**病因举例**：甲状旁腺功能亢进、骨质破坏如骨肿瘤

②**ST 段缩短**（Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）

ST段

（二）低钙血症（血 Ca^{2+}＜2.25）

贾玲美高,那概率低

①**病因举例**：维生素 D 缺乏、急性胰腺炎、甲状旁腺功能减退、肾衰、小肠瘘、癌症（呼碱）

②**离子化钙**影响神经肌肉兴奋性：麻木针刺感、**痉挛抽搐**、腱反射亢进、呼吸困难、ST 段延长、**Chvostek/面神经征**、Trousseau 征（CT 征-降钙素缩写是 CT）

VS 低钾血症:腱反射减弱

③补充钙剂，可加服骨化三醇

五、维持酸碱平衡

体液缓冲系统	$NaHCO_3/H_2CO_3$、KHb/Hb 等
肺	调节 $PaCO_2$
肾	重吸收 HCO_3^-、分泌 H^+（Na^+-H^+交换和质子泵）、分泌 NH_3/NH_4^+
组织细胞	H^+-K^+交换等

维持酸碱平衡,非排毒(肝脏尿素/鸟氨酸循环)

真题解析·体液失衡

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

低钙惊厥

1.2016N83 A 女性，30 岁。癔病发作后出现手足搐搦、口周麻木的原因是

A.代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒

C.呼吸性碱中毒

D.呼吸性酸中毒

答案：1 C