2.2017N57 A 给予低血钾患者补钾治疗后仍然处于低血钾，此时应考虑合并

A.低钠血症

B.低磷血症

C.低钙血症

D.低镁血症

尖端扭转性室速最主要病因是低钾血症，但治疗时首选补镁治疗

3.2018N59 A 男性，35 岁，5 小时前重物砸伤大腿，查体：血钾 6.1mmol/L，心率 50 次/分，律不齐。该患者首选的静脉注射药物是

>5.5

A.25%葡萄糖 100ml+6U 胰岛素

B.10%葡萄糖酸钙 20ml 快

C.5%碳酸氢钠 100ml

D.11.2%乳酸钠 50ml

4.2019N95-97 A 男性，45 岁。体重 65kg。因胆囊结石及胆总管结石行胆囊切除、胆总管切开取石术，手术顺利。手术当日出入量如下：总输入液量 4500ml，出量：胃肠减压 500ml，T 管引流 450ml，腹腔引流液 50ml，尿量 2500ml。患者心、肾功能及血电解质正常，未用利尿剂。

不是损失量
算生理需要量
正常尿量1000-2000

95.术后第一天输液总量应是

损失量:500+450+50=1000ml
↓
5%糖盐水

A.1500ml

B.2000ml

C.3500ml

D.4500ml

补水:5%G
补盐水:生理盐水或5%糖盐水

生理需要量:2000-2500ml 5%G
4.5g NaCl—500ml盐水

↓
500ml5%糖盐水
2000ml5%G

96.患者手术当天的显性额外损失量是

A.1000ml

B.2000ml

C.2500ml

D.3500ml

97.术后第一天补液中应包括生理盐水

A.500ml

B.1000ml

C.1500ml

D.2000ml

以题带动
知识点复习

固定的

常用数据小结：补液量=损失量（胃肠减压、引流管等）+生理需要量（2000-2500ml 水+4.5gNaCl）

（固定的、题目给的尿量拿来参考、正常尿量 1000-2000、选项也要参考）

血浆渗透压	280-310
血钠	135-150，平均 142
血钾	3.5-5.5
血钙	2.25-2.75
17mmol Na^+相当于	1g NaCl（17 岁那年的雨季）
13.4mmol K^+相当于	1g KCl（医生世家）

低渗性脱水
- 有休克:用等渗性脱水方法
- 无休克:补Na+=(142-实际Na+)X0.6/0.5Xkg