



图 8-1　痈的切开引流
(1)十字切口　(2)切口长度要超过炎症范围少许,深达筋膜
(3)伤口内填塞纱布条止血

（三）蜂窝织炎、丹毒

蜂窝织炎	丹毒
累及皮肤、肌肉、阑尾等疏松结缔组织	累及皮肤淋巴管网
化脓性炎	非化脓性炎（单独）
边界不清　淋巴管网有界限 边界清楚	
①蜂窝织炎出现波动感：切开引流 ②颌下蜂窝织炎：小儿多见，早期切开减压防窒息 离气管太近,容易出现喉头水肿	不切开引流
《外科总论》： ①乙型溶血性链球菌多见 ②产气性皮下蜂窝织炎：厌氧菌多见（捻发感） ③新生儿皮下坏疽：金葡菌多见（新生儿金贵） 皮肤致病菌一般是金葡菌 《外科各论》：急性化脓性阑尾炎：大肠杆菌等 G-杆菌、厌氧菌多见	乙型溶血性链球菌多见 ttsx

三道(消化道、泌尿道、胆道)感染一般以G-杆菌、厌氧菌多见

丹毒：淋巴回流受阻导致淋巴水肿:丝虫病、丹毒橡皮肿、乳腺癌橘皮样变
①好发于**下肢、面部**，原发灶为足藓、口腔溃疡、鼻窦炎等
②**边界清楚**的**片状**红疹，**周围鲜红+中间淡红**（一片丹清红淡红），反复发作可致**象皮肿（淋巴管阻塞）**
③治愈后**易复发**：症状消失后要继续用药
④很少有组织坏死化脓：**不**切开引流



鱼刺扎-金葡菌感染多见
都要抬高手
都做纵形切口

三、手部化脓性感染

（一）甲沟炎、指头炎

1.甲沟炎 末节指背面
①指甲两侧可形成 U 形脓肿、甲下脓肿、脓性指头炎等
②出现波动感：甲沟旁**纵**行切开引流

末节指掌面
2.脓性指头炎 手指空间小,有炎症化脓→局部张力高→压迫神经末梢→神经缺血很痛
①鱼刺、甲沟炎蔓延等，指头针刺样疼痛→剧烈跳痛、肿胀加重→疼痛减轻
神经末梢直接被压烂
②初发时悬吊前臂、平放患手 利于引流



