真题解析·感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N77 A 中指脓性指头炎如治疗不及时，最易发生的并发症是

A.败血症

B.掌中间隙感染

C.末节指骨缺血坏死 肿痛明显时及时切开引流,否则易致末节指骨缺血坏死、骨髓炎

D.化脓性腱鞘炎

2. 2014N178 X 以下选项中，需早期切开、清创引流的有

A.破伤风

B.气性坏疽

C.蜂窝织炎 只有小儿颌下蜂窝织炎才早期切开

D.寒性脓肿 合并混合感染,全身中毒症状明显时才切开引流(此时不能做病灶清除术)

一般:波动感形成后切开引流
特殊:破伤风和气性坏疽早期切开引流、颌下蜂窝织炎
早期切开、手部感染除了甲沟炎都是明显肿痛时切开引流

3. 2017N97-99 A 男性，28 岁，足底铁钉刺伤后两天，乏力，张口困难，继之苦笑面容，角弓反张，声响可诱发上述症状，神志清楚，无发热。

97.引起该患者上述症状的致病菌为

A.大肠埃希菌

B.厌氧芽胞杆菌

C.变形杆菌

D.产气荚膜杆菌 气性坏疽

98.对该伤口的处置应用 痒死你

A.高浓度抗生素

B.过氧化氢溶液

C.高锰酸钾溶液

D.生理盐水

99.治疗过程中，不需要使用的药物是

A.TAT

B.丙种球蛋白 没有特异性　需要用破伤风免疫球蛋白TIG　ITP急症治疗,一线治疗-丙球

C.甲硝唑

D.青霉素

4. 2018N163 X 真菌败血症的临床表现有 真菌:肉芽肿造成的结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现

A.突发寒战、高热 败血症共性

B.多伴有消化道出血

C.神志淡漠、昏迷、休克 败血症共性

D.外周血有类白血病反应 败血症共性

易真菌感染:长期使用免疫抑制剂、广谱抗生素、真菌的二重感染、静脉导管留置时间长、免疫低下时

5. 2019N161 X 丹毒的临床特点有

A.主要致病菌为乙型溶血性链球菌

B.口腔溃疡可以是诱发因素

以题带动 知识点复习

答案:1-5 C AB BBB ACD ABC