A.手术引流
B.局部理疗
C.加用抗生素
D.穿刺置管引流 穿刺→送检验科检验是否为胆汁+减轻患者症状

3. 2021N57 A 下列关于术前准备的叙述中，错误的是
A.高血压患者应继续服用降压药物，避免戒断综合征
B.明确有凝血障碍者，择期手术前应做相应治疗 NSAIDs术前2-3天(阿司匹林术前7天)、氯吡格雷术前10天停用
C.糖尿病病人术前须把血糖控制到正常水平才能手术 5.6-11.2轻度升高状态
D.肾功能重度损害者，在有效的透析疗法处理下，可耐受手术
肝功能严重受损(如childC级)绝对不能做手术,因为任何手术都会打击肝功能

4. 2023N57 A 关于腹部切口裂开的原因，错误的是
A.营养不良
B.手术后剧烈咳嗽 腹内压增高
C.应用糖皮质激素 蛋白质分解　克痿恩病:特征是瘘管形成,此时直接上英夫利息单抗
D.行切口减张缝合

以题带动 知识点复习

5. 2023N58 A 关于术前胃肠道准备的叙述，正确的是
A.禁食 4 小时，禁饮水 2 小时
B.禁食 6 小时，禁饮水 2 小时
C.禁食 12 小时，禁饮水 4 小时
D.禁食 24 小时，禁饮水 12 小时

6. 2025N163 X 预防腹部切口裂开的方法有
A.腹部加压包扎
B.延迟拆线 患者有严重营养不良、组织修复能力较差、长期大量使用GC/免疫抑制剂、糖尿病、有腹内压持续增高的情况时会采用延迟拆线
C.加用减张缝合
D.及时处理腹胀

专题串联·常考切口小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

切口出血压迫气管、喉头水肿、双侧喉返神经损伤、气管软化塌陷、误切甲状旁腺

甲状腺手术后并发呼吸困难和窒息	若切口渗血、饱满→出血压迫气管：立即床旁抢救，拆线敞切口、止血清血肿，即使止血充分也应放引流
急性乳腺炎	①表浅脓肿：放射状切口 ②乳晕下脓肿：沿乳晕边缘作弧形切口 ③深部或乳房后脓肿：沿乳房下缘作弧形切口
继发性腹膜炎	右旁正中切口 大概率来自右上腹的胆囊穿孔、右下腹的阑尾穿孔
腹部损伤	正中切口（全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术） 开肝其余都是脾
急性阑尾炎	手术并发症以切口感染最常见

答案:3-6 C D 无 ACD