<table>
<tr><td></td><td>小结：一旦确诊急性阑尾炎应早期手术切阑尾，但阑尾周围脓肿除外——其及时放引流、3 个月后切阑尾
<table>
<tr><th>急性阑尾炎</th><th>切口</th><th>生理盐水冲腹腔</th><th>放引流</th><th>围术期抗生素</th></tr>
<tr><td>单纯性</td><td>麦氏点</td><td>不</td><td>不</td><td>用</td></tr>
<tr><td>化脓性</td><td>麦氏点</td><td>脓液少→不
脓液多→要</td><td>脓液少→不
脓液多→看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>坏疽穿孔性</td><td>右下腹经腹直肌</td><td>要</td><td>看情况</td><td>用</td></tr>
<tr><td>妊娠期</td><td>偏高</td><td>看情况</td><td>不</td><td>用</td></tr>
</table>
把横向走形的肌肉切断了</td></tr>
<tr><td>切口疝</td><td>最常见于经腹直肌切口，切口感染是最常见原因</td></tr>
<tr><td>腹膜外型膀胱破裂</td><td>下腹正中切口</td></tr>
<tr><td>痈</td><td>十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔</td></tr>
<tr><td>甲沟炎</td><td>甲沟旁作纵行切口</td></tr>
<tr><td>脓性指头炎</td><td>末节指侧面作纵行切口，切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2
脓腔较大者对口引流。去除死骨。指神经阻滞麻醉（不加肾）</td></tr>
<tr><td>掌深间隙感染</td><td>切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）。严禁切开肿胀的手背</td></tr>
<tr><td>化脓性滑囊炎</td><td>切口近端距腕横纹至少 1.5cm（避免损伤正中神经）</td></tr>
<tr><td>切口
分类</td><td>I类清洁切口：甲状腺手术
II类可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
III类污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术</td></tr>
<tr><td>切口
并发症</td><td>①切口积血（最常见）
②切口血清肿：术中切断较多的淋巴管（乳房、腹股沟区手术）
③切口感染
④切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）
无菌敷料覆盖切口+减张缝合。适当的腹部加压包扎可预防</td></tr>
</table>

思维导图·围术期

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心


微信搜一搜
天天师兄