真题解析·休克

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2022N58 A 休克代偿期的临床表现为

A.血压正常或稍高，心率、脉压正常

B.血压正常或稍低，心率、脉压正常

C.血压正常或稍高，心率快，脉压缩小

D.血压正常或稍低，心率快，脉压增加　微动脉收缩→外周阻力↑→舒张压显著↑、收缩压轻度↑

2.2023N59 A 男性，24 岁。撞伤右季肋部 1 小时急诊就诊。初步诊断为失血性休克，肝破裂。在等待血型鉴定和交叉配血期间，首选的输注液体是

A.5%葡萄糖液

B.5%葡萄糖氯化钠溶液

C.平衡盐溶液

D.10%葡萄糖液

3.2025N58 A 下列不属于全身炎症反应综合征的是

A.体温＞38℃

B.心率＜90 次/分

C.呼吸＞20 次/分

D.血白细胞＞12×10^9/L

答案：1-3 C C B

专题串联·常考疾病休克小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

糖尿病的酮症酸中毒和高渗高血糖综合征补的是生理盐水，

必看血压 ttsx	收缩压＜90：一般**补充血容量** 其他补液首选平衡盐溶液 补**平衡盐**等晶体液（DKA/HHS-生理盐水），必要时输血
急性 肺血栓栓塞	**高危**（收缩压＜90、降低≥40、或心搏骤停就是高危）：rt-PA 等溶栓→肝素等抗凝 **中危**（右心功能不全）：抗凝→可考虑溶栓　不考虑禁忌症 **低危**：抗凝，不溶栓　β-R激动剂　磷酸二酯酶抑制剂 Ca2+增敏剂　强心苷
急性 左心衰	收缩压＜90：多巴酚丁胺、多巴胺、米/氨力农、左西孟旦、毛花苷丙等正性肌力药（按拢猛干）。禁用硝普钠等血管扩张药 肥猪就是you（肥心病、主狭、收缩压＜90、急性右室梗死）
快速型心律失常	**收缩压＜90：同步电复律**（室扑室颤-非同步/电除颤）。否则胺碘酮、β-R 拮抗剂等 xian BB点心
严重缓慢型心律失常 如二度II型和三度房室阻滞	**起搏器** 血压正常我用药，血压低我电击　跟R波不同步　循证医学证明可降低患者猝死率 （无论是否休克最重要的都是起搏器）窦缓、I度、II度一型房室阻滞不用管 急性心肌炎，急性心肌梗死导致的缓慢型心律失常可以用临时起搏器
急性二闭	收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP 说明血液多射到左心房，往主A射血少
不稳定型心绞痛和急性非 ST 段抬高型心梗	**极高危**（收缩压＜90、急性心衰、室颤、心搏骤停、心梗合并乳头肌断裂或心脏破裂、反复间歇性 ST 段抬高、药物治疗无效的反复胸痛任意之一休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST 抬高）：**＜2 小时 PCI**，若收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP　过渡，为PCI争取时间
急性 ST 段 抬高型心梗	PCI 或溶栓（关注溶栓禁忌症脑袋、创伤、血管） **若收缩压＜90 立即主动脉内球囊反搏 IABP** NSTEMI为白色血栓，不考虑溶栓