四、移植

①组织移植：角膜、皮肤（不是一整张皮肤(器官)）、皮肌瓣

②超急性排斥反应：受者血液中已有供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符（我准备好了）可预防

③移植中疗效最显著：肾（慢性排斥反应是最大障碍）心脏移植慢性排斥反应→冠状动脉粥样硬化

④排斥反应发生率最高、易并发严重感染、易发生 GVHD：小肠 有丰富淋巴细胞
移植物抗宿主病

五、微创

腹腔镜手术可有与 CO_2 气腹相关的并发症 CO2溶解度高,可迅速吸收、排泄

六、肿瘤

1.预防

一级预防（对因）：防止癌症发生（戒烟、疫苗等）eg.减少职业性致癌物暴露、多吃纤维素

二级预防：高危人群定期筛查、早发现早诊断早治疗

三级预防：姑息、对症治疗 提高患者生存质量,减轻痛苦,延长生命

2.癌痛止痛

①非阿片类如阿司匹林→弱阿片类如可待因→强阿片类如吗啡→药物以外的治疗

②从小剂量开始、视止痛效果逐渐增量，定期给药，口服→直肠→注射
能口服尽量口服 易成瘾

3.抗肿瘤药举例

细胞毒素类	环磷酰胺 急进性肾炎肾病综合征、风湿系统疾病(SLE、血管炎)
抗代谢类	氟尿嘧啶（消化道恶性肿瘤）、甲氨蝶呤（ALL中枢白血病）、阿糖胞苷 核苷酸代谢抑制物
抗生素类	放线菌素、丝裂霉素、阿霉素、博来霉素（类风湿改善病情）
生物碱类	长春碱（TTP、急淋）、紫杉醇 乳腺癌ETC方案
激素类	泼尼松、三苯氧胺/他莫昔芬 吃他三
靶向药	伊马替尼（慢粒BCR-ABL融合基因 胃肠间质瘤Kit/CD117）、赫赛汀（乳腺癌Her2）、美罗华 CD20 二美丽

4.常见体表肿瘤与囊肿

恶性肿瘤最大特征之一:转移
记特殊:皮肤基底C癌、卵巢颗粒C瘤很少转移

①皮肤基底细胞癌（低度恶性）：多见于老年人头面部，浸润性生长、生长缓慢、很少转移，伴黑色素增多者破溃后呈鼠咬状。对放疗敏感，手术切除效果好（老头慢放羊、放老鼠药） 常常形成溃疡 病理性色素沉着

②黑色素瘤（高度恶性的体表肿瘤）：不对称、不规则、不均匀、＞6mm
黑精索

③交界痣：在基底细胞层（易恶变），警惕手掌/足底/皮带区痣恶变如出血、破溃、色素加深、变大、瘙痒、疼痛
丰富的干细胞 易摩擦

④脂肪瘤：质软、分叶状、切面呈黄色

⑤皮脂腺囊肿：好发于头面和背部，表面有小黑点、囊内有豆渣物

⑥皮样囊肿（单胚层囊性畸胎瘤）：好发于眉梢和颅骨骨缝，哑铃状
卵巢甲状腺肿

哑铃:
原发性肺结核原发综合征
后纵隔神经源性肿瘤
皮样囊肿