Nouvelles études — Semaine du 14 septembre 2026

11 études indexées

Critères d'inclusion : *Méta-analyses et revues systématiques (min. 5 études) · RCTs (min. 20 participants) · Exclusion : case reports, lettres, opinions sans données.*

#1 *EJO / AJO-DDO 2025, PMID 41127933* ■ **Méta-analyse**

Qualité et stabilité des résultats de traitement orthodontique avec aligneurs vs appareils fixes : revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : Les aligneurs transparents et les appareils fixes offrent des résultats comparables en termes de qualité occlusale finale. La stabilité à long terme est similaire entre les deux modalités, bien que les preuves restent limitées pour certains types de malocclusion. La recherche souligne la nécessité d'essais randomisés de haute qualité.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41127933/

#2 *2025, PMID 41278043* ■ **Revue syst. + Méta-analyse**

Efficacité des aligneurs transparents versus appareils fixes dans le traitement des malocclusions : revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : Analyse de RCTs jusqu'en octobre 2025 comparant aligneurs et appareils fixes. Les aligneurs montrent une efficacité comparable aux appareils fixes pour les malocclusions modérées, avec une meilleure satisfaction esthétique des patients. Des différences subsistent pour les cas complexes nécessitant des mouvements précis de torque et de rotation.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12634020/

#3 *2025, PMID 40919671* ■ **Méta-analyse parapluie**

Impact des mini-vis et micro-implants sur les résultats cliniques orthodontiques : méta-analyse parapluie

Résultat clé : Cette analyse de 11 méta-analyses couvrant 50 ensembles de données démontre que les mini-vis améliorent significativement le contrôle de l'ancrage par rapport aux méthodes conventionnelles, notamment pour l'expansion palatine, la distalisation molaire et la correction des dysmorphoses squelettiques. Le taux de succès global reste élevé avec une technique appropriée.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40919671/

#4 *2025, PMC13525687* ■ **Revue syst. + Méta-réseau**

Effets des différents types de contentions orthodontiques sur la stabilité des arcades et la santé parodontale : revue systématique et méta-analyses en réseau

Résultat clé : Portant sur 18 RCTs (1 471 patients), cette étude montre que les contentions fixes maintiennent mieux la stabilité des incisives que les gouttières amovibles à court terme. Aucune différence significative n'est observée sur la santé parodontale entre les types de contentions, à condition d'une hygiène adéquate.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13525687/

#5 2025, PMID 41270429 ■ Revue syst. + Méta-analyse

Évaluation de l'efficacité des contentions intelligentes pour la rétention orthodontique : revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : L'analyse de 15 études sur les systèmes intelligents (TheraMon®, Smart Retainer®, DentiTrac®, Air Aid®) montre que ces dispositifs améliorent objectivement la surveillance du port, mais ne démontrent pas d'amélioration significative de la compliance réelle du patient. Des RCTs de meilleure qualité et à plus long terme sont nécessaires.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41270429/

#6 2025, PMC12565956 ■ Revue syst. + Méta-analyse

Le traitement orthodontique précoce en denture mixte améliore-t-il les résultats à long terme ? Revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : Évaluation de la stabilité à long terme des interventions précoces chez les enfants de 6 à 12 ans (suivi minimum 1 an). Les preuves sont limitées et contradictoires quant à l'avantage réel du traitement précoce versus différé, notamment pour la réduction du nombre de phases de traitement. Le traitement précoce se justifie surtout pour certaines indications spécifiques (crossbite fonctionnel, habitudes orales).

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12565956/

#7 2025, PMID 41399602 ■ Revue systématique

Interventions orthodontiques et orthopédiques précoces pour béance antérieure en denture mixte : revue systématique

Résultat clé : Recherche sur PubMed, Embase, Web of Science et ClinicalTrials.gov (RCTs, janvier 2020 – octobre 2025). Les interventions précoces pour béance antérieure en denture mixte (thérapie myofonctionnelle, grille linguale) montrent une efficacité à court terme, mais la stabilité à long terme dépend fortement de l'élimination des habitudes orales et de la croissance résiduelle.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41399602/

#8 2025, PMC12512631 ■ Revue syst. + Méta-analyse

Précision de l'intelligence artificielle dans la planification du traitement par extraction en orthodontie : revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : Les algorithmes d'IA atteignent une précision comparable à celle des orthodontistes experts pour la décision d'extraction (précision globale ~85-90%). Les modèles d'apprentissage profond intégrant les données radiographiques et cliniques multi-modalités surpassent les approches uni-modales. Des validations prospectives à grande échelle restent nécessaires avant adoption clinique généralisée.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12512631/

#9 *2025, PMID 40422601* ■ RCT

Effet de la thérapie laser de basse intensité sur la douleur causée par les séparateurs orthodontiques : étude randomisée, double aveugle, contrôlée par placebo, en bouche divisée

Résultat clé : Application unique de LLLT (6 J d'énergie) : réduction de la douleur de 49 % en position de repos et de 51 % lors de la mastication, avec un effet maximal à 6 heures post-pose des séparateurs. L'effet analgésique s'estompe après 48 heures. Cette technique simple et sans effets secondaires constitue une alternative viable aux antalgiques oraux.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40422601/

#10 *2025, PMC12868923* ■ Revue parapluie + Méta-analyse

Efficacité des interventions physiques adjuvantes dans l'accélération du mouvement dentaire orthodontique : revue parapluie et méta-analyse

Résultat clé : Synthèse des revues systématiques et méta-analyses de RCTs publiées jusqu'en mars 2025. Les vibrations mécaniques et la photobiomodulation (LLLT) montrent un effet modeste mais significatif sur l'accélération du mouvement dentaire. La micro-ostéoperforation présente la taille d'effet la plus importante, bien que les données restent hétérogènes. Les preuves sont insuffisantes pour recommander systématiquement ces techniques en pratique clinique courante.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12868923/

#11 *2025, PMID 40576199* ■ Revue syst. + Méta-analyse

Optimisation du protocole de traitement orthodontique chez les patients atteints de parodontite : revue systématique et méta-analyse

Résultat clé : Le traitement orthodontique chez les patients parodontaux stabilisés entraîne un gain significatif d'attache clinique (CAL moyen de 3,84 à 4,34 mm) et une réduction de la profondeur de poche. La prise en charge multidisciplinaire parodonto-orthodontique séquentielle est recommandée avec contrôle rigoureux de l'inflammation avant et pendant le traitement.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40576199/