

计算物理 2018 秋季第四次作业

叶子凌锋 1600011337

2018 年 12 月 24 日

1 利用标准的 4 阶 Runge-Kutta 来求解简单的常微分方程的初值问题

1.1 问题 (a)

观察到方程对于第一个方程对于 x 是齐次的, 第二个方程对于 y 是齐次的, 可以对 x, y 都进行正则化, 把常数吸收到 x, y 中。令

$$\begin{cases} X = \frac{\delta}{\gamma}x \\ Y = \frac{\beta}{\alpha}y \end{cases} \quad (1)$$

可以把原方程变为

$$\begin{cases} \dot{X} = \frac{\delta}{\gamma}\dot{x} = \alpha\frac{\delta}{\gamma}x - \alpha(\frac{\delta}{\gamma}x)(\frac{\beta}{\alpha}y) = \alpha X - \alpha XY \\ \dot{Y} = \frac{\beta}{\alpha}\dot{y} = \gamma(\frac{\delta}{\gamma}x)(\frac{\beta}{\alpha}y) - \gamma\frac{\beta}{\alpha}y = \gamma XY - \gamma Y \end{cases} \quad (2)$$

接下来令 $T = \alpha t$, 则 $\frac{d}{dt} = \alpha \frac{d}{dT}$, 故方程可以变为

$$\begin{cases} \frac{dX}{dT} = X - XY \\ \frac{dY}{dT} = \frac{\gamma}{\alpha}XY - \frac{\gamma}{\alpha}Y \end{cases} \quad (3)$$

故只有 $\frac{\gamma}{\alpha}$ 一个参数。对 x, y, t 的重新定义见上换元的操作。

1.2 问题 (b)

有固定点。分别是 $(x, y) = (0, 0)$ 和 $(x, y) = (\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$ 。考虑在固定点附近的微扰, 要求出 \dot{x} 和 \dot{y} 在固定点附近关于 x, y 的偏导数, 考虑其雅克比矩阵。

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix} \quad (4)$$




图 1: 固定点 1, 对 x 做微扰, 远离固定点

带入第一个固定点 $(x, y) = (0, 0)$, 得到

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix} \quad (5)$$

由于 $\alpha > 0, \gamma > 0$, 故第一个固定点 $(x, y) = (0, 0)$ 是一个鞍点。如果有一个 $dx > 0$, 那么 $\dot{x} > 0$, x 随着时间变大, 远离固定点, 也就是如果没有捕食者, 少量的猎物就可以不断繁殖, 数量增大; 如果有一个 $dy > 0$, 那么 $\dot{y} < 0$, y 随着时间减小, 回到固定点, 也就是如果没有猎物, 即便只有少量捕食者, 也会因为没有猎物而数量减少。这个状态并不是稳定的。

代入第二个固定点 $(x, y) = (\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$, 得到

$$J\left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

定性分析, 如果有小的扰动 $dy (dy > 0)$, 会使得 \dot{x} 为负, x 减小, dx 为负, \dot{y} 为负, y 减小, 故对 y 产生了回到平衡位置的作用, 对 dx 可以进行类似的分析, 可以得到这个点是稳定的平衡点。另一方面, 也可以考虑这个矩阵的特征值, $\lambda_1 = i\sqrt{\alpha\gamma}$, $\lambda_2 = -i\sqrt{\alpha\gamma}$, 对 x, y 进行线性组合找到特征向量 η_1, η_2 , 可以解得这两个特征向量是周期性变化的, 周期为 $\frac{2\pi}{\sqrt{\alpha\gamma}}$ 。这说明如果在这个固定点发生扰动, x, y 的值会产生周期性的变化, 是一个稳定的点。

下面用数值解验证以上理论分析的结果。




图 2: 固定点 1, 对 y 做微扰, 回到固定点




图 3: 固定点 2, 对 x 做微扰, 几乎保持不变, 周期变化幅度较小




图 4: 固定点 2, 对 x 做微扰, 几乎保持不变, 周期变化幅度较小




图 5: 固定点 1, 对 x 做非小量的扰动, 明显周期变化




图 6: 固定点 1, 对 y 做非小量的扰动, 明显周期变化

1.3 问题 (c)

上两个方程相除可以得到

$$\begin{aligned}\frac{dY}{dX} &= \frac{\gamma(X-1)Y}{\alpha(1-Y)X} \\ \frac{1-Y}{Y}dY &= \frac{\gamma}{\alpha} \frac{X-1}{X}dX \\ d(\ln Y - Y) &= d\left(\frac{\gamma}{\alpha}(X - \ln X)\right)\end{aligned}\tag{7}$$

也就是找到一个守恒量 $C' = \frac{\gamma}{\alpha}(X - \ln X) + Y - \ln Y = \frac{\gamma}{\alpha}(\frac{\delta}{\gamma}x - \ln x - \ln \frac{\delta}{\gamma}) + \frac{\beta}{\alpha}y - \ln y - \ln \frac{\beta}{\alpha}$ 。
只用 x, y 表示则有守恒量为

$$C = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y\tag{8}$$

1.4 问题 (d)

代码见附件。演化图如下。




图 7: Runge-Kutta 4 阶方法求解微分方程组