

투약 안전

투약 전에는 처방, 대상자, 약물, 용량, 경로와 시간을 순서대로 대조한다.
알레르기와 최근 검사 결과를 확인하고 설명 후 투약한다.

고위험 약물은 준비와 주입 설정을 다른 간호사와 독립적으로 이중 확인한다. 주입 펌프 경고를 임의로 해제하지 않고 원인을 먼저 확인한다.

투약 뒤에는 기대 효과와 이상 반응을 관찰하고 기록한다. 오류가 의심되면 환자 상태를 우선 확인하고 보고 체계에 따라 즉시 알린다.

투약 전에는 처방, 대상자, 약물, 용량, 경로와 시간을 순서대로 대조한다.
알레르기와 최근 검사 결과를 확인하고 설명 후 투약한다.

고위험 약물은 준비와 주입 설정을 다른 간호사와 독립적으로 이중 확인한다. 주입 펌프 경고를 임의로 해제하지 않고 원인을 먼저 확인한다.

투약 뒤에는 기대 효과와 이상 반응을 관찰하고 기록한다. 오류가 의심되면 환자 상태를 우선 확인하고 보고 체계에 따라 즉시 알린다.

투약 전에는 처방, 대상자, 약물, 용량, 경로와 시간을 순서대로 대조한다.
알레르기와 최근 검사 결과를 확인하고 설명 후 투약한다.

고위험 약물은 준비와 주입 설정을 다른 간호사와 독립적으로 이중 확인한다. 주입 펌프 경고를 임의로 해제하지 않고 원인을 먼저 확인한다.

투약 뒤에는 기대 효과와 이상 반응을 관찰하고 기록한다. 오류가 의심되면 환자 상태를 우선 확인하고 보고 체계에 따라 즉시 알린다.

욕창 예방

피부 상태는 뼈 돌출 부위와 의료기기 접촉 부위를 중심으로 관찰한다 . 습기 , 마찰 , 영양 상태와 움직임 제한 여부를 함께 확인한다 .

스스로 자세를 바꾸기 어려운 대상자는 계획된 간격으로 체위를 변경하고 압력 분산 도구를 적용한다 . 피부를 끌지 않고 들어서 이동한다 .

홍반이나 손상이 발견되면 위치와 크기 , 색 , 삼출물을 기록하고 원인을 줄이는 계획을 세운다 . 보호자에게 피부 관찰 방법도 설명한다 .

피부 상태는 뼈 돌출 부위와 의료기기 접촉 부위를 중심으로 관찰한다 . 습기 , 마찰 , 영양 상태와 움직임 제한 여부를 함께 확인한다 .

스스로 자세를 바꾸기 어려운 대상자는 계획된 간격으로 체위를 변경하고 압력 분산 도구를 적용한다 . 피부를 끌지 않고 들어서 이동한다 .

홍반이나 손상이 발견되면 위치와 크기 , 색 , 삼출물을 기록하고 원인을 줄이는 계획을 세운다 . 보호자에게 피부 관찰 방법도 설명한다 .

피부 상태는 뼈 돌출 부위와 의료기기 접촉 부위를 중심으로 관찰한다 . 습기 , 마찰 , 영양 상태와 움직임 제한 여부를 함께 확인한다 .

스스로 자세를 바꾸기 어려운 대상자는 계획된 간격으로 체위를 변경하고 압력 분산 도구를 적용한다 . 피부를 끌지 않고 들어서 이동한다 .

홍반이나 손상이 발견되면 위치와 크기 , 색 , 삼출물을 기록하고 원인을 줄이는 계획을 세운다 . 보호자에게 피부 관찰 방법도 설명한다 .

감염 관리

손 위생은 환자 접촉 전후 , 무균 처치 전 , 체액 노출 위험 후와 주변 환경 접촉 후에 수행한다 . 장갑은 손 위생을 대신하지 않는다 .

격리 유형에 맞는 보호구를 선택하고 오염 가능성이 높은 순서를 고려해 벗는다 . 사용한 물품과 린넨은 지정된 경로로 처리한다 .

발열과 검사 결과 , 삽입 부위 변화가 있으면 추세를 확인해 보고한다 . 불필요한 침습 기구는 제거 가능성을 매일 검토한다 .

손 위생은 환자 접촉 전후 , 무균 처치 전 , 체액 노출 위험 후와 주변 환경 접촉 후에 수행한다 . 장갑은 손 위생을 대신하지 않는다 .

격리 유형에 맞는 보호구를 선택하고 오염 가능성이 높은 순서를 고려해 벗는다 . 사용한 물품과 린넨은 지정된 경로로 처리한다 .

발열과 검사 결과 , 삽입 부위 변화가 있으면 추세를 확인해 보고한다 . 불필요한 침습 기구는 제거 가능성을 매일 검토한다 .

손 위생은 환자 접촉 전후 , 무균 처치 전 , 체액 노출 위험 후와 주변 환경 접촉 후에 수행한다 . 장갑은 손 위생을 대신하지 않는다 .

격리 유형에 맞는 보호구를 선택하고 오염 가능성이 높은 순서를 고려해 벗는다 . 사용한 물품과 린넨은 지정된 경로로 처리한다 .

발열과 검사 결과 , 삽입 부위 변화가 있으면 추세를 확인해 보고한다 . 불필요한 침습 기구는 제거 가능성을 매일 검토한다 .

수혈 간호

수혈 전 동의와 혈액 정보, 대상자 식별 정보를 두 사람이 확인한다. 시작 전 체온, 맥박, 호흡과 혈압을 측정해 기준값을 남긴다.

초기에는 대상자 곁에서 오한, 발열, 호흡곤란, 통증과 발진을 면밀히 관찰한다. 정해진 속도와 전용 수액 세트를 사용한다.

이상 반응이 의심되면 수혈을 중단하고 정맥로를 유지한 뒤 즉시 보고한다. 혈액백과 검체 처리는 기관 절차를 따른다.

수혈 전 동의와 혈액 정보, 대상자 식별 정보를 두 사람이 확인한다. 시작 전 체온, 맥박, 호흡과 혈압을 측정해 기준값을 남긴다.

초기에는 대상자 곁에서 오한, 발열, 호흡곤란, 통증과 발진을 면밀히 관찰한다. 정해진 속도와 전용 수액 세트를 사용한다.

이상 반응이 의심되면 수혈을 중단하고 정맥로를 유지한 뒤 즉시 보고한다. 혈액백과 검체 처리는 기관 절차를 따른다.

수혈 전 동의와 혈액 정보, 대상자 식별 정보를 두 사람이 확인한다. 시작 전 체온, 맥박, 호흡과 혈압을 측정해 기준값을 남긴다.

초기에는 대상자 곁에서 오한, 발열, 호흡곤란, 통증과 발진을 면밀히 관찰한다. 정해진 속도와 전용 수액 세트를 사용한다.

이상 반응이 의심되면 수혈을 중단하고 정맥로를 유지한 뒤 즉시 보고한다. 혈액백과 검체 처리는 기관 절차를 따른다.

통증 사정

통증은 위치, 강도, 양상, 시작 시점, 지속 시간과 악화·완화 요인을 구조적으로 질문한다. 의사소통이 어려우면 행동 지표를 활용한다.

약물 및 비약물 중재를 적용한 뒤 정해진 시간에 효과를 다시 확인한다. 수치 변화뿐 아니라 수면과 움직임 같은 기능 변화도 살핀다.

갑작스럽거나 이전과 다른 통증은 활력징후와 동반 증상을 함께 확인해 보고한다. 사정과 중재, 재확인 결과를 연속적으로 기록한다.

통증은 위치, 강도, 양상, 시작 시점, 지속 시간과 악화·완화 요인을 구조적으로 질문한다. 의사소통이 어려우면 행동 지표를 활용한다.

약물 및 비약물 중재를 적용한 뒤 정해진 시간에 효과를 다시 확인한다. 수치 변화뿐 아니라 수면과 움직임 같은 기능 변화도 살핀다.

갑작스럽거나 이전과 다른 통증은 활력징후와 동반 증상을 함께 확인해 보고한다. 사정과 중재, 재확인 결과를 연속적으로 기록한다.

통증은 위치, 강도, 양상, 시작 시점, 지속 시간과 악화·완화 요인을 구조적으로 질문한다. 의사소통이 어려우면 행동 지표를 활용한다.

약물 및 비약물 중재를 적용한 뒤 정해진 시간에 효과를 다시 확인한다. 수치 변화뿐 아니라 수면과 움직임 같은 기능 변화도 살핀다.

갑작스럽거나 이전과 다른 통증은 활력징후와 동반 증상을 함께 확인해 보고한다. 사정과 중재, 재확인 결과를 연속적으로 기록한다.

혈당 관리

혈당 측정 전 대상자와 검사 시간을 확인하고 손 위생 후 검체를 채취한다 . 결과가 임상 상태와 맞지 않으면 측정 과정을 점검한다 .

인슐린 종류와 용량 , 식사 제공 시점을 대조하며 저혈당 증상 여부를 확인한다 . 투여 부위는 반복 사용을 피하도록 순환한다 .

의식 변화 , 식은땀 , 떨림이 있으면 즉시 혈당을 확인하고 기관 지침에 따라 대응한다 . 처치 후 수치와 증상을 다시 확인한다 .

혈당 측정 전 대상자와 검사 시간을 확인하고 손 위생 후 검체를 채취한다 . 결과가 임상 상태와 맞지 않으면 측정 과정을 점검한다 .

인슐린 종류와 용량 , 식사 제공 시점을 대조하며 저혈당 증상 여부를 확인한다 . 투여 부위는 반복 사용을 피하도록 순환한다 .

의식 변화 , 식은땀 , 떨림이 있으면 즉시 혈당을 확인하고 기관 지침에 따라 대응한다 . 처치 후 수치와 증상을 다시 확인한다 .

혈당 측정 전 대상자와 검사 시간을 확인하고 손 위생 후 검체를 채취한다 . 결과가 임상 상태와 맞지 않으면 측정 과정을 점검한다 .

인슐린 종류와 용량 , 식사 제공 시점을 대조하며 저혈당 증상 여부를 확인한다 . 투여 부위는 반복 사용을 피하도록 순환한다 .

의식 변화 , 식은땀 , 떨림이 있으면 즉시 혈당을 확인하고 기관 지침에 따라 대응한다 . 처치 후 수치와 증상을 다시 확인한다 .

배액관 관리

배액관은 당겨지거나 꺾이지 않도록 고정하고 삽입 부위보다 적절히 낮게 유지한다 .
연결 부위와 폐쇄 상태를 점검한다 .

배액량과 색 , 냄새 , 점도를 같은 조건에서 관찰해 기록한다 . 갑작스러운 증가나 감소는 관 막힘과 출혈 가능성을 함께 확인한다 .

삽입 부위의 발적 , 열감 , 통증과 누출을 관찰하고 무균적으로 드레싱한다 . 이동할 때는 배액 장치 위치와 고정을 다시 확인한다 .

배액관은 당겨지거나 꺾이지 않도록 고정하고 삽입 부위보다 적절히 낮게 유지한다 .
연결 부위와 폐쇄 상태를 점검한다 .

배액량과 색 , 냄새 , 점도를 같은 조건에서 관찰해 기록한다 . 갑작스러운 증가나 감소는 관 막힘과 출혈 가능성을 함께 확인한다 .

삽입 부위의 발적 , 열감 , 통증과 누출을 관찰하고 무균적으로 드레싱한다 . 이동할 때는 배액 장치 위치와 고정을 다시 확인한다 .

배액관은 당겨지거나 꺾이지 않도록 고정하고 삽입 부위보다 적절히 낮게 유지한다 .
연결 부위와 폐쇄 상태를 점검한다 .

배액량과 색 , 냄새 , 점도를 같은 조건에서 관찰해 기록한다 . 갑작스러운 증가나 감소는 관 막힘과 출혈 가능성을 함께 확인한다 .

삽입 부위의 발적 , 열감 , 통증과 누출을 관찰하고 무균적으로 드레싱한다 . 이동할 때는 배액 장치 위치와 고정을 다시 확인한다 .

퇴원 교육

퇴원 전에는 약물 복용법, 식이, 활동, 상처 관리와 예약 일정을 대상자의 생활 환경에 맞춰 설명한다. 전문 용어는 쉬운 표현으로 바꾼다.

경고 증상과 연락 방법을 구체적으로 안내하고 대상자가 핵심 내용을 직접 설명하도록 확인한다. 필요한 서면 자료와 연락처를 제공한다.

가정에서 도움을 줄 사람과 장비 준비 여부를 확인한다. 이해하기 어려운 부분은 다시 설명하고 최종 교육 내용을 기록한다.

퇴원 전에는 약물 복용법, 식이, 활동, 상처 관리와 예약 일정을 대상자의 생활 환경에 맞춰 설명한다. 전문 용어는 쉬운 표현으로 바꾼다.

경고 증상과 연락 방법을 구체적으로 안내하고 대상자가 핵심 내용을 직접 설명하도록 확인한다. 필요한 서면 자료와 연락처를 제공한다.

가정에서 도움을 줄 사람과 장비 준비 여부를 확인한다. 이해하기 어려운 부분은 다시 설명하고 최종 교육 내용을 기록한다.

퇴원 전에는 약물 복용법, 식이, 활동, 상처 관리와 예약 일정을 대상자의 생활 환경에 맞춰 설명한다. 전문 용어는 쉬운 표현으로 바꾼다.

경고 증상과 연락 방법을 구체적으로 안내하고 대상자가 핵심 내용을 직접 설명하도록 확인한다. 필요한 서면 자료와 연락처를 제공한다.

가정에서 도움을 줄 사람과 장비 준비 여부를 확인한다. 이해하기 어려운 부분은 다시 설명하고 최종 교육 내용을 기록한다.