

# Curs 11

## Sisteme de ecuații diferențiale omogene, liniare, de ordinul întâi, cu coeficienți constanți (Continuare)

### 3. Ecuația caracteristică are și rădăcini reale și rădăcini complexe distincte

În această situație se aplică metoda corespunzătoare situației în care rădăcinile ecuației caracteristice sunt reale și distincte pentru rădăcinile reale și metoda corespunzătoare situației în care rădăcinile ecuației caracteristice sunt complexe și distincte pentru rădăcinile complexe.

#### Exemplu

Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x_1' &= -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ x_2' &= -10x_1 + 6x_2 + 8x_3 \\ x_3' &= 3x_1 - x_2 - 2x_3 \end{cases}$$

#### Rezolvare

Căutăm soluții de forma

$$x_1 = \alpha_1 e^{rt}, \quad x_2 = \alpha_2 e^{rt}, \quad x_3 = \alpha_3 e^{rt}.$$

Atunci sistemul din care obținem ecuația caracteristică devine

$$\begin{cases} (-2-r)\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ -10\alpha_1 + (6-r)\alpha_2 + 8\alpha_3 &= 0 \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 - (2+r)\alpha_3 &= 0 \end{cases} \quad (1)$$

Rezultă că ecuația caracteristică este

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2-r & 2 & 2 \\ -10 & 6-r & 8 \\ 3 & -1 & -2-r \end{vmatrix} = r(r^2 - 2r + 2) = 0,$$

ale cărei rădăcini sunt

$$r_1 = 0, \quad r_{2,3} = 1 \pm i.$$

Acum, pentru fiecare  $r$  calculăm  $\alpha_i$  corespunzători.

Pentru  $r_1 = 0$ , sistemul (1) devine

$$\begin{cases} -2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ -10\alpha_1 + 6\alpha_2 + 8\alpha_3 &= 0 \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3 &= 0 \end{cases},$$

cu soluția  $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_2 = -\alpha_1$ ,  $\alpha_3 = 2\alpha_1$ . Considerând  $\alpha_1 = 1$ , obținem  $\alpha_{r_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , deci

$$X_{r_1} = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{0 \cdot t} \\ -1 \cdot e^{0 \cdot t} \\ 2 \cdot e^{0 \cdot t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Pentru  $r_2 = 1 + i$ , sistemul (1) devine

$$\begin{cases} (-3 - i)\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ -10\alpha_1 + (5 - i)\alpha_2 + 8\alpha_3 &= 0 \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 - (3 + i)\alpha_3 &= 0 \end{cases},$$

de unde rezultă  $\alpha_1 \in \mathbb{C}$ ,  $\alpha_2 = (1 + i)\alpha_1$ ,  $\alpha_3 = \frac{1 - i}{2}\alpha_1$ .

Dacă luăm  $\alpha_1 = 1 - i$ , atunci  $\alpha_2 = 2$  și  $\alpha_3 = -i$ , deci

$$\begin{aligned} X_{r_2} &= \begin{pmatrix} 1 - i \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot e^t (\cos t + i \sin t) = \begin{pmatrix} (1 - i)e^t (\cos t + i \sin t) \\ 2e^t (\cos t + i \sin t) \\ -ie^t (\cos t + i \sin t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^t (\cos t + \sin t) \\ 2e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^t (\sin t - \cos t) \\ 2e^t \sin t \\ -e^t \cos t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

de unde rezultă  $\tilde{X}_{r_2} = \begin{pmatrix} e^t (\cos t + \sin t) \\ 2e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix}$  și  $\tilde{\tilde{X}}_{r_2} = \begin{pmatrix} e^t (\sin t - \cos t) \\ 2e^t \sin t \\ -e^t \cos t \end{pmatrix}$ , deci

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= c_1 X_{r_1} + c_2 \tilde{X}_{r_2} + c_3 \tilde{\tilde{X}}_{r_2} = \begin{pmatrix} c_1 \\ -c_1 \\ 2c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_2 e^t (\cos t + \sin t) \\ 2c_2 e^t \cos t \\ c_2 e^t \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_3 e^t (\sin t - \cos t) \\ 2c_3 e^t \sin t \\ -c_3 e^t \cos t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 + c_2 e^t (\cos t + \sin t) + c_3 e^t (\sin t - \cos t) \\ -c_1 + 2c_2 e^t \cos t + 2c_3 e^t \sin t \\ 2c_1 + c_2 e^t \sin t - c_3 e^t \cos t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

deci soluția sistemului este

$$\begin{aligned} x_1 &= c_1 + c_2 e^t (\cos t + \sin t) + c_3 e^t (\sin t - \cos t) \\ x_2 &= -c_1 + 2c_2 e^t \cos t + 2c_3 e^t \sin t \\ x_3 &= 2c_1 + c_2 e^t \sin t - c_3 e^t \cos t \end{aligned}$$

## 4. Ecuația caracteristică are rădăcini reale și multiple

### 4a) Rădăcinile reale multiple determină soluții liniar independente

#### Exemplu

Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x'_1 &= x_2 + x_3 \\ x'_2 &= x_1 + x_3 \\ x'_3 &= x_1 + x_2 \end{cases}$$

## Rezolvare

Căutăm soluții de forma

$$x_1 = \alpha_1 e^{rt}, \quad x_2 = \alpha_2 e^{rt}, \quad x_3 = \alpha_3 e^{rt}.$$

Atunci sistemul din care obținem ecuația caracteristică devine

$$\begin{cases} -r\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - r\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - r\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Rezultă că ecuația caracteristică este

$$\Delta = \begin{vmatrix} -r & 1 & 1 \\ 1 & -r & 1 \\ 1 & 1 & -r \end{vmatrix} = (2-r)(-r-1)^2 = 0,$$

ale cărei rădăcini sunt

$$r_1 = 2, \quad r_{2,3} = -1.$$

Acum, pentru fiecare  $r$  calculăm  $\alpha_i$  corespunzători.

Pentru  $r_1 = 2$ , sistemul (2) devine

$$\begin{cases} -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \end{cases},$$

cu soluția  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 \in \mathbb{R}$ . Considerând  $\alpha_1 = 1$ , obținem  $\alpha_{r_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , deci

$$X_{r_1} = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{2t} \\ 1 \cdot e^{2t} \\ 1 \cdot e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Pentru  $r_2 = -1$ , sistemul (2) devine

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases},$$

cu soluția  $\alpha_1 = -\alpha_2 - \alpha_3$ , unde  $\alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ . Considerând  $\alpha_2 = a$  și  $\alpha_3 = b$ , soluția sistemului este

$$(-a - b, a, b) = (-a, a, 0) + (-b, 0, b) = a(-1, 1, 0) + b(-1, 0, 1),$$

de unde rezultă că vectorii  $(-1, 1, 0)$  și  $(-1, 0, 1)$  sunt liniari independenți, și astfel

$$\alpha_{r_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ și } \alpha_{r_3} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Obținem } X_{r_2} = \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix} \text{ și } X_{r_3} = \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix}. \text{ Atunci}$$

soluția generală a sistemului este

$$X = c_1 X_{r_1} + c_2 X_{r_2} + c_3 X_{r_3} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_1 e^{2t} \\ c_1 e^{2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -c_2 e^{-t} \\ c_2 e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -c_3 e^{-t} \\ 0 \\ c_3 e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} - c_2 e^{-t} - c_3 e^{-t} \\ c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t} \\ c_1 e^{2t} + c_3 e^{-t} \end{pmatrix}$$

deci soluția sistemului este

$$\begin{aligned} x_1 &= c_1 e^{2t} - c_2 e^{-t} - c_3 e^{-t} \\ x_2 &= c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t} \\ x_3 &= c_1 e^{2t} + c_3 e^{-t} \end{aligned}$$

#### 4b) Rădăcinile reale multiple nu determină soluții liniar independente

##### Exemplu

Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x'_1 &= -x_1 + x_2 \\ x'_2 &= -x_2 + 4x_3 \\ x'_3 &= x_1 - 4x_3 \end{cases} \quad (3)$$

##### Rezolvare

Căutăm soluții de forma

$$x_1 = \alpha_1 e^{rt}, \quad x_2 = \alpha_2 e^{rt}, \quad x_3 = \alpha_3 e^{rt}.$$

Atunci sistemul din care obținem ecuația caracteristică devine

$$\begin{cases} (-1-r)\alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ (-1-r)\alpha_2 + 4\alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 - (4+r)\alpha_3 &= 0 \end{cases} \quad (4)$$

Rezultă că ecuația caracteristică este

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1-r & 1 & 0 \\ 0 & -1-r & 4 \\ 1 & 0 & -4-r \end{vmatrix} = r(r+3)^2 = 0,$$

ale cărei rădăcini sunt

$$r_1 = 0, \quad r_{2,3} = -3.$$

Acum, pentru fiecare  $r$  calculăm  $\alpha_i$  corespunzători.

Pentru  $r_1 = 0$ , sistemul (4) devine

$$\begin{cases} -\alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ -\alpha_2 + 4\alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 - 4\alpha_3 &= 0 \end{cases},$$

cu soluția  $\alpha_1 = \alpha_2 \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_3 = \frac{\alpha_1}{4}$ . Considerând  $\alpha_1 = 4$ , obținem  $\alpha_{r_1} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ , deci

$$y_{r_1} = \begin{pmatrix} 4 \cdot e^{0 \cdot t} \\ 4 \cdot e^{0 \cdot t} \\ 1 \cdot e^{0 \cdot t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru  $r_2 = -3$ , sistemul (4) devine

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ 2\alpha_2 + 4\alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 - \alpha_3 &= 0 \end{cases},$$

cu soluția  $\alpha_1 = \alpha_3 \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_2 = -2\alpha_1$ . Considerând  $\alpha_1 = 1$  obținem  $\alpha_{r_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ , deci

$$X_{r_2} = \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ -2e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Pentru  $r_3 = -3$  nu putem găsi o soluție liniar independentă cu  $\alpha_{r_2}$ , și atunci pentru  $r_2 = r_3 = -3$ , vom căuta soluții ale sistemului (3) de forma

$$x_1 = (A_1 + A_2t)e^{-3t}, \quad x_2 = (B_1 + B_2t)e^{-3t}, \quad x_3 = (C_1 + C_2t)e^{-3t},$$

deci

$$x'_1 = A_2e^{-3t} - 3(A_1 + A_2t)e^{-3t}, \quad x'_2 = B_2e^{-3t} - 3(B_1 + B_2t)e^{-3t}, \quad x'_3 = C_2e^{-3t} - 3(C_1 + C_2t)e^{-3t}.$$

Înlocuind în sistemul (3) și împărțind fiecare ecuație prin  $e^{-3t}$  obținem

$$\begin{cases} A_2 - 3A_1 - 3A_2t &= -A_1 + B_1 - A_2t + B_2t \\ B_2 - 3B_1 - 3B_2t &= -B_1 + 4C_1 - B_2t + 4C_2t \\ C_2 - 3C_1 - 3C_2t &= A_1 - 4C_1 + A_2t - 4C_2t \end{cases}$$

Identificând coeficienții obținem

$$\begin{cases} -3A_2 &= -A_2 + B_2 \\ -3B_2 &= -B_2 + 4C_2 \\ -3C_2 &= A_2 - C_2 \\ A_2 - 3A_1 &= -A_1 + B_1 \\ B_2 - 3B_1 &= -B_1 + 4C_1 \\ C_2 - 3C_1 &= A_1 - 4C_1 \end{cases}$$

Din primele trei ecuații obținem

$$A_2 \in \mathbb{R}, \quad B_2 = -2A_2, \quad C_2 = A_2,$$

iar din ultimele trei ecuații

$$A_1 \in \mathbb{R}, \quad B_1 = A_2 - 2A_1, \quad C_1 = A_1 - C_2.$$

Pentru  $A_1 = 0$  și  $A_2 = 1$ , obținem  $B_2 = -2$ ,  $C_2 = 1$ ,  $B_1 = 1$ ,  $C_1 = -1$ , deci

$$\begin{aligned} x_1 &= te^{-3t} \\ x_2 &= e^{-3t} - 2te^{-3t} \\ x_3 &= -e^{-3t} + te^{-3t} \end{aligned}.$$

Obținem

$$X_{r_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-3t} \\ -e^{-3t} \end{pmatrix}, \quad X_{r_3} = \begin{pmatrix} te^{-3t} \\ -2te^{-3t} \\ te^{-3t} \end{pmatrix}$$

Atunci soluția generală a sistemului este

$$\begin{aligned} X = c_1 X_{r_1} + c_2 X_{r_2} + c_3 X_{r_3} &= \begin{pmatrix} 4c_1 \\ 4c_1 \\ c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c_2 e^{-3t} \\ -c_2 e^{-3t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_3 t e^{-3t} \\ -2c_3 t e^{-3t} \\ c_3 t e^{-3t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4c_1 + c_3 t e^{-3t} \\ 4c_1 + c_2 e^{-3t} - 2c_3 t e^{-3t} \\ c_1 - c_2 e^{-3t} + c_3 t e^{-3t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

deci soluția sistemului este

$$\begin{aligned} x_1 &= 4c_1 + c_3 t e^{-3t} \\ x_2 &= 4c_1 + c_2 e^{-3t} - 2c_3 t e^{-3t} \\ x_3 &= c_1 - c_2 e^{-3t} + c_3 t e^{-3t} \end{aligned}$$