

Normalizarea CNF a formulelor logice

Lect.univ.dr. ȘTEFAN Florentina-Alina

1.1 Noțiuni teoretice

Definiția 1.1.1 *Un literal este o propoziție elementară sau negația unei propoziții elementare. Mulțimea literalilor este $V \cup \neg V$. Dacă $p \in V$ atunci literalii $p, (\neg p)$ se numesc literalii complementari. Literalii din V se numesc literalii pozitivi respectiv literalii din $\neg V$ se numesc literalii negativi.*

Definiția 1.1.2 *Se numește clauză o structură simbolică $k = \bigvee_{i=1}^n L_i$ de tip disjunctiv pentru o mulțime de literalii $\{L_1, \dots, L_n\}$. Clauza corespunzătoare mulțimii vide de literalii se numește clauza vidă și este notată $k = \square$.*

Observația 1.1.1 Pentru $k \neq \square$, mulțimea modelelor clauzei $k = \bigvee_{i=1}^n L_i; n \geq 1$ este evident $\aleph(k) = \bigcup_{i=1}^n \aleph(L_i)$. Conform convențiilor Bourbaki, calculul mulțimii $\aleph(\square)$ revine la reuniune după mulțimea vidă de indici, deci $\aleph(\square) = \emptyset$. Cu alte cuvinte, clauza vidă este invalidabilă.

Definiția 1.1.3 *Se numește formulă normalizată CNF (Conjunctive Normal Form) o structură simbolică $\alpha = \bigwedge_{i=1}^n k_i$ de tip conjunctiv pentru o mulțime de clauze $\{k_1, \dots, k_n\}$. Mulțimea clauzelor $S(\alpha) = \{k_1, \dots, k_n\}$ se numește reprezentare clauzală pentru formula α . Formula CNF corespunzătoare mulțimii vide de clauze se numește formulă vidă și este notată $\alpha = \emptyset$.*

Observația 1.1.2 Dacă $\alpha = \bigwedge_{i=1}^n k_i; n \geq 1$, atunci $\aleph(\alpha) = \aleph(S(\alpha)) = \bigcap_{i=1}^n \aleph(k_i)$. Conform convențiilor Bourbaki, calculul mulțimii $\aleph(\emptyset)$ revine la intersecție după mulțime vidă de indici, deci $\aleph(\emptyset) = \mathfrak{I}$. Cu alte cuvinte, formula vidă este tautologie.

Rezultatul stabilit de următoarea teoremă exprimă faptul că din punct de vedere semantic, se poate presupune întotdeauna că se dispune de reprezentări normalizate CNF pentru formulele limbajului calculului cu propoziții.

Teorema 1.1.1 *Pentru orice $\alpha \in FORM$ există α' formulă normalizată CNF și $\alpha \equiv \alpha'$.*

Demonstrație. Aplicăm succesiv subformulelor formulei α următoarele transformări:
T1. Eliminarea conectivei “ \leftrightarrow ”: Fiecare subformulă de tipul $(\beta \leftrightarrow \gamma)$ se substituie cu

$$((\beta \rightarrow \gamma) \wedge (\gamma \rightarrow \beta)), (\beta \leftrightarrow \gamma) \equiv ((\beta \rightarrow \gamma) \wedge (\gamma \rightarrow \beta)).$$

T2. Eliminarea conectivei “ \rightarrow ”: Fiecare subformulă de tipul $(\beta \rightarrow \gamma)$ se substituie cu

$$((\neg \beta) \vee \gamma), (\beta \rightarrow \gamma) \equiv ((\neg \beta) \vee \gamma).$$

T3. Se aduc negațiile în fața literalilor:

i) Fiecare subformulă de tipul $(\neg(\beta \vee \gamma))$ se substituie cu

$$((\neg\beta) \wedge (\neg\gamma)), (\neg(\beta \vee \gamma)) \equiv ((\neg\beta) \wedge (\neg\gamma)).$$

ii) Fiecare subformulă de tipul $(\neg(\beta \wedge \gamma))$ se substituie cu

$$((\neg\beta) \vee (\neg\gamma)), (\neg(\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\neg\beta) \vee (\neg\gamma)).$$

T4. Eliminarea negațiilor multiple: Fiecare subformulă de tipul $(\neg(\neg\beta))$ se substituie cu

$$\beta, (\neg(\neg\beta)) \equiv \beta$$

T5. Obținerea structurii CNF: Fiecare subformulă de tipul $(\beta \vee (\gamma \wedge \delta))$ se substituie prin

$$((\beta \vee \gamma) \wedge (\beta \vee \delta)), (\beta \vee (\gamma \wedge \delta)) \equiv ((\beta \vee \gamma) \wedge (\beta \vee \delta)).$$

Respectiv $((\gamma \wedge \delta) \vee \beta)$ se substituie prin

$$((\gamma \vee \beta) \wedge (\delta \vee \beta)), ((\gamma \wedge \delta) \vee \beta) \equiv ((\gamma \vee \beta) \wedge (\delta \vee \beta)).$$

Deoarece aplicarea fiecărei transformări determină substituirea unei subformule cu o subformulă semantic echivalentă cu ea, la fiecare etapă se obține o formulă semantic echivalentă cu formula inițială. Rezultă în final o reprezentare normalizată CNF semantic echivalentă cu formula inițială. ■

Exemplul 1.1.1 *Reduceți la CNF formulele*

a) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg r)$

b) $p \vee (\neg q \wedge (r \rightarrow \neg p))$

Soluție

a)

1. $\neg(\neg p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow \neg r)$

2. $\neg(p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg r)$

3. $(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg q \vee \neg r)$

4. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r).$

b)

1. $p \vee (\neg q \wedge (\neg r \vee \neg p))$

2. $p \vee (\neg q \wedge \neg(r \wedge p))$

3. $(p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg(r \wedge p))$

4. $(p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg p)$

Exemplul 1.1.2 *Să se determine forma normal conjunctivă (CNF) pentru formula dată*

$$\alpha = (\neg a \rightarrow b) \rightarrow ((c \rightarrow \neg d) \rightarrow (\neg a \rightarrow d)).$$

Soluție

Forma normal conjunctivă se obține astfel:

1. $\neg(a \vee b) \vee (\neg(\neg c \vee \neg d) \vee (a \vee d))$

2. $(\neg a \wedge \neg b) \vee ((c \wedge d) \vee (a \vee d))$

3. $(\neg a \wedge \neg b) \vee ((c \vee a \vee d) \wedge (d \vee a))$

4. $((\neg a \wedge \neg b) \vee (c \vee a \vee d)) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \vee (d \vee a))$

5. $(\neg a \vee c \vee a \vee d) \wedge (\neg b \vee c \vee a \vee d) \wedge (\neg a \vee d \vee a) \wedge (\neg b \vee d \vee a).$

1.2 Exerciții

TEMĂ: Rezolvați următoarele exerciții:

Exercițiul 1.2.1 *Să se stabilească forma normală conjunctivă (CNF) pentru expresiile logice:*

1) $(a \rightarrow b) \rightarrow c;$

2) $(a \rightarrow b) \vee (b \rightarrow a);$

3) $(\neg a \rightarrow (a \rightarrow b));$

4) $(a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow (a \rightarrow (c \rightarrow b));$

5) $(a \rightarrow b) \rightarrow ((b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow c));$

Exercițiul 1.2.2 *Reduceți la CNF următoarele formule:*

1. $p \rightarrow (q \wedge r)$
2. $(p \vee q) \rightarrow r$
3. $\neg(\neg p \vee q) \vee (r \rightarrow \neg s)$
4. $\neg((p \rightarrow (q \rightarrow r))) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
5. $\neg(((a \rightarrow b) \rightarrow a) \rightarrow a)$
6. $\neg(a \vee (a \rightarrow b))$
7. $((x \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow \neg x)) \rightarrow (\neg y \rightarrow \neg z)$