



Необходимые прививки

Вакцинация – одна из самых важных процедур по уходу за домашними кошками и собаками, поэтому очень важно ознакомиться с календарём прививок

Вакцинация кошек

Для кошек одним из наиболее критичных является прививка против панлейкопении, известной также как кошачья чума. Первую вакцинацию от этого заболевания рекомендуется проводить в возрасте от 8 до 10 недель. Спустя 3-4 недели необходима повторная вакцинация для укрепления иммунитета. В дальнейшем прививка от панлейкопении делается ежегодно, чтобы поддерживать защиту на высоком уровне.

Также крайне важна комбинированная вакцинация против вирусного ринотрахеита и калицивируса, которые являются распространенными возбудителями респираторных заболеваний у кошек. Первая доза этой вакцины вводится в том же возрасте — 8-10 недель, с последующей ревакцинацией через 3-4 недели. Ежегодное обновление прививки обеспечивает постоянную защиту от этих инфекций.

Прививка от бешенства обязательна для всех кошек, независимо от их образа жизни. Обычно ее делают в возрасте от 12 до 16 недель с последней ревакцинацией. Ежегодное повторение процедуры гарантирует безопасность не только животного, но и окружающих людей, учитывая серьезность этого заболевания.

Дополнительно ветеринар может порекомендовать вакцинацию против вируса лейкемии кошек (FeLV), особенно если питомец будет иметь доступ к улице или контактировать с другими животными. Первую прививку от FeLV обычно проводят в 8-10 недель, с повторной дозой через 3-4 недели. Решение о ежегодной ревакцинации принимается на основе образа жизни и состояния здоровья кошки.

Вакцинация собак

Для собак основными являются прививки против ряда опасных заболеваний, таких как чума плотоядных, парвовирусная инфекция, инфекционный гепатит (аденовирус) и парагрипп. Первую вакцинацию против этих заболеваний рекомендуется проводить в возрасте 6-8 недель. Затем следуют дополнительные дозы каждые 3-4 недели до достижения щенком 16-недельного возраста. Ежегодные ревакцинации необходимы для поддержания надежной защиты на протяжении всей жизни собаки.

Прививка от лептоспироза также является важной составляющей вакцинационного плана. Первая доза вводится обычно в 12 недель с последующей ревакцинацией через 3-4 недели. Это заболевание представляет опасность не только для собак, но и для людей, поэтому ежегодное обновление прививки крайне важно.

Вакцинация против бешенства обязательна для всех собак. Ее проводят в возрасте от 12 до 16 недель с последующей ежегодной ревакцинацией. Эта мера необходима для предотвращения распространения этого смертельно опасного заболевания среди животных и людей.

Дополнительно, в зависимости от образа жизни и условий содержания собаки, ветеринар может рекомендовать прививку против бордетеллеза, известного как «кашель питомников». Эта вакцинация особенно актуальна для собак, которые часто контактируют с другими животными, например, посещают площадки для выгула или участвуют в выставках. Первую прививку обычно делают в возрасте 8-16 недель, а дальнейшие ревакцинации проводятся по мере необходимости, зачастую ежегодно.