

离散数学 (2023) 作业 09

周帛岑

221900309

2023 年 3 月 22 日

1 Problem 1

解:

不妨设以 000 开头的二进制串的集合为 A, 以 111 结尾的二进制串的集合为 B

则 $|A| = 2^{n-3}$, $|B| = 2^{n-3}$ 且 $A \cap B = 2^{n-6}$

由容斥原理, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 2^{n-2} - 2^{n-6}$

2 Problem 2

解:

a): 由于 1008 能被 9 整除, 9999 可以被 9 整除故一共有 $(9999-1008)/9+1 = 1000$ 个

b): 由于 1000 可以被 5 整除, 9995 可以被 5 整除, 故可以被 5 整除的一共有 $(9995-1000)/5+1 = 1800$ 个

由于 1001 可以被 7 整除, 9996 可以被 7 整除, 故可以被 7 整除的一共有 $(9996-1001)/7+1 = 1286$ 个

由于 1015 可以被 35 整除, 9975 可以被 35 整除, 故可以被 35 整除的一共有 $(9975-1015)/35+1 = 257$ 个

根据容斥原理, 能被 5 或 7 整除的数共 $1800+1286-257 = 2829$ 个

c): 由于 1000 为偶数, 9998 为偶数, 故偶数一共 $(9998-1000)/2+1 = 4500$ 个

d): 由于 1000 到 9999 一共 9000 个数, 故不能被 5 也不能被 7 整除的数一共 $9000-2829 = 6171$ 个

e): 由题可知, 第一位有除了 0 以外的 9 种选择, 第二位有剩下 9 种选择, 第三位有剩下 8 种选择, 第四位有剩下 7 种选择, 故一共有 $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$ 个

f): 由 b 可知, 这样的数一共有 $1800 - 257 = 1543$ 个

g): 由于 1002 为 3 的倍数, 9999 为 3 的倍数, 故 3 的倍数一共 $(9999 - 1002) / 3 + 1 = 3000$ 个。故不是 3 的倍数的数一共 $9000 - 3000 = 6000$ 个

h): 由 b) 可知, 一共 257 个

3 Problem 3

解: 由题可知, 该子集的子集中一定包含 $\{2, 5\}$ 或 $\{4, 5\}$

1. 该子集的子集中包含 $\{2, 5\}$ 但不包含 $\{4, 5\}$, 剩下一共三个元素中, 4 不在该集合中, 1, 3 有在或不在两种情况, 一共 $2 \times 2 = 4$ 个

2. 该子集的子集中包含 $\{4, 5\}$ 但不包含 $\{2, 5\}$, 剩下一共三个元素中, 2 不在该集合中, 1, 3 有在或不在两种情况, 一共 $2 \times 2 = 4$ 个

3. 该子集的子集中包含 $\{2, 5\}$ 且包含 $\{4, 5\}$, 剩下一共两个元素中, 1, 3 有在或不在两种情况, 一共 $2 \times 2 = 4$ 个

综上, 一共 12 个

4 Problem 4

由题可知, 0 的个数一定大于等于 1 的个数, 故二进制串中至少有 6 个 0

1. 一共 6 个 0, 6 个 1

此时二进制串一共有 $C_7^6 = 7$ 种

2. 一共 7 个 0, 5 个 1

此时二进制串一共有 $C_8^5 = 56$ 种

3. 一共 8 个 0, 4 个 1

此时二进制串一共有 $C_9^4 = 126$ 种

4. 一共 9 个 0, 3 个 1

此时二进制串一共有 $C_{10}^3 = 120$ 种

5. 一共 10 个 0, 2 个 1

此时二进制串一共有 $C_{11}^2 = 55$ 种

6. 一共 11 个 0, 1 个 1

此时二进制串一共有 $C_{12}^1 = 12$ 种

7. 一共 12 个 0

此时二进制串一共有 1 种

综上, 一共 $1+12+55+120+126+56+7 = 407$ 个

5 Problem 5

解:

由题可知, 原命题等价于往总数不超过 31 个的小球中放入 5 个挡板, 将其分为 6 份。

故总方法一共有 $C_5^5 + C_6^5 + \cdots \cdots \cdots + C_{30}^5$ 种

进行化简: 原式 $= C_6^6 + C_6^5 + \cdots \cdots \cdots + C_{30}^5$

又 $C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$

原式 $= C_7^6 + C_7^5 + \cdots \cdots \cdots + C_{30}^5$

$\cdots \cdots \cdots$

$$= C_{30}^6 + C_{30}^5$$

$$= C_{31}^6$$

$$= 736281$$

故一共 736281 种

6 Problem 6

解:

由题可知, 由于可以旋转和翻转, 边角的四个方块之间等价, 两边角所夹的共四个边界方块之间也等价。故一共有 $(2^4/4) * (2^4/4) * 2 = 32$ 种

7 Problem 7

解:

(1): 由题可知, 任取三个顶点, 均可以构成一个三角形, 故一共有 $C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ 个

(2): 由题可知, 此时 n 至少为 6, 要使该三角形不为正 n 边形的边, 则取得的顶点不相邻

原问题可以抽象为往 $n-3$ 个物体中插入三个物体，且每个空中最多插入一个，且首尾不能同时插入物体。

这样的方法一共有 $C_{n-2}^3 - C_{n-4}^1 = \left(\frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} - (n-4)\right)$ 种

8 Problem 8

证：

基础步骤：当 n 取 2 时， $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ，根据并交集的定义，上式显然成立。

归纳步骤：不妨假设 n 取 s 时原式成立，则 n 取 $s+1$ 时

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \left| \bigcup_{n=1}^{s+1} A_i \right| = \left| \bigcup_{n=1}^s A_i \cup A_{s+1} \right| \\
 &= \left| \bigcup_{n=1}^s A_i \right| + |A_{s+1}| - \left| \bigcup_{n=1}^s A_i \cap A_{s+1} \right| \\
 &= \sum_{1 \leq i \leq (k+1)} |A_i| - \sum_{n=2}^k (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \dots \dots \dots \leq i_k \leq s} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \dots \dots \cap A_{i_k}| + \\
 &\quad \sum_{n=1}^{k-1} (-1)^n \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \dots \dots \dots \leq i_n \leq k} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \dots \dots \cap A_{i_k} \cap A_{i(s+1)}| + (-1)^s |A_1 \cap A_2 \cap \\
 &\quad \dots \dots \dots \cap A_s \cap A_{i(s+1)}| \\
 &= \sum_{n=1}^k (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \dots \dots \dots \leq i_n \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \dots \dots \cap A_{i_k}|
 \end{aligned}$$

故 n 取 $s+1$ 时，上式也成立

综上，命题得证

9 Problem 9

解：由题可知， $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6|$ 为：

$$\begin{aligned}
 &|A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5| + |A_6| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_1 \cap A_5| - |A_1 \cap A_6| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| - \\
 &|A_2 \cap A_5| - |A_2 \cap A_6| - |A_3 \cap A_4| - |A_3 \cap A_5| - |A_3 \cap A_6| - |A_4 \cap A_5| - |A_4 \cap A_6| - |A_5 \cap A_6|
 \end{aligned}$$

10 Problem 10