Calcul Intégral II

STEP, MINES ParisTech

12 février 2021 (#7d082cf)

Question 1 (réponse multiple) Si les ensembles $A_k \subset \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$, sont tous mesurables, déterminer quels ensembles dans la liste ci-dessous sont nécessairement mesurables.
□ A: l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ appartenant (au moins) à l'un des A_k , □ B: l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ n'appartenant à aucun A_k , □ C: l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ appartenant exactement à l'un des A_k .
Question 2 (réponse multiple) Une fonction $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est nécessairement intégrable si
 □ A: elle est mesurable, □ B: elle est limite de fonctions mesurables, □ C: elle est mesurable et bornée.
Question 3 (réponse multiple) Si la fonction $f : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$ est intégrable, alors l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq 1\}$ est nécessairement :
 □ A: mesurable, □ B: de longueur finie, □ C: de longueur nulle, □ D: négligeable.
Question 4 (réponses multiple) Si $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont des fonctions mesurables, lister quelles fonctions dans la liste ci-dessous sont nécessairement mesurables.
\square A: $f + g$, \square B: $f \times g$, \square C: $\max(f, g)$, \square D: $g \circ f$.

Question 5 (réponse multiple) Si $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est intégrable sur tout intervalle [-r,r] avec $r\geq 0$ et que

$$\int_{-r}^{r} f(t) dt \to A \in \mathbb{R} \text{ quand } r \to +\infty,$$

alors on peut conclure que f est intégrable sur $\mathbb R$ et d'intégrale A

- \Box A: sans hypothèse supplémentaire,
- \square B: si $|f| \le g$ où $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$ est intégrable, \square C: si

$$\sup_{r\geq 0} \int_{-r}^{r} |f(t)| \, dt < +\infty.$$