


Operación (matemática)

Una **operación matemática** es una biyección sobre una tupla y que obtiene un resultado, aplicando unas reglas preestablecidas sobre la tupla.

1. Una operación matemática, para que sea considerada como tal, siempre tiene que garantizar un resultado, la operaciones que para ciertos valores de la tupla no garantizan un resultado no pueden considerarse operaciones matemáticas propiamente dichas.
2. Una operación matemática ha de dar un único resultado, si para una tupla dada puede presentan más de un resultado, no se puede considerar operación matemática propiamente dicha.

Una característica importante de una operación matemática es el número de terminaos de la tupla: aridad. Siendo la de dos términos: operación binaria de gran importancia.



En álgebra, se usa lo que son las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Una **operación** es la aplicación de un operador sobre los elementos de un conjunto que tiene. El operador toma los elementos iniciales y los relaciona con otro elemento de un conjunto final que puede ser de la misma naturaleza o no; esto se conoce técnicamente como ley de composición.

En aritmética y cálculo el conjunto de partida puede estar formado por elementos de un único tipo (las operaciones aritméticas actúan sólo sobre números) o de varios (el producto de un vector por un escalar engloba al conjunto unión de vectores y escalares que conforman un espacio vectorial).

Dependiendo de cómo sean los conjuntos implicados en la operación con respecto al conjunto considerado principal según nuestras intenciones podemos clasificar las operaciones en dos tipos: internas y externas.

Índice

Propiedades de las operaciones

Orden de las operaciones

Propiedades de la igualdad

Leyes de la igualdad

Leyes de la desigualdad

Regla de los signos

Álgebra abstracta

Operación n -aria

Operación binaria

Operación unaria

Operación 0-aria

Operación externa

Referencias

Bibliografía

Véase también

Enlaces externos

Propiedades de las operaciones

- La operación de adición (+)
 - se escribe $a + b$
 - es conmutativa: $a + b = b + a$
 - es asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - tiene una operación inversa llamada sustracción: $(a + b) - b = a$, que es igual a sumar el Opuesto, $a - b = a + (-b)$
 - tiene un elemento neutro 0 que no altera la suma: $a + 0 = a$
- La operación de multiplicación (×)
 - se escribe $(a \times b)$ o $(a \cdot b)$
 - es una adición repetida $a \times n = a + a + \dots + a$ (n veces)
 - es conmutativa: $(a \cdot b) = (b \cdot a)$
 - es asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
 - se abrevia por yuxtaposición: $a \cdot b \equiv ab$
 - tiene una operación inversa, para números diferentes a cero, llamada división: $\frac{(ab)}{b} = a$
, que es igual a multiplicar por el recíproco, $\frac{a}{b} = a \left(\frac{1}{b} \right)$
 - tiene un elemento neutro 1 que no altera la multiplicación: $a \times 1 = a$
 - es distributiva respecto la adición: $(a + b) \cdot c = ac + bc$
- La operación de potenciación
 - se escribe a^b
 - es una multiplicación repetida: $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n veces)
 - no es ni conmutativa ni asociativa: en general $a^b \neq b^a$ y $(a^b)^c \neq a^{(b^c)}$
 - tiene una operación inversa, llamada logaritmación: $a^{\log_a b} = b = \log_a a^b$

- puede ser escrita en términos de raíz n-ésima: $a^{m/n} \equiv (\sqrt[n]{a^m})$ y por lo tanto las raíces pares de números negativos no existen en el sistema de los números reales. (Ver: sistema de números complejos)
- es distributiva con respecto a la multiplicación: $(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$
- tiene la propiedad: $a^b \cdot a^c = a^{b+c}$
- tiene la propiedad: $(a^b)^c = a^{bc}$

Orden de las operaciones

Para completar el valor de una expresión, es necesario calcular partes de ella en un orden particular, conocido como el *orden de prioridad* o el *orden de precedencia* de las operaciones. Primero se calculan los valores de las expresiones encerradas en signos de agrupación (paréntesis, corchetes, llaves), luego las de exponenciaciones, luego las multiplicaciones y divisiones y, por último, las sumas y las restas.

Propiedades de la igualdad

La relación de igualdad (=) es:

- reflexiva: $a = a$
- simétrica: si $a = b$ entonces $b = a$
- transitiva: si $a = b$ y $b = c$ entonces $a = c$

Leyes de la igualdad

La relación de igualdad (=) tiene las propiedades siguientes:

- si $a = b$ y $c = d$ entonces $a + c = b + d$ y $ac = bd$
- si $a = b$ entonces $a + c = b + c$
- si dos símbolos son iguales, entonces uno puede ser sustituido por el otro.
- regularidad de la suma: trabajando con números reales o complejos sucede que si $a + c = b + c$ entonces $a = b$.
- regularidad condicional de la multiplicación: si $a \cdot c = b \cdot c$ y c no es cero, entonces $a = b$.

Leyes de la desigualdad

La relación de desigualdad (<) tiene las siguientes propiedades:

- de transitividad: si $a < b$ y $b < c$ entonces $a < c$
- si $a < b$ y $c < d$ entonces $a + c < b + d$
- si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$
- si $a < b$ y $c < 0$ entonces $bc < ac$

Regla de los signos

En el producto y en el cociente de números positivos (+) y negativos (-) se cumplen las siguientes reglas:

$$\left| \begin{cases} + \cdot - = - \\ + \cdot + = + \\ - \cdot - = + \\ - \cdot + = - \end{cases} \right.$$

Álgebra abstracta

Una operación f es interna si, tanto los elementos iniciales como los finales pertenecen al único conjunto A .

$$f: A^I \rightarrow A, A^I = A \times A \times \dots^I \times A = \prod_{i \in I} A_i, I \text{ es un conjunto.}$$

Que también puede expresarse:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \xrightarrow{f} b$$

O también:

$$f(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \rightarrow b$$

Según la naturaleza del producto cartesiano inicial de la operación podemos diferenciar:

- *Operaciones finitas* si el conjunto inicial I es producto cartesiano finito.
- *Operaciones infinitas* en caso contrario.

Operación n -aria

Diremos que f es una operación n -aria en el conjunto A , si:

$$\left| f: A^n \rightarrow A \right.$$

a $n \in \mathbb{N}$ se le llama la ariedad o anidad.

Operación binaria

Una operación es binaria cuando n es igual a dos:

$$\begin{aligned} \star: A \times B &\rightarrow C \\ (a, b) &\rightarrow c = a \star b \end{aligned}$$

y también:

$$a \star b \rightarrow c$$

*

$$(a, b) \hat{\rightarrow} c$$

$$\star(a, b) \rightarrow c$$

Ejemplo:

En el conjunto de los números naturales, \mathbb{N} , la operación de adición: $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$, $(N, +)$, con las diferentes expresiones:

1. $a, b, c \in \mathbb{N}, \quad a + b \rightarrow c$
2. $a, b, c \in \mathbb{N}, \quad (a, b) \xrightarrow{+} c$
3. $a, b, c \in \mathbb{N}, \quad +(a, b) \rightarrow c$

donde a y b son los sumandos y c el resultado de la suma.

Operación unaria

Una operación unaria, con un solo parámetro:

$$\star: A \rightarrow B$$

$$a \rightarrow b = \star(a)$$

también suelen denominarse funciones.

Ejemplos:

- Dado el conjunto de los números naturales \mathbb{N} , la operación unaria incremento o siguiente, como:

$$in: N \rightarrow N$$

$$a \rightarrow b = in(a)$$

Donde:

$$in(n) = n + 1 : n \in \mathbb{N}$$

- Dado el conjunto de los números enteros \mathbb{Z} , la operación opuesto, como:

$$op: Z \rightarrow Z$$

$$a \rightarrow b = op(a)$$

esto es:

$$op(e) = -e : e \in \mathbb{Z}$$

Operación 0-aria

Una operación 0-aria es cuando tenemos una operación $f: A^0 \rightarrow A$ es decir:

$$\begin{aligned}\star : \quad \{\emptyset\} &\rightarrow A \\ \emptyset &\rightarrow b = \star(\emptyset)\end{aligned}$$

Ejemplo: Una operación nularia suele devolver constantes, por ejemplo el valor de π :

$$\begin{aligned}\pi : \quad \{\emptyset\} &\rightarrow R \\ \emptyset &\rightarrow a = \pi(\emptyset)\end{aligned}$$

Que asigna a a el valor real del número π .

- Una operación que designa un elemento distinguido de A , en teoría de grupos sería el elemento neutro de un grupo.^{2 3}

Operación externa

Una ley de composición externa sobre un conjunto A con un conjunto B es una aplicación:

$$\begin{aligned}\star : \quad B \times A &\rightarrow A \\ (a, b) &\rightarrow c = a \star b\end{aligned}$$

esta aplicación se dice que es una operación externa.

Ejemplo: Dado el conjunto V_2 de los vectores en el plano y el conjunto de escalares \mathbb{R} de números reales, tenemos que el producto de un número real por un vector en el plano es un vector en el plano:

$$\begin{aligned}\cdot : \quad R \times V_2 &\rightarrow V_2 \\ (a, \vec{v}) &\rightarrow \vec{u} = a \cdot \vec{v}\end{aligned}$$

Dado el vector:

$$\vec{v} = 3i + 6j$$

Si lo multiplicamos por un escalar 3:

$$3 \cdot \vec{v} = 3 \cdot (3i + 6j) = (9i + 18j) = \vec{u}$$

podemos ver que los dos vectores son del plano:

$$(3i + 6j), (9i + 18j) \in V_2$$

Partiendo de los conjuntos A y B distintos, y una aplicación:

$$\begin{aligned}\star : \quad A \times A &\rightarrow B \\ (a, b) &\rightarrow c = a \star b\end{aligned}$$

se dice que también es una ley de composición externa. Por ejemplo el Producto escalar de dos vectores en el plano, da como resultado un número real, esto es:

$$\begin{aligned}\circ : \quad V_2 \times V_2 &\rightarrow R \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\rightarrow a = \vec{u} \circ \vec{v}\end{aligned}$$

Tomando los vectores del plano:

$$\vec{u} = (x_1, y_1)$$

$$\vec{v} = (x_2, y_2)$$

Y siendo su producto escalar:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = (x_1, y_1) \circ (x_2, y_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

Que da por resultado un número real, veamos un ejemplo numérico:

$$\vec{u} = (3, 6)$$

$$\vec{v} = (5, 2)$$

Operando

$$\vec{u} \circ \vec{v} = (3, 6) \circ (5, 2) = 3 \cdot 5 + 6 \cdot 2 = 15 + 12 = 27$$

Referencias

1. Mirsky, Lawrence, 1990, p.72-3
2. J. Barja Perez, pg 7
3. Donald w. Barnes, pg 2

Bibliografía

- J. Barja Pérez. *Álgebras Universales en el Cálculo de Proposiciones*. Universidad de Santiago de Compostela España. 1978.
- Donald W. Barnes, John M. Mack. *Una Introducción Algebraica a la Lógica Matemática*. 1978.
- Lang, Serge *Álgebra lineal* (1975), Fondo educativo interamericano S.A. impreso en Puerto Rico, segunda edición.

Véase también

- Relación matemática
- Correspondencia matemática
- Función matemática
- Propiedades de las operaciones binarias

Enlaces externos

- web que genera operaciones matemáticas (<http://calculomates.com>) en PDF para practicar con ellas.

Obtenido de «[https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci3n_\(matem3tica\)&oldid=141962553](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci3n_(matem3tica)&oldid=141962553)»

Esta p3gina se edit3 por 3ltima vez el 27 feb 2022 a las 20:26.

El texto est3 disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribuci3n Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cl3usulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros t3rminos de uso y nuestra pol3tica de privacidad. Wikipedia® es una marca registrada de la Fundaci3n Wikimedia, Inc., una organizaci3n sin 3nimo de lucro.