

## Paracetamol - Specifikacija leka

### Paracetamol Tablete

#### Uvod

Paracetamol ima analgetski i snizavanje povišene temperature radnje slične onima od aspirina i otuda odgovarajuću alternativu za pacijente osetljiv na aspirin. Za olakšanje od blage da ublaži bol i ima groznicu uslova, eg glavobolju, zubobolju, prehlade, gripa, reumatskih bolova i dysmenorrhoea.

#### Posology i metod administracije

Odraslih, uključujući starije osobe i deca od 12 godina: jedan do dva tablete svakih 4-6 sati po potrebi, maksimalno 8 tableta dnevno u podeljenom dozama.

Deca 6-12 godina: skoro na jednu tabletu svakih 4-6 sati, ako je potrebno, na maksimalno 4 tablete dnevno u podeljenom dozama.

Deca mlađa od 6 godina: nije preporučljivo za djecu ispod 6 godina starosti.

Alternativni prezentacije paracetamola preporučuju se za korišćenje pedijatrijske kako biste dobili odgovarajući doze manje od 250 mg.

#### Metod administracije

Za oralnu administraciju.

#### Kontraindikacije

â€¢ Poznata preosetljivost na paracetamol ili druge biracima u tablete.

#### Posebna upozorenja i preventivne mere za upotrebu

Kod kojih su korisnici dugoročne analgetika (andgt; 3 meseca) sa administracijom svaka dva dana, ili cesce, glavobolja može razviti ili pogorsati. Povećanje doze ne tretirati glavobolju prouzrokovanog preterana upotreba analgetika (MOH lekove preterana glavobolja). U takvim slučajevima, upotreba analgetika trebalo da se obustavi u dogovoru sa doktorom.

#### Oznake upozorenja:

Nemojte prekoraciti preporučenu dozu

Ako simptomi potraju, obratite se doktoru

Stalno van dohvata i pogleda na decu

Ne uzimajte sa neke druge proizvode koji sadrže paracetamol.

Hitna medicinska savet bi trebalo potražiti u slučaju predoziranja, čak i ako ti dobro, zbog rizika od odgodjeno, ozbiljna oštećenja jetre.

#### Interakcija sa drugim medicinske proizvode i drugi oblici interakcija

â€¢ Antikoagulanse - efekat Vorfarina i drugih coumarins može biti potpomognuto proizvedena redovna upotreba paracetamola sa povećanim rizikom od krvarenja. Povremene doze imati značajan uticaj.

â€¢ Metoclopramide â€" može povećati brzinu apsorpcije paracetamola.

â€¢ Pilula domperidona â€" može povećati brzinu apsorpcije paracetamola.

â€¢ Colestyramine â€" može smanjiti apsorpciju ako s obzirom na sat vremena nakon paracetamol.

â€¢ Imatinib - ograničenje ili izbegavanje istovremeni redovne paracetamol upotrebu treba uzeti sa imatinib.

#### Neželjeni efekti

Neželjena dejstva Paracetamol su retki, ali preosetljivosti uključujući osip se može javiti.

Da, bilo je izveštaja o krvi dyscrasias, uključujući thrombocytopenia, neutropenia, zajednicke, leukopenia i agranulocytosis ali to nije nužno uzročnost vezane za Paracetamol

Iznimno rijetkim slučajevima, ozbiljne kozu reakcija je prijavljeno.

#### Izvestavanje o osumnjiceni negativne reakcije

Nakon autorizacije medicinskog proizvoda je vazno, javljam se sumnja negativne reakcije.

Omogućava nastavak nadzora nad korist/rizik ravnoteza proizvoda za medicinske svrhe.

#### Predožiranje

Jetru je moguće kod odraslih koji je uzeo 10g ili više paracetamola. Jedenjem 5g ili više paracetamola može dovesti do oštećenja jetre, ako pacijent ima faktora rizika (vidi dole).

#### Faktori rizika:

##### Ako pacijent

A, na dugi rok tretman sa Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, primidone, rifampicin,

St Johnand #39; s kantaron ili druge droge nego navedu enzimi jetre.

Ili B, redovno konzumira etanola od preporučene iznose.

Ili C, verovatno će biti glutathione iscrpljene npr jede palube, cisticnom fibrozom, HIV-a, gladi, kakeksije.