

Paracetamol - Specifikacija leka

Paracetamol Tablete

Uvod

Paracetamol ima analgetski i snizavanje povišene temperature radnje slične onima od aspirina i otuda odgovarajuću alternativu za pacijente osetljiv na aspirin. Za olakšanje od blage da ublaži bol i ima groznicu uslova, eg glavobolju, zubobolju, prehlade, gripa, reumatskih bolova i dysmenorrhoea.

Posology i metod administracije

Odraslih, uključujući starije osobe i deca od 12 godina: jedan do dva tablete svakih 4-6 sati po potrebi, maksimalno 8 tableta dnevno u podeljenom dozama.

Deca 6-12 godina: skoro na jednu tabletu svakih 4-6 sati, ako je potrebno, na maksimalno 4 tablete dnevno u podeljenom dozama.

Deca mlađa od 6 godina: nije preporučljivo za djecu ispod 6 godina starosti.

Alternativni prezentacije paracetamola preporučuju se za korišćenje pedijatrijske kako biste dobili odgovarajući doze manje od 250 mg.

Metod administracije

Za oralnu administraciju.

Kontraindikacije

â€¢ Poznata preosetljivost na paracetamol ili druge biracima u tablete.

Posebna upozorenja i preventivne mere za upotrebu

Kod kojih su korisnici dugoročne analgetika (andgt; 3 meseca) sa administracijom svaka dva dana, ili cesce, glavobolja može razviti ili pogorsati. Povećanje doze ne tretirati glavobolju prouzrokovanog preterana upotreba analgetika (MOH lekove preterana glavobolja). U takvim slučajevima, upotreba analgetika trebalo da se obustavi u dogovoru sa doktorom.

Oznake upozorenja:

Nemojte prekoraciti preporučenu dozu

Ako simptomi potraju, obratite se doktoru

Stalno van dohvata i pogleda na decu

Ne uzimajte sa neke druge proizvode koji sadrže paracetamol.

Hitna medicinska savet bi trebalo potražiti u slučaju predoziranja, čak i ako ti dobro, zbog rizika od odgodjeno, ozbiljna oštećenja jetre.

Interakcija sa drugim medicinske proizvode i drugi oblici interakcija

â€¢ Antikoagulanse - efekat Vorfarina i drugih coumarins može biti potpomognuto proizvedena redovna upotreba paracetamola sa povećanim rizikom od krvarenja. Povremene doze imati značajan uticaj.

â€¢ Metoclopramide â€" može povećati brzinu apsorpcije paracetamola.

â€¢ Pilula domperidona â€" može povećati brzinu apsorpcije paracetamola.

â€¢ Colestyramine â€" može smanjiti apsorpciju ako s obzirom na sat vremena nakon paracetamol.

â€¢ Imatinib - ograničenje ili izbegavanje istovremeni redovne paracetamol upotrebu treba uzeti sa imatinib.

Neželjeni efekti

Neželjena dejstva Paracetamol su retki, ali preosetljivosti uključujući osip se može javiti.

Da, bilo je izveštaja o krvi dyscrasias, uključujući thrombocytopenia, neutropenia, zajednicke, leukopenia i agranulocytosis ali to nije nužno uzročnost vezane za Paracetamol

Iznimno rijetkim slučajevima, ozbiljne kozu reakcija je prijavljeno.

Izvestavanje o osumnjiceni negativne reakcije

Nakon autorizacije medicinskog proizvoda je vazno, javljam se sumnja negativne reakcije.

Omogućava nastavak nadzora nad korist/rizik ravnoteza proizvoda za medicinske svrhe.

Predožiranje

Jetru je moguće kod odraslih koji je uzeo 10g ili više paracetamola. Jedenjem 5g ili više paracetamola može dovesti do oštećenja jetre, ako pacijent ima faktora rizika (vidi dole).

Faktori rizika:

Ako pacijent

A, na dugi rok tretman sa Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, primidone, rifampicin,

St Johnand #39; s kantaron ili druge droge nego navedu enzimi jetre.

Ili B, redovno konzumira etanola od preporučene iznose.

Ili C, verovatno će biti glutathion iscrpljene npr jede palube, cisticnom fibrozom, HIV-a, gladi, kakeksije.