

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ

Nymphula depunctalis (Guenee)

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ନଳୀପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଏଥିରେ ନଳୀ ଡିଆରି କରେ । ଏହି କୀଟ କଇଁଚିରେ କାଟିବା ପରି ପତ୍ତକ୍ ସମକୋଣରେ କାଟିଥାଏ ।

ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ଏହି କୀଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିଆ ପାଣିଥିବା ଧାନ ଜମି, ଖାଲ ଜମି ବା ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ଫସଲରେ ବେଖାଯାଇଥାଏ । ଛୋଟ ତଳିକୁ ରୋଇବା ଦ୍ୱାର। ଏହି କୀଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ଧାନ କିଆରୀରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ଏହି କୀଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ରାତ୍ରିଚର ଓ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ। ଦ୍ୱାର। ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ନଳୀ ଭିତରେ ରହି ଶୂକ ଦିନବେଳା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଥାଏ । ପରେ ଏହା ନଳୀ ସହିତ ଗଛକ୍ ଯାଇ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ।

କିପରି ଚିହୁଟ କରାଯିବ


ନଳୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖନ୍ତୁ :

- ପାଣି ଉପରେ ପତ୍ରର ନଳୀ ଭାସିବା
- କଇଁଚିରେ କାଟିବା ପରି ପତ୍ର ସବ୍ର ସମକୋଣରେ କଟାଯିବା
- କୀଟଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ପରି ପତଳା ହୋଇଯିବା
- ପତ୍ର ଉପରେ ଜାଲ ହୋଇ ସିଡ଼ି ପରି ବେଖାଯିବା

ନଳୀପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ନଳୀପୋକ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଜାଲ ପରି ପତ୍ର, କଟା ଯାଇଥିବା ପତ୍ର, ପତ୍ର ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କୀଟର ଶୂକ ଥାଇ ଗଛ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଅଥବା ନଳୀ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖକ୍ତୁ ।

କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ
- ଶୀଘ୍ର ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ (୩୦ ଙ୍ଘ ୨୦ ସେ.ମି.) ରୁଅନ୍ତୁ ।
- କିଆରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ଦିନର ତଳି ରଅକ୍ତ । ପତଳା ଭାବେ ରୋଇଲେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ପୁରୁଣା ମୂଳୀ ଫଂସଲ ଚାଷ କରନ୍ତ ।
- ଜୈବ ନିୟନ୍ତଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରତ୍ତୁ : ଗେଞା (କୀଟ ଅଞା ଖାଏ), ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିଡ଼ ଓ ଡିଟିସିଡ ଜଳ କୀଟ (କୀଟର ଶୂକ ଖାଏ), ବୁଡ଼ିଆଣୀ, କଙ୍କି ଏବଂ ଚଢ଼େଇ (ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଖାଏ), ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପଲିହେଡ୍ରୋସିସ୍ ଭୂତାଣୁ (ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୀଟ ନିୟନ୍ତକ)
- କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ/ଅର୍ଗାନେ। ଫସଫେଟ୍ କୀଟନାଶକ ଔଷଧକୁ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଇରେଥିଏଡ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- କିଆରୀରେ ବଉଡ଼ି ଟାଣି କିରୋସିନୀ ମିଶା ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୧.୦ ମି.ଲି. ଇଞ୍ଜୋକ୍ସାକାର୍ବ ୧୪.୫% ଏସସି ମିଶାଇ ସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ ।



ଧାନ ଫସଲ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣାର www.rkbodisha.in





