

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ରୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କବକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ସେସବୁ ହେଲା; **Sarocladium oryzae** ଏବଂ **Sarocladium attenuatum**

ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ବା କେଣ୍ଡା ଆଦୌ ନ ବାହାରିବା ଏବଂ କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ଅଗାଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୁଏ ପାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କେଣ୍ଡାରେ ଧାନ ସଫ୍ଟିଯିବା ଓ ଧାନ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ତୁଳନାରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରୋଗର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ଅଧିକ ବହଳିଆ ଭାବେ ଗଛ ରହିଥିଲେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ମାଧ୍ୟମରେ କବକ ଗଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । କେଣ୍ଡାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଉପରି ଭାଗର ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦ ଏହି କବକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବା କେଣ୍ଡା ଆଦୌ ବାହାରି ନଥାଏ । ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଠାରୁ ପାଳକ ହେବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଲେ ଓ ତାପ ୨୫-୨୮° ସେଲସିୟସ୍ ରହିଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ରୋଗ ଧାନ ଗଛର ଆଜ୍ଞାତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଶସ୍ୟ ଓ ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ଫସଲରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ । ଆଜ୍ଞାତ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଦାଗ ପ୍ରଥମେ କେଣ୍ଡାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଆଜ୍ଞାତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ଅଣ୍ଡାକୃତି ବା ଅନିୟମିତ ଆକାରର ଗାଢ଼ ଲାଲ୍ ସହିତ ବାଦାମୀ ଧାର ଓ ଧୁସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ସବୁଆଡ଼େ ବାଦାମୀ ଧୁସର ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାଗ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିହ୍ନମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ

ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ।

କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞାତ ଭିତରେ ରହେ ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ବାହାରିଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦ ଉପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଧଳାଗୁଣ୍ଡ ପରି କବକ ଜମା ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଭଲ ଭାବେ ବାହାରି ନଥିବା କେଣ୍ଡା ସଫ୍ଟିଯାଏ ଓ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ୍ ବାଦାମୀରୁ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣମାନ ଆଜ୍ଞାତ ପୋଡ଼ା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ରୋଗ ଗଛର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞାତରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଆଜ୍ଞାତ ପୋଡ଼ା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନଥାଏ । ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ତାରୋଗ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ।

- କେଣ୍ଡାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ।
- କେଣ୍ଡା ଆଂଶିକ ବାହାରିଥିବ ବା ଆଦୌ ବାହାରି ନଥିବ
- ଆଜ୍ଞାତ ସଫ୍ଟିଯିବା
- ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦ ଉପରେ ଧଳାଗୁଣ୍ଡ ପରି କବକ ଜମି ରହିବ ।
- କେଣ୍ଡା ନ ବାହାରିବ ।



ଉପର ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦରେ ଅନିୟମିତ ଦାଗ



ପତ୍ରାଞ୍ଚାଦ ସତ୍ତା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପ୍ରଭାବିତ



ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ



କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

- ଆଜ୍ଞାତ ସଡ଼ାରୋଗ ଏକ ବିହନବାହିତ ରୋଗ । ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ନିରୋଗା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଜମିରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । କୀଟମାନେ ଗଛରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କବକ ଗଛରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟାଗରେ କବକ ରହିଥାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀଫଳକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦାର ମୂଳକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨୦ ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ବୁଦା ପିଛା ୩ଟି ଡଳି ରୁଅନ୍ତୁ ।
- ପିଲ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କାଲସିଅମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଫଫଲରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ଥିରାମ ବା କାପଟାନ୍ ଆଦି କବକନାଶକ ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଓ ଥୋଡ଼ି ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଫଫଲରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୨.୫ ଗ୍ରାମ ଇପ୍ରୋଡିନ ୨୫% + କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୨୫ % ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଫଫଲରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।



ବାଗବୃତ୍ତିକ ବାହାମା ହୋଇଥାଏ

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫଫଲ ପଛତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର www.rkbodisha.in

ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ



ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଧାରିତ ଫଫଲ ପଛତିର ଉତ୍ପାଦିକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି

Website: www.rkbodisha.in , Email: contact@rkbodisha.in

