

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ

Oryseolia oryzae (Wood-mason)

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

କାହାଳିଆ ପୋକ ତଳ ଭାଗରେ ପିଲକୁ ଗୋଲାକାର ନଳୀ ପରି କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରାଚ୍ଛାବ ଅଧିକ ଲୟ ହୋଇ ପିଆଜ ଶଣ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ଜଳସେଚିତ ବା ଅଣଜଳସେଚିତ ଖାଲ ଜମିରେ ତାଷ କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ଫସଲର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାଳିଆ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଡିପ ଜମି ଓ ଅତି ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ତିଚର ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତଣ କରାଯାଇପାରେ । ଖରାଦିନେ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟୁପା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପିଲ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମେଘୁଆ ପାଗ ବା ବର୍ଷା ପାଗ, ଅଧିକ ପିଲ ହେଉଥିବା କିସମ ବ୍ୟବହାର, ସଘନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶତୁ କୀଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାଳିଆ ପୋକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

କିପରି ଚିହୁଟ କରାଯିବ

- କାହାଳିଆ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣମାନ ହେଲା :
- ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲର ମୂଳ ଭାଗରେ ଫମ୍ଫା ସ୍ଥାନ ଓ ନଳ ପରି ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ । ନଳଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପିଆଜ ଶଣ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯାଏ ।
- ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲରେ ପତ୍ର ହୋଇ ନଥାଏ ଓ ଏଥିରେ କେଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ
- ବିକୃତ, ଝାଉଁଳିଥିବା ଓ ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ହୋଇଥାଏ
- ପତ୍ରାଚ୍ଛାବ ଲୟ ହୋଇ ପିଆଜ ଶଣ୍ଟା ପରି ହୁଏ
- ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏ

ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ପତ୍ର ବିକୃତ ହେବା, ଝାଉଁଳିବା ଓ ମୋଡ଼ି ହେବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ମରୁଡ଼ି, ପୋଟାସିଅମ ଅଭାବ, ଲବଣତା, ଛିନ୍ନ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ ଓ ତୁଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଧାନର ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ପାଇଁ କୀଟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ । ବିଶେଷ କରି ଲୟା ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୀଟର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୂକ ଗଛର ବଡ଼ନ୍ତ। ଅଂଶକୁ ଖାଉଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ।



କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- କୀଟ ପ୍ରତିରୋଧି କ୍ଷମତା ଥିବା ବିହନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତ ।
- ପ୍ରଣା ମଳୀ ଫସଲକ୍ ହଳ କରି ଦିଅନ୍ତ ଓ ଅଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ଗଛକ୍ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତ ।
- ଜୈବ ନିୟନ୍ଦ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ : ପ୍ଲାଟିଗାଞ୍ଚରିଡ଼, ଯୁପେଲମିଡ଼ ଓ ଟେରୋମାଲିଡ଼ ବିରୁଡ଼ି (ଶୂକ ଖାଇଥାଏ); ଫାଇଟୋସେଲିଡ଼ ଅଷ୍ଟପଦୀ (ଅଣ୍ଡା ଖାଏ); ବୃଢ଼ିଆଣୀ (ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଖାଏ) ।
- ପୁତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୨.୫ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇସି ବା ୧.୬ ମି.ଲି. ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରକ୍ତ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତ :

ଧାନ ଫସଲ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣର www.rkbodisha.in



