

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ

Brevennia rehi (Lindirger)

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ବହିଆ ପୋକର ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଓ ନିମ୍ପ୍ ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଫଲରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୁଏ ଓ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ଶୁଖିଲା ପାଗ ଓ କିଆରୀରେ ଅନାବନା ଘାସର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କୀଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ନିଗିଡ଼ା ଜମି ଏହି କୀଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଅଣଜଳସେଚିତ ଢିପ ଜମିରେ ବହିଆ ପୋକ ବେଖାଯାଏ । ଏହା ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଉତ୍ତରେ ଏହା ଅଧକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଖାଯାଇଥାଏ ।

ନିମ୍ଫ୍ରୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଈ କୀଟ ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି ।ଏବଂ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଧିରେ ଧିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପରିବାହିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପତ୍ତାଚ୍ଚାଦ ଓ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହି ରସ ଶୋଷନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶୂକ ଅବସ୍ଥା ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି । ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ମାଈ କୀଟ ଗଛ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଈ କୀଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗଛକୁ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କୀଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ।



ବହିଆ ପୋକ



ଦହିଆ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି

କିପରି ଚିହୁଟ କରାଯିବ

ବହିଆ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣମାନ ହେଲା :

- ଗଛ ଝାଉଁଳିବା
- ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା
- ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା
- ଗଛ ମଳରେ ଧଳା ବହି ଲାଗିବା ପରି ବେଖାଯାଏ ।

ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଏକାପରି ହୋଇ ନଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଯଥା ଚେର ଗ୍ରବ୍ ଓ ଧାନ ଚେର ଜଉପୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ଲକ୍ଷଣ ବେଖା ବେଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୀଟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

- ହଳଦିଆରୁ ପାଟଳ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚା
- ଧୂରେ ଚାଲୁଥିବା ନିମ୍ପ, ପକ୍ଷହୀନ ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଈ ପୋକ ଏବଂ ପକ୍ଷଥିବା ହଳଦିଆ ପୁରୁଷ କୀଟ ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷିବା
- ଅଞା, ନିମ୍ଫ୍ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଉପରେ ମହମ ପରି ଆବରଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- ଜୈବ ନିୟନ୍ତକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରକୁ : କ୍ଷୁଦ୍ର ଏନ୍ସିର୍ଟିଡ଼ ବିରୁଡ଼ି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, କ୍ଲୋରୋପିଡ଼ ମାଛି, ଡ୍ରୋସୋଫିଲିଡ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପୀ ଭୂଙ୍ଗଂ
- ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ଠ.୨ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋଗ୍ଜାମ ୨୫ ଡବଲୁଜି ମିଶାଇ ସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣର www.rkbodisha.in



