

## ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ

***Naphalocrocis medinalis***

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ଶୁଳ୍କ ଧାନ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଚାରି ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ପତ୍ରଧାରକୁ ରେଖାମାନ ଡାକ୍ତରୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏମାନେ ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହି ପତ୍ରକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ପତ୍ର ଉପରେ ସିଧାଭାବେ ଧଳା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦାଗମାନ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହା କେଉଁଠି ଓ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ

ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି କୀଟର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । କିଆରୀରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଛାଇ ଜାଗା ଥିଲେ ଏବଂ ଧାନ କିଆରୀ ଓ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକ ଅନାବନା ଘାସ ରହିଥିଲେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ ହେବା, ବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବା ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ପରେ କୀଟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଦି ଏହି କୀଟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ ।

ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏହା ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଛାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୀଟ ବର୍ଷତମାମ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଏହା ମେ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରିତର ଓ ଦିନବେଳା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାଇଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି । ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧୁଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ।

## କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ :

- ଆକାଶ ପତ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ
- ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ନଳ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ
- ବେଳେବେଳେ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ପତ୍ରର ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ
- ଅଧିକ ଆକାଶ କିଆରୀରେ ଅନେକ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଫସଲ ପୋଡ଼ିଯିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ

ପିଲ ହେବାଠାରୁ ଫୁଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ କୀଟର ଉପସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ :

- ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଣ୍ଡା
- କଞ୍ଚି ଆସୁଥିବା ପତ୍ରର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ଶୁଳ୍କ ଖାଇବା
- ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଶୁଳ୍କ ରହିଥିବା
- ଗଛରେ କୀଟର ମଳ ପଡ଼ିଥିବା

## କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ :

- କୀଟ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷମତା ଥିବା ବିହନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କିମ୍ବା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ରଖନ୍ତୁ ।
- ପୁରୁଣା ମୂଳୀ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଜମିକୁ ହଳ କରନ୍ତୁ ।
- କିଆରୀ ଓ ହୁଡ଼ାରୁ ଘାସ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ବହଳରେ ରୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସୁଷମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ କିଆରୀରେ ଗୋଟିଏ କଂଟାୟୁକ୍ତ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଦେଲେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ଖୋଲିଯାଏ ଓ କୀଟର ଶୁଳ୍କମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ କୀଟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
- ଧାନ ରୋଇବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୭-୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୩ ଥର ଏକର ପ୍ରତି ୫୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଲକୋଗ୍ରାମ୍ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୦.୪ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରଫୋସଫୋରସ୍ ୧୮.୫% ଏସିସି ବା ୨ ଗ୍ରାମ କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଏସିସି ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ନିଜ ଅଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ରୋଗପୋକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପଛତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର [www.rkbodisha.in](http://www.rkbodisha.in)



ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଧଳା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦାଗ



ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ନଳୀ ହେବା



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣାରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଦାଗ ଦ୍ୱାରା କୀଟକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ