

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ସରୁ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ବା ସର୍କୋସ୍ପୋରା ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ଏକ କବକ *Sphaerulina Oryzina* (Syn. *Cercospora janseana*, *Cercospora oryzae*) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ସରୁ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ପତ୍ର, ପତ୍ରାଙ୍ଗୁଳ ଓ କେଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ।

ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଅସମୟରେ ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରାଙ୍ଗୁଳ ମରିଯାଇଥାଏ, ଶସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହୁଏ ଏବଂ ଗଛ

ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗଛ ଜଳି ପଡ଼େ । **ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ**

ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ନିଉ ଗିନିର କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଂଶରେ ସରୁ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ପଟାସ ଅଭାବ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ୨୫ ରୁ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍‌ସିଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

ଧାନ ଫସଲ କେଣ୍ଡା ହେବା ଅବସ୍ଥା ପରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଫସଲ ପାକଳ ହେବା ବେଳକୁ କ୍ଷତିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।



ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର

କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ନିମ୍ନ ଦାଗମାନଙ୍କୁ ନଜର କରନ୍ତୁ:

- ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରାଙ୍ଗୁଳର ଉପରି ଭାଗରେ ପତ୍ରଶିରା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ସରୁ ଦାଗମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦାଗର ଲମ୍ବ ୨-୧୦ ମି.ମି. ଏବଂ ଓସାର ୧-୧.୫ ମି.ମି. ହୋଇଥାଏ ।
- ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିସମରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ସରୁ ଶୁଖିଲା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।
- ଧାନ ଚଷ୍ମ ଉପରେ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଦାଗଠାରୁ ଓସାରିଆ ଅଟେ । ପେଡ଼ିକଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।
- ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ପତ୍ରାଙ୍ଗୁଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ “ନେଟ୍ ବ୍ଲକ୍” କୁହାଯାଏ । କାରଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାଦାମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମ ବାଦାମୀରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜାଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

ସରୁ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ୱେତ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସରୁ ଦାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।



ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ୱେତ, ସରୁ ଓ ଧାଡ଼ିରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ

କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧିକ୍ଷମତା ଥିବା କିସମ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିହନ କିସମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କିଆରାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- ଜମି ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରୁ ଘାସ ଏବଂ ବାଲୁଙ୍ଗା ଗଛ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଫସଲକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବକ ପାଇଁ ବିକଳ ପୋଷକ ମିଳିବ ନାହିଁ ।
- ସୁସମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବ ।
- ଧାନ କିଆରୀ ପାଇଁ ସରୁ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଲେ, ଥୋଡ଼ା ହେବା ଠାରୁ କେଣ୍ଡା ହେବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ୍ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ କାପଟାନ ୭୫% ସେଚିଡି ଗୁଣ୍ଡ ବା ୪ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋପିନେବ ୭୦% ସେଚିଡି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପକ୍ଷି ଆଧାରିତ ଜ୍ୱାଳ ଭଣ୍ଡାର www.rkbodisha.in



ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଧାରିତ ଫସଲ ପକ୍ଷିର ଉତ୍ପାଦିକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି

Website: www.rkbodisha.in , Email: contact@rkbodisha.in

