

Apuntes de Botánica

Semestre 2023-2

Pablo González Calderón

Arquitectura de plantas leñosas

07 de agosto de 2023

Glosario

Plantas perennes Presentan crecimiento ilimitado, debido a la mantención de tejido embrionario o meristemático en las yemas.

Módulo Es todo lo que proviene de una yema (i.e. tallos con hojas y flores).

Módulo vegetativo Tallos con hojas.

Módulo reproductivo Flor o inflorescencia.

Yema Estructuras morfológicas que tienen por función proteger una zona responsable del crecimiento de la planta: el meristema.

Yema axilar Se encuentran en la posición (nudo) de la hoja. Su número *se aproxima* al número de hojas de la planta.

Yema apical Se encuentran al final del tallo.

Nudos Zonas donde están las hojas en un tallo.

Entrenudos Distancia entre los nudos.

Brácteas Son hojas modificadas que protegen a la yema.

Tallo Posee un solo eje.

Rama Es una composición de tallos

Afolios Tallos sin hojas.

Hojas filiformes Hojas muy delgadas, con forma de aguja (e.g. las hojas de pino).

Las plantas tienen una diversidad de formas de crecer. En general, en un ambiente determinado encontramos distintas formas de paisaje debido a las adaptaciones evolutivas que las plantas del entorno han sufrido (**selección natural**) para *sobrevivir y reproducirse*. Usualmente las presiones evolutivas que sufren las plantas se manifiestan en (a) las formas de las plantas y (b) las características morfológicas y fisiológicas de estas.

Ejemplo / Caso

Ejemplos de adaptaciones, son resistencia a los fuertes vientos, la máxima conservación y utilización del agua, o la supervivencia a climas nevados.

En este sentido, es importante entender que la supervivencia de una planta se maximiza con la fotosíntesis (mayor luz solar y mayor intercambio gaseoso favorecerán la supervivencia).

A pesar de que las especies de plantas son todas diferentes y han evolucionado de manera diferente, es posible identificar **patrones anatómicos generales** entre ellas.

Ejemplo / Caso

A grandes rasgos, se sabe que las plantas han evolucionado desde (1) plantas vasculares sin semillas, a (2) gimnospermas y, finalmente, a (3) angiospermas. Dentro de este proceso, además, es relevante considerar que ocurrió la deriva continental, incidiendo en la evolución de las plantas.

Las plantas perennes son aquellas que poseen un crecimiento ilimitado debido a que conservan tejido meristemático en sus yemas. Estas, además, se pueden clasificar en **vegetativas** (ramas con hojas) y

reproductivas (flores). En este contexto, además, entenderemos las ramas como un conjunto de tallo + hojas + yemas, siendo estas últimas capaces de originar una nueva rama.

Al producto del desarrollo de una yema lo denominaremos **módulo arquitectónico**. Cuando una yema genera una flor o una espina, deja de haber meristema y, por tanto, desde ese módulo no podrá seguir el crecimiento vegetativo.

Cuando se estudia la «arquitectura» de una planta, en realidad se estudia la *forma* que adquieren las plantas. Las diferencias que se hayan en esta *forma* se deben a la manera en la que crecen las plantas mismas: periódicamente se van formando **módulos**. De esta forma, **las plantas son entidades modulares**. Cada módulo tiene su origen en una **yema**.

Las yemas se pueden clasificar según su función en **vegetativas** (crecimiento ilimitado - *perenne*), **reproductivas** (crecimiento limitado) o **mixtas** (contiene tanto partes con funciones vegetativas como partes con funciones reproductivas); y según su localización en **axilares** o **apicales**.

1. Yemas vegetativas («de renuevo»)

Por dentro, se encuentran los **primordios foliares** que formarán las futuras hojas, usualmente encerrados por las brácteas. Dan origen a los **módulos vegetativos**.

1.1. Módulos vegetativos

Son tallos con hojas, los cuales se pueden subdividir en **dolicoblastos** y **braquiblastos**. La principal fuente para diferenciar ambos es su *morfología y su función*; siempre serán distintas en la misma planta.

1.1.1. Dolicoblastos

Son tallos con hojas largos, con entrenudos alejados y visibles a simple vista. Es la rama responsable de la arquitectura basal de la planta y de mantener su crecimiento ilimitado. Pueden tener hojas alternadas, opuestas o verticiladas.

Clasificación de las hojas según su distribución

Si hay solo una hoja por nudo, se denominan **alternas**. Cuando hay dos hojas por nudo, se llaman **opuestas**. Y cuando hay tres o más hojas por nudo, se denominan **verticiladas**.

Ejemplo / Caso

Una planta trepadora se caracteriza por crecer ilimitadamente por su meristema apical o yema terminal.

1.1.2. Braquiblasto

Son tallos con hojas cortos, con entrenudos estrechos que no son viisbles a simple vista. Dentro de los braquiblastos se hallan los **braquiblastos absolutos** (no pueden volver a crecer, pues agotan todo su meristema) y los **braquiblastos temporales** (pueden volver a crecer en la siguiente temporada).

Braquiblastos temporales

Pueden originar otro braquiblasto como él (**mesoblasto**), una flor sin usar todas sus yemas, un dolicoblasto en su yema apical, o extender sus entrenudos y pasar a ser un dolicoblasto.

Braquiblastos absolutos

Sus yemas pueden dar origen a espinas (**braquiblasto absoluto espinoso**) o pueden dar origen a flores o inflorescencias (**braquiblasto absoluto folioso** – consultar Sección 2.1).

Ejemplo / Caso

Una espina es un braquiblasto absoluto. Sabemos que una espina puede ser un **tallo** cuando viene de una yema axilar; y que puede ser una **hoja modificada** si sobre ella hay una yema. Existen casos especiales, empero, donde la espina no proviene de la yema ni tampoco es una hoja modificada (e.g. las espinas de la rosa).

En el caso de las cactáceas, las espinas son hojas modificadas, permitiendo que las yemas puedan dedicarse a otras funciones.

2. Yemas reproductivas

Por dentro tienen los **primordios florales**, junto con todos los componentes internos de una flor. Dan origen a los **módulos reproductivos**.

2.1. Módulos reproductivos

Las flores son, esencialmente, ramas que han sido modificadas para poder maximizar la reproducción sexual (a través de polinizadores como las abejas). Se pueden producir dos situaciones: el crecimiento de una flor solitaria (simplemente **flor**), o el crecimiento de varias flores a partir de la misma yema (**inflorescencia**).

A su vez, las inflorescencias se dividen en **inflorescencias cimosas** (a.k.a. determinadas; las flores crecen *basípetamente* –desde el ápice hacia la base) e **inflorescencias racemosas** (a.k.a. indeterminadas; las flores crecen *acrópetamente* –desde la base hacia el ápice).

Además, las inflorescencias cimosas pueden subdividirse en 3 situaciones generales:

1. **Monocasio:** El eje principal termina en una flor y desarrolla una sola ramificación florífera lateral (comportamiento que se repite en esta última, al igual que en las nuevas ramas que genere).
2. **Dicasio:** El eje principal termina en una flor y desarrolla dos ramas laterales floríferas (comportamiento que se repite en estas últimas, al igual que en las nuevas ramas que generen).
3. **Pleocasio:** El eje principal termina en una flor y desarrolla tres o más ramas laterales floríferas, las cuales, presentan este mismo comportamiento.

3. Yemas mixtas

Originan tallos cuyas yemas axilares y/o apical producen flores durante **la misma** temporada de crecimiento.

4. Origen de un módulo

Cuando hablamos del origen de un módulo, podemos aludir a:

1. La yema que lo origina: apical o axilar
2. El módulo que lo origina: dolicoblasto (edad), o braquiblasto (edad).

5. Protección de las yemas

Para proteger una yema, existen al menos 4 mecanismos:

1. Mediante **escamas** o **brácteas**.
2. A través de las hojas mismas.
3. Con espinas.
4. Mediante **estípulas**.

6. Clasificación de leñosas según la vida de las hojas

La vida de las hojas usualmente presenta dos tipos de comportamiento, causando que las leñosas puedan clasificarse como:

- **Deciduos o caducos:** Las hojas viven menos de un año (se caen).
- **Siempreverdes:** Las hojas viven más de un año y luego se caen.

6.1. Morfología de ramas de árboles deciduos

Existen dos situaciones particulares que marcan la morfología de las ramas de los árboles deciduos:

1. **Cuando las hojas se caen**, aún se conserva la yema axilar, pero queda una **cicatriz foliar** (donde estaba la hoja –más específicamente su *pleciolo*) y una **cicatriz vascular** (donde estaban las vascularizaciones –xilema y floema– que iban hacia la hoja).
2. **Cuando la yema apical se desarrolla**, quedan **cicatrices bracteales**, «anillos» perpendiculares alrededor del tallo.

Glosario

Tallo acaule a (sin) + *caule* (tallo). Se usa para mencionar plantas con tallos muy cortos, como si prácticamente no existiesen.

Variedad vegetal Representa a un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de la especie, que presenta una serie de características comunes.

Tallo suculento Tipo de tallo que almacena una gran cantidad de agua o nutrientes en su interior como método de supervivencia.

Mucilago Sustancia vegetal viscosa. Es una solución acuosa espesa de una goma o dextrina utilizada para suspender sustancias insolubles y para aumentar la viscosidad.

Raíces adventicias Raíces que no se forman del embrión de la semilla.

Tallo plagiótropo Tallo de crecimiento horizontal.

Tallo ortótropo Tallo de crecimiento vertical

Brotes epígeos Brote que saldrá a la superficie, dando origen a un tallo aéreo.

Las yemas de renuevo siempre van en el tallo

Hoy vamos a estudiar todo lo que es «hierba», las plantas que muchas veces cocinamos en nuestras casas (hortalizas). Las plantas herbáceas se diferencian de las plantas leñosas en que

- (a) Tienen más **células parenquimáticas** que **vasos xilemáticos** y **fibras esclerenquimáticas**
- (b) Desarrollan menor cantidad de tejido con paredes lignificadas

A pesar de ello, tienen en común con las plantas leñosas en que también son estructuras modulares.

Se pueden dividir en tres grupos, según su tiempo de crecimiento: limitado (anuales y bianuales –todas sus yemas florecen) e ilimitado (perennes –quedan yemas vegetativas en el tallo).

1. Plantas anuales

Crece durante una **única estación de crecimiento**, la cual puede ser un conjunto de meses. En este lapso, hacen tanto crecimiento vegetativo como reproductivo, donde todas sus yemas terminan transformándose en flor (i.e. **no dejan yemas de renuevo**).

El único lugar donde queda un yema de renuevo de la planta es en la **semilla**.

2. Plantas bianuales

Crece durante **dos períodos de crecimiento**, siendo **uno vegetativo y el otro de florecimiento**. Al igual que con las plantas anuales, todas sus yemas terminan transformándose en flor y las únicas yemas de renuevo quedan en la semilla.

También se caracterizan por tener **tallos acaules**.

2.1. Hortalizas

La gran mayoría son plantas modificadas genéticamente (no confundir con transgénicos). Usualmente se presentan en un gran número de **variedades** y corresponden, en general, a **plantas acaules con ciclo más corto, pero agradables al paladar**. Hay tanto anuales como bianuales.

Ejemplo / Caso

Un ejemplo de familia que presenta varias varieades es la familia *Brassica oleracea*, a la cual pertenecen la coliflot, el brócoli, las coles de bruselas, colirrábano, etc.

Muchas veces, las diferencias más notables entre varieadades puede ser el color (su pigmentación). En este sentido, es importante recordar que los **pigmentos antocianos** (que dan color) siempre van ubicados en las vacuolas de las células

2.2. Plantas transgénicas

Por otro lado, a diferencia de una planta modificada genéticamente, una **planta transgénica** es una planta cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética. Como consecuencia, la planta transgénica muestra una nueva característica.

En Chile está prohibida la venta de alimentos transgénicos. Únicamente está permitida la exportación de semillas a mercados del hemisferio norte. A nivel mundial, el 99% de los productos transgénicos producidos son algodón, maíz, soya, canola y arroz.

3. Plantas perennes

Dejan yemas de renuevo en órganos que almacenan mucho material nutritivo para rebrotar en la «época favorable».

4. Diferenciación morfológica por la variabilidad en la estructura foliar

Morfológicamente, la **base** de la hoja es la encargada de unir el **peciolo** al tallo. A su vez, el peciolo se encarga de unir la **lámina** a la base.

La variabilidad en forma y tamaño de estas estructuras da origen a distintos tipos de plantas.

Así, por ejemplo, las cebollas poseen más desarrollada la base y la lámina que el peciolo; o el apio posee más desarrollado su peciolo.




Figura 1: Estructura básica de la hoja

5. Morfología de tallos herbáceos

Son aquellos que no tienen adición de madera, debido a que viven menos de un año (condición para que no sea una planta leñosa). Los tallos pueden clasificarse de la siguiente manera:

Aéreos	Subterráneos
<ul style="list-style-type: none">• Dolicoblastos• Braquiblastos• Volubles (plantas trepadoras)• Espinas• Zarcillos (caulomáticos y filomáticos)• Filóclados• Cladodios	<ul style="list-style-type: none">• Tubérculos• Rizomas• Cormos• Bulbos<ul style="list-style-type: none">• Tunicados• Lobulados• Escamosos

- Estolones
- Comprimidos (plantas acaulales)

Los tallos aéreos se caracterizan por tener hojas «normales» (para hacer fotosíntesis), y también contener a los órganos reproductivos (flores o inflorescencias); mientras que los subterráneos tienen hojas modificadas, y, usualmente, almacenan nutrientes para que la planta pueda sobrevivir en un periodo desfavorable.

De esta manera, si una planta tiene tallos subterráneos y aéreos, ante malas condiciones ambientales, pueden morir los tallos aéreos, quedando solo los tallos subterráneos. Y estos permitirán que la planta vuelva a crecer cuando las condiciones vuelvan a ser favorables.

Se debe hacer la distinción, no obstante, de que **los tallos aéreos en las herbáceas son los que no viven más de un año., pero no así los tallos subterráneos.**

5.1. Tallos volubles

Este tipo de tallos se caracteriza por

- (a) Tienen escasa lignificación
- (b) No pueden mantenerse erguidos por sí solos (les falta **lignina** o fibra)
- (c) Engrosan parejamente
- (d) Portan hojas y yemas
- (e) Tienen un xilema escasamente desarrollado

Además, estos tallos se caracterizan porque evolucionaron su manera de crecer en forma helicoidal, con la ayuda de un «tutor» natural o entregado por un agricultor. Por lo anterior, pueden crecer o enrollarse en sentido horario (**dextrógiro**) o antihorario (**levósgiro**), dependiendo de la especie. Además, este tallo voluble puede, eventualmente, transformarse en un tallo leñoso **si dura más de un año**, convirtiéndose en una **liana**.

Observación. A fin de cuentas, el crecimiento helicoidal es un mero mecanismo para trepar. También pueden emplear **espinas retrorsas** («miran» hacia abajo), **raíces aéreas** o **zarcillos** (caulomáticos y filomáticos).

5.2. Zarcillos

Mientras que el tallo voluble es un tallo «normal» que se enrolla, un zarcillo es una estructura independiente (un tallo especializado o una hoja especializada –zarcillo caulomático y filomático, respectivamente) para enrollarse y trepar.

El zarcillo será herbáceo o leñoso dependiendo de la planta. Por ejemplo, será herbáceo en plantas como el zapallo y todas las *cucurbitaceas*; pero será leñoso en plantas como la vid (*vitaceae*).

5.2.1. Zarcillos caulomáticos

Estos zarcillos provienen del tallo de la planta, y poseen las siguientes características:

- (a) Proviene de yemas axilares
- (b) Pueden ser simples o ramificados
- (c) **No** portan ni hojas ni yemas
- (d) Permiten asirse a la planta

Como no tienen ni hojas ni yemas tienen un **crecimiento limitado**. Por lo tanto, se pueden clasificar como un tipo de braquiblasto absoluto.

5.2.2. Zarcillo filomático

Estos zarcillos provienen de una hoja (del **nervio medio** de la hoja –son una hoja modificada). Su diferencia con el caulomático es que no proviene de una yema axilar.

Observación. Para que el zarcillo filomático sea leñoso, la planta tiene que ser siemprevive (vivir más de un año).

5.3. Filóclados

Esencialmente, son tallos con forma de hoja. Usualmente se halla en plantas en ambientes fríos y sombríos, por eso su forma busca maximizar la fotosíntesis. Poseen las siguientes características:

- (a) Portan una hoja modificada (escama o bráctea) con una yema reproductiva
- (b) Los tallos normales también presentan escamas o brácteas con yemas vegetativas, que luego generarán un tallo modificado (filóclado)
- (c) Los tallos normales se generan desde un **rizoma**

Ejemplo / Caso

Ruscus sp. es una planta que posee tres tipos de tallos: normales, filóclados y rizomas.

5.4. Cladodios

Es un tallo fotosintetizador almacenador de agua (posee un parénquima acuífero –en su interior, el **mucilago** es la sustancia que absorbe y retiene el agua en la vacuola). Poseen las siguientes características:

- (a) Tallos suculentos almacenadores de agua
- (b) Portan hojas transformadas en espinas
- (c) Las espinas (hojas) se disponen en braquiblastos temporales llamado **areólas**
- (d) Los braquiblastos temporales pueden originar un nuevo dolicoblasto, o flores

5.5. Tallos aéreos comprimidos (plantas acaules)

Son tallos con entrenudos muy cortos. Estos tallos dan origen a las plantas acaules y poseen las siguientes características generales:

- (a) Los poseen las plantas herbáceas bianuales con un solo tallo, o también las herbáceas perennes
- (b) Es un tallo comprimido con hojas dispuestas en una **roseta basal**
- (c) Poseen una yema apical reproductiva que origina una inflorescencia en la segunda estación de crecimiento en la *mayoría* de las veces. (e.g. de excepción es la frutilla)
- (d) Tienen hojas normales u hojas modificadas
- (e) Pueden ser aéreos o subterráneos
- (f) Pueden tener **raíces adventicias** o raíces no adventicias

Las **hemicriptófitas** («semi - escondidas») son las plantas acaules con tallo (comprimido) aéreo. Las **criptófitas** («escondidas») son las plantas acaules con tallo (comprimido) subterráneo.

5.6. Estolones

Sirven para el proceso de reproducción *asexual* de ciertas plantas, también denominado **reproducción vegetativa**, donde se producen clones genéticos de una planta madre. Poseen las siguientes características:

- (a) Tienen **tallo plagiótropo**
- (b) Se generan de las yemas axilares de una planta acaule
- (c) Portan hojas transformadas en escamas o brácteas (su función principal **no** es la fotosíntesis)

- (d) Generan **brotos** de la planta madre desde sus yemas axilares o apicales
- (e) Los brotes pueden generar raíces adventicias y, con esto, independizarse de la planta madre
- (f) La planta madre porta hojas normales y produce flores

Si una planta que puede reproducirse por estolones proviene de un cigoto (producto de una flor fecundada –reproducción sexual), entonces se le denomina **genet**. Si esta planta, a través de los estolones, se reproduce asexualmente, entonces sus **clones** se llaman **ramet**.

5.7. Rizomas

Sus principales características son:

- (a) Son tallos plagiótropos subterráneos
- (b) Son tallos engrosados que almacenan nutrientes
- (c) Sus hojas corresponden a escamas o brácteas
- (d) Poseen crecimiento ilimitado
- (e) Generan raíces adventicias
- (f) De sus yemas se generan dos tipos de tallos: (1) aéreos con hojas y flores, y (2) subterráneos (otros rizomas)

Pueden presentar dos formas de crecimiento: **simpodial** o **monopodial**.

5.7.1. Crecimiento simpodial

Se da cuando de las yemas axilares crece un nuevo rizoma y, en el nuevo rizoma, su yema apical generará el brote aéreo que florecerá.

5.7.2. Crecimiento monopodial

Se da cuando el rizoma siempre crece por las yemas apicales, mientras que las yemas axilares solo generan **brotos epigeos**.

5.8. Tubérculos

Poseen las siguientes características:

- (a) Son tallos donde se almacenan sustancias de reserva
- (b) **Solo tienen yemas axilares**
- (c) Las yemas axilares generan tallos aéreos, que, en sus bases, generarán raíces adventicias
- (d) Desde la base de los tallos aéreos saldrán tallos plagiótropos subterráneos, los cuales **agotan su yema apical**. Al agotarse, el extremo más alejado del tallo dará origen a un nuevo tubérculo

5.9. Cormos

Poseen las siguientes características:

- (a) Son tallos subterráneos
- (b) Están engrosados para almacenar nutrientes
- (c) Presentan hojas que corresponden a escamas
- (d) Poseen crecimiento limitado
- (e) Generan raíces adventicias
- (f) De sus yemas se generan dos tipos de tallos: (1) aéreos con hojas y flores de la yema apical, y (2) subterráneos (cormos) de las yemas axilares

5.10. Bulbos tunicados

Poseen las siguientes características:

- (a) Almacenan nutrientes en la parte basal de sus hojas (hojas modificadas llamadas **catáfilos**)

- (b) Los catáfilos pueden ser **reservantes** o suculentos si sirven para almacenar nutrientes, o **protectores** o fibrosos si se encuentran en la parte externa del bulbo
- (c) Tienen crecimiento limitado
- (d) En la base hay un tallo comprimido, del cual se desarrollan las raíces adventicias
- (e) Su yema apical es reproductiva
- (f) Desarrollan raíces adventicias

Ejemplo / Caso

Un conocido ejemplo de bulbo tunicado es la cebolla, donde lo que comemos corresponde, efectivamente al bulbo, desechando cualquier tallo aéreo que pueda salir de él.

5.11. Bulbo lobulado

Se caracterizan por:

- (a) Almacenar sustancias de reserva en yemas axilares desarrolladas («diente» o lóbulo)
- (b) Cada yema axilar tiene sus propios catáfilos almacenadores y protectores. Y todos están protegidos por fuera por otros catáfilos protectores
- (c) Tener crecimiento ilimitado
- (d) En la base hay un tallo comprimido, del cual se desarrollan las raíces adventicias
- (e) Desarrollar raíces adventicias

Ejemplo / Caso

Un conocido ejemplo de bulbo lobulado es el ajo, donde la parte que comemos es, efectivamente, una yema axilar.

6. Hipocotilo

A veces, consumimos otras partes de la planta. Los hipocotilos son una mezcla entre la raíz y el tallo, es decir, a la **parte basal del tallo**. Así, en estas especies hay un engrosamiento del tallo y, en mayor o menor medida, también un engrosamiento de la raíz.