

# Prerequisitos y preliminares Hungerford

Pablo Brianese

16 de agosto de 2021

**Teorema 1** (4.1). Sea  $A$  un conjunto no vacío. Dada una relación de equivalencia  $R \subseteq A \times A$ , definimos sus clases de equivalencia como  $\bar{a} = \{b \in A : (a, b) \in R\}$  para cada  $a \in A$ , y definimos el cociente de  $A$  por  $R$  como  $A/R = \{\bar{a} : a \in A\}$ . La asignación  $R \mapsto A/R$  define una biyección entre el conjunto  $E(A)$ , formado por todas las relaciones de equivalencia  $R$  sobre  $A$ , y el conjunto  $Q(A)$ , formado por todas las particiones de  $A$ .

**Teorema 2** (5.2). Sea  $\{A_i : i \in I\}$  una familia de conjuntos indexada por  $I$ . Entonces existe un conjunto  $D$ , junto con una familia de aplicaciones  $\{\pi_i : D \rightarrow A_i | i \in I\}$  con la siguiente propiedad: para cualquier conjunto  $C$  y familia de aplicaciones  $\{\phi_i : C \rightarrow A_i | i \in I\}$ , existe una única aplicación  $\psi : C \rightarrow D$  tal que  $\pi_i \psi = \phi_i$  para todo  $i \in I$ . Más aún,  $D$  queda determinado unívocamente salvo una biyección.

$$\begin{array}{ccc} C & & \\ \downarrow \phi & \searrow \phi_i & \\ D & \xrightarrow{\pi_i} & A_i \end{array}$$

**Teorema 3** (6.2 Recursion). Si  $S$  es un conjunto,  $a \in S$  y para cada  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n : S \rightarrow S$  es una función, entonces existe una única función  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow S$  tal que  $\phi(0) = a$  y  $\phi(n+1) = f_n(\phi(n))$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Para cada  $N \in \mathbb{Z}$ , denotamos  $[N] = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq N\}$ .

*Demostración.* Sea  $\mathcal{N}$  el conjunto de los  $N \in \mathbb{N}$  tales que existe una única función  $\phi_N : [N] \rightarrow S$  que verifica la condición recursiva  $\phi_N(n+1) = f_n(\phi_N(n))$  para todo  $n \in [N-1]$ , y la condición base  $\phi_N(0) = a$ .

En un principio  $0 \in \mathcal{N}$ . En efecto, aquí la condición  $\phi_0(0) = a$  determina unívocamente a la función  $\phi_0 : \{0\} \rightarrow S$ ; y la condición recursiva sobre  $\phi_0$  es vacua porque  $[-1] = \emptyset$ .

Supongamos, inductivamente, que  $N \in \mathcal{N}$ . Entonces existe una única función  $\phi_N : [N] \rightarrow S$  tal que  $\phi_N(0) = a$  y verifica la condición recursiva. Definimos  $\phi_{N+1} : [N+1] \rightarrow S$  como  $\phi_{N+1}(n) = \phi_N(n)$  para  $n \in [N]$ , e imponemos  $\phi_{N+1}(N+1) = f_N(\phi_N(N))$ . Entonces por construcción  $\phi_{N+1}(0) = a$ , y  $\phi_{N+1}$  verifica la condición recursiva. Para probar la unicidad de  $\phi_{N+1}$  suponemos que  $\psi : [N+1] \rightarrow S$  es cualquier función que verifique la condición recursiva y la condición base. Si restringimos  $\psi$  al conjunto  $[N]$  obtenemos una función que satisface la condición recursiva y la condición base. Por hipótesis inductiva  $\psi|_{[N]} = \phi_N$ . La condición recursiva para  $\psi$  dice que  $\psi(N+1) = f_N(\psi(N))$ . Pero probamos  $\psi(N) = \phi_N(N)$ . Entonces  $\psi(N+1) = f_N(\phi_N(N))$ . Por lo tanto  $\psi = \phi_{N+1}$ . En conclusión  $N+1 \in \mathcal{N}$ .

Por inducción, para todo  $N \in \mathbb{N}$  existe una única función  $\phi_N : [N] \rightarrow S$  tal que  $\phi_N(0) = a$  y  $\phi_N(n+1) = f_n(\phi_N(n))$  para todo  $n \in [N-1]$ . La propiedad de unicidad las hace compatibles, es decir que  $\phi_N|_{[M]} = \phi_M$  si  $M \leq N$ . Esta compatibilidad nos permite afirmar que la unión de sus gráficas,  $\bigcup_{N \in \mathbb{N}} \text{gr}(\phi_N)$ , es la gráfica de una función  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow S$  tal que  $\phi(0) = a$  y  $\phi(n+1) = f_n(\phi(n))$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . La unicidad de esta gran  $\phi$  es consecuencia de la unicidad de las pequeñas  $\phi_N$  con  $N \in \mathbb{N}$ .  $\square$

*Demostración.* Construiremos una relación  $R \subseteq \mathbb{N} \times S$  que resulte igual a la gráfica de una función  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow S$  con las propiedades deseadas. Sea  $\mathcal{G}$  el conjunto formado por todos los subconjuntos  $Y$  de  $\mathbb{N} \times S$  tales que

$$(0, a) \in Y \quad \forall (n, x) \in Y, (n+1, f_n(x)) \in Y \quad (1)$$

Entonces  $\mathcal{G} \neq \emptyset$  dado que  $\mathbb{N} \times S \in \mathcal{G}$ . Sea  $R = \bigcap \mathcal{G}$  (definida como la intersección de los elementos  $Y$  de la familia  $\mathcal{G}$ ); entonces  $R \in \mathcal{G}$ . Sea  $M$  el subconjunto de  $\mathbb{N}$  que consiste de todos los  $n \in \mathbb{N}$  para los cuales existe un *único*  $x_n \in S$  tal que  $(n, x_n) \in R$ . Probaremos  $M = \mathbb{N}$  usando inducción. Si  $0 \notin M$ , entonces existe  $(0, b) \in R$  con  $b \neq a$  y el conjunto  $R \setminus \{(0, b)\}$  está en  $\mathcal{G}$ . Consecuentemente  $R = \bigcap \mathcal{G} \subseteq R \setminus \{(0, b)\}$ , lo cual es una contradicción. Por lo tanto,  $0 \in M$ .

Supongamos, inductivamente, que  $n \in M$  (es decir,  $(n, x_n) \in R$  para un único  $x_n \in S$ ). Una consecuencia simple es que  $(n+1, f_n(x_n)) \in R$ . Dado  $(n+1, c) \in R$  con  $c \neq f_n(x_n)$ , consideremos el conjunto  $R' = R \setminus \{(n+1, c)\}$ . Nuestro objetivo será probar que  $R' \in \mathcal{G}$  para llegar a un absurdo. Observemos que  $(0, a) \in R'$  porque  $(0, a) \in R$  y  $(0, a) \neq (n+1, c)$ . Además, para todo par  $(m, x_m) \in R'$ , con  $m \neq n$ , tenemos por un lado que  $(m, x_m) \in R$  implica  $(m+1, f_m(x_m)) \in R$ ; y por el otro que  $m \neq n$  implica  $(m+1, f_m(x_m)) \neq (n+1, c)$ . Es decir que  $(m+1, f_m(x_m)) \in R'$  para todo  $(m, x_m) \in R'$  con  $m \neq 0$ . Finalmente, para todo par  $(n, x) \in R'$  se tiene  $(n, x) = (n, x_n)$ . Por lo tanto,  $R' \notin \mathcal{G}$  solo es posible si existe un par  $(n, x) \in R'$  tal que  $(n+1, f_n(x)) \notin R'$ . Pero  $(n, x) \in R'$  implica  $(n, x) \in R$ , y por hipótesis inductiva se deduce  $(n, x) = (n, x_n)$ . Luego  
( ) Es decir, suponemos que o bien  $(0, a) \notin R'$  o bien existe  $(m, x_m) \in R'$  tal que  $(m+1, f_m(x_m)) \notin R'$ .

□