

25.

ca) Fórmula de Rodrigues: $[L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n \cdot e^{-x})]$

$$L_2(x) = \frac{e^x}{2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 e^{-x}) = \frac{e^x}{2} \frac{d}{dx} (2x e^{-x} - x^2 e^{-x})$$

$$= \frac{e^x}{2} [(2e^{-x} - 2x e^{-x}) - (2x e^{-x} - x^2 e^{-x})]$$

$$= \frac{e^x}{2} [2e^{-x} - 2x e^{-x} - 2x e^{-x} + x^2 e^{-x}]$$

$$= \frac{1}{2} (2 - 2x - 2x + x^2) = \frac{1}{2} (x^2 - 4x + 2)$$

$$\hookrightarrow L_2(x) = \frac{1}{2} (x^2 - 4x + 2)$$

(b) Encontrar raíces $[x_0, x_1]$ del Polinomio $[L_2(x)]$ de orden 2.

$$\text{Ceros: } L_2(x) = 0 = \frac{1}{2} (x^2 - 4x + 2) = \frac{1}{2} x^2 - 2x + 1$$

$$0 = \frac{1}{2} x^2 - 2x + 1, \text{ Fórmula Cuadrática: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(\frac{1}{2})(1)}}{2(\frac{1}{2})} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 2}}{1} = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\underline{x_0 = 2 - \sqrt{2}}, \quad \underline{x_1 = 2 + \sqrt{2}}$$

$$\text{Raíces: } x_0 = 2 - \sqrt{2}, \quad x_1 = 2 + \sqrt{2}$$

(c) Encontrar Pesos de la Cuadratura integrando las bases cardinales con la función de peso de Laguerre $\theta(x) = e^{-x}$

$$w_0 = \int_0^\infty \theta(x) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) dx, \quad w_1 = \int_0^\infty \theta(x) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) dx$$

$$w_0 = \int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{x - (2 + \sqrt{2})}{2 - \sqrt{2} - (2 + \sqrt{2})} \right) dx = \int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{x - 2 - \sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\infty} e^{-x} (2 + \sqrt{2} - x) dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \left\{ (2 + \sqrt{2}) \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} dx}_{I_1} - \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} x dx}_{I_2} \right\}$$

$$I_1 = -[e^{-x}]_0^{\infty} = [e^{-x}]_0^{\infty} = \left[\frac{1}{1} - 0 \right] = \underline{1}$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} x e^{-x} dx \quad \begin{matrix} u=x, & dv=e^{-x}dx \\ du=dx, & v=-e^{-x} \end{matrix}$$

$$= [-x e^{-x}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -e^{-x} dx = [x e^{-x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx$$

$$= \left[\frac{(0)}{e^{(0)}} - \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^a} \right] + [-e^{-x}]_0^{\infty} = \left[-\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{e^a} \right] + [e^{-x}]_0^{\infty}$$

$$= \left[\frac{1}{e^{(0)}} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} \right] = \underline{1}$$

$$\hookrightarrow W_0 = \frac{\sqrt{2}}{4} ((2 + \sqrt{2})(1) - (1)) = \frac{\sqrt{2}}{4} (1 + \sqrt{2}) = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2} + 2}{4}}}$$

$$W_0 = \frac{x_1}{4} = \frac{\sqrt{2} + 2}{4}$$

$$W_1 = \int_0^{\infty} e^{-x} \left(\frac{x - (2 - \sqrt{2})}{2 + \sqrt{2} - (2 - \sqrt{2})} \right) dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{x - 2 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} dx$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{ (\sqrt{2} - 2) \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_0^{\infty} x e^{-x} dx}_{I_2} \right\} \quad \begin{matrix} I_1 = 1 \\ I_2 = 1 \end{matrix}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} [(\sqrt{2} - 2)(1) + (1)] = \frac{\sqrt{2}}{4} [\sqrt{2} - 1] = \underline{\underline{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}}}$$

$$W_1 = \frac{x_0}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

Pesos:

$$W_0 = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} = \frac{x_1}{4}, \quad W_1 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} = \frac{x_0}{4}$$

(d) Mostrar que la regla es exacta para Polinomio de grado 3.
 $f(x) = x^3 \rightarrow \int_0^\infty e^{-x} x^3 dx = \sum_{i=0}^1 w_i f(x_i)$

1. $\sum_{i=0}^1 w_i f(x_i)$.

dado: $x_0 = 2 - \sqrt{2}$, $x_1 = 2 + \sqrt{2}$

$w_0 = \frac{x_1}{4}$, $w_1 = \frac{x_0}{4}$

$\sum_{i=0}^1 w_i f(x_i) = w_0 f(x_0) + w_1 f(x_1) = \frac{x_1}{4} (x_0)^3 + \frac{x_0}{4} (x_1)^3$
 $= \frac{1}{4} ((2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})^3 + (2-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})^3)$

$= \frac{1}{4} [(2+\sqrt{2})(2^3 + 3(2^2)(-\sqrt{2}) + 3(2)(-\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^3) + (2-\sqrt{2})(2^3 + 3(2^2)(\sqrt{2}) + 3(2)(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^3)]$

$= \frac{1}{4} [(2+\sqrt{2})(8 - 12\sqrt{2} + 12 - 2\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2})(8 + 12\sqrt{2} + 12 + 2\sqrt{2})]$

$= \frac{1}{4} [(2+\sqrt{2})(20 - 14\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2})(20 + 14\sqrt{2})]$

$= \frac{1}{4} [40 - 28\sqrt{2} + 20\sqrt{2} - 28 + 40 + 28\sqrt{2} - 20\sqrt{2} - 28] = \frac{1}{4} [80 - 56]$

$= \frac{1}{4} [24] = \underline{\underline{6}}$

2. $\int_0^\infty e^{-x} x^3 dx = \Gamma(x)$

La función gamma es una extensión del concepto de Factorial a los números reales, y por definición, es la siguiente:

$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$, donde $\Gamma(x) = (x-1)!$

Entonces, Según la función gamma:

$\int_0^\infty e^{-x} x^3 dx = (3)! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = \underline{\underline{6}}$

Por lo tanto, Como $\left[\sum_{i=0}^1 w_i f(x_i) = 6\right]$ y $\left[\int_0^{\infty} e^{-x} x^3 dx = 6\right]$
Fueron mostrados anteriormente, se muestra que la
regla de cuadratura de Laguerre es exacta para
un polinomio de grado 3 $[f(x) = x^3]$ y es exactamente $[6]$.