Predicción de la pCR en resonancia DCE de mama

Pablo Jiménez Girardeau


Aprendizaje automático

Curso 2026-2027

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

¿Se puede anticipar la pCR antes del tratamiento?



PRE
antes del contraste

EARLY
contraste temprano

LATE
contraste tardío

Realce
EARLY − PRE

tiempo desde la inyección del contraste

El mismo corte de la paciente ISPY1_1155. La señal del tumor está en la diferencia entre fases: en el realce, el tumor se ilumina. Esta paciente alcanzó la pCR.

pCR

Respuesta patológica completa


Tras la quimioterapia previa a la cirugía no queda tumor invasivo. Saberlo antes permitiría plantear desescalar el tratamiento.

29 % de las 1.273 pacientes de tres cohortes (Duke, I-SPY1, I-SPY2) alcanzan la pCR

Un modelo que dijera siempre «no pCR» acertaría el **71 %**: el reto es demostrar que la red aprende.

Objetivo
Una CNN propia, entrenada desde cero, que estime la probabilidad de pCR solo con la imagen de antes del tratamiento.

Una CNN propia de 106.001 parámetros, entrenada desde cero



Entrada	Recorte central	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Media global	Densa	Salida
3 × 256 × 256 PNG en gris ÷ 255 3 momentos, no RGB	3 × 128 × 128	16 × 64 × 64	32 × 32 × 32	64 × 16 × 16	128 × 8 × 8	128	64, dropout 0,5	1 neurona, sigmoide
		cada bloque: conv 3 × 3, BatchNorm, ReLU y max pooling 2 × 2						
Parámetros **106.001**		464	4.672	18.560	73.984	0	8.256	65


Punto de partida
Red de referencia del caso: 105.761 parámetros. Casi no aprendía: AUC ≈ 0,55.

+ BatchNorm
Sin ella apenas aprendía: en dos folds se quedaba con la primera época.

Tamaño
Menos filtros o dos convoluciones por bloque no mejoraron; detalle en la siguiente.

+ Recorte 128 × 128
El tumor está en el centro: mejoró los 5 folds y quitó los sobreentrenados.

Casi todo cae en el ruido: el límite es la señal, no la red



Diferencia de AUC de validación frente a la configuración de partida de cada prueba, con su IC 95 %. **Azul: adoptado.**

Solo dos salen del ruido

El recorte mejora (+0,018) y conv + conv empeora (−0,016).

El resto cae dentro del ruido

Cambiar la semilla mueve el AUC hasta 0,02 en la media y 0,06 en un fold.

El límite es la señal

Más o menos capacidad, atención al tumor, subtipo o regularización: nada añade señal a un corte 2D.

Por paciente

Todos los cortes de una paciente van al mismo grupo (0 en común) y su probabilidad es la media de sus ~10 cortes.

5 folds y test aparte


1.097 pacientes en 5 folds (219 cada uno, la validación). 176 de test, evaluadas una sola vez.

Cómo se decidió

Fold a fold, con el IC de la diferencia. BatchNorm y la tasa baja se adoptaron por las curvas, no por el AUC.

Parada temprana y decisiones tomadas solo con la validación

AUC por paciente en cada época (fold 3, semilla 42)



Adam, tasa $3 \cdot 10^{-5}$, lotes de 128; 5 folds × 3 semillas = 15 redes.
Parada: AUC suavizado con media móvil de 3 épocas; se para tras 10 épocas sin mejorar.

AUC de validación por fold

0,586 ± 0,020

de 0,558 a 0,605 en los 5 folds


Todas las pacientes juntas

0,573

IC 95 %: 0,53-0,61 (azar: 0,5)

De dónde sale el umbral

F1 equilibrada en validación, según el umbral



Por qué paro en la época 21


Después, el entrenamiento sigue subiendo y la validación no: lo que mejora es memorizar. Me quedo con la red de ese momento, no con la última.

Umbral elegido: 0,316

Es el que maximiza la F1 equilibrada en validación: la media de la F1 de pCR y la de no pCR, que no premia decir siempre «no». Con él, detecta el 41 % de las pCR y acierta el 70 % de las no pCR.

La imagen tiene señal, pero débil: los datos clínicos predicen más


Test: 176 pacientes, evaluado una sola vez



AUC con su IC 95 %. En validación la CNN dio 0,573: el test no bajó.

	pred. no	pred. pCR
real no	93	30
real pCR	37	16

	precisión	recall	F1
pCR	0,35	0,30	0,32
no pCR	0,72	0,76	0,74
media	**0,53**	**0,53**	**0,53**
siempre «no pCR»	0,35	0,50	0,41



Paciente de entrenamiento con pCR (ISPY1_1155): el modelo le da 0,313, a 0,003 del umbral. La app avisa de que la decisión es ajustada.

pablojimenezgirardeau.github.io/Caso-Cancer-de-mama

Uso educativo, sin validez clínica.

Limitaciones

- Señal débil: con 176 pacientes, el intervalo roza el 0,5.
- Un solo corte 2D: se pierde la forma del tumor.
- Sensible al brillo y al escáner.

En resumen

La imagen de antes del tratamiento tiene señal, pero débil. Con un solo corte no basta para decidir sobre una paciente.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Thank you!
Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

UAX Universidad Alfonso X el Sabio