

Lògica en la Informàtica

Definició de la Lògica de Primer Ordre (LPO)

José Miguel Rivero Robert Nieuwenhuis

Dept. Ciències de la Computació
Facultat de Informàtica
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Tardor 2022



Una fórmula F "EXPRESSA" coses: les propietats dels seus models.

Continguts: p4.pdf

- Exercicis: 21, 22, 23
 - 21 Expressar límit inferior de la mida dels models
 - 22 Expressar mida infinita del models
 - 23 Existència de models de mida superior
- Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)
- Exercicis de LPOI: 24, 26, 27, 28, 32



21. (dificultat 3) Dona una fórmula F_3 tal que tot model de F_3 tingui almenys 3 elements. Generalitza-ho a n qualsevol.
Ajuda: defineix la propietat reflexiva d'un símbol de predicat binari p , i a més expressa que hi ha parells d'elements e_i i e_j en el domini tals que $p_i(e_i, e_j) = 0$.

Comencem així. Sigui F la fórmula:

$$\forall x p(x, x) \quad (\text{reflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\exists x \exists y \neg p(x, y)$$

Qualsevol model I de F tindrà almenys DOS elements:

$$D_I = \{e_1, e_2\}$$

$$p_I(e_1, e_1) = 1 \quad (\text{PER REFLEXIVITAT})$$

$$p_I(e_1, e_2) = 0$$

$$p_I(e_2, e_1) = 0$$

$$p_I(e_2, e_2) = 1 \quad (\text{PER REFLEXIVITAT})$$



Definició de la Lògica de Primer Ordre

21. (dificultat 3) Dona una fórmula F_3 tal que tot model de F_3 tingui almenys 3 elements. Generalitza-ho a n qualsevol.
Ajuda: defineix la propietat reflexiva d'un símbol de predicat binari p , i a més expressa que hi ha parells d'elements e_i i e_j en el domini tals que $p_I(e_i, e_j) = 0$.

Comencem així. Sigui F la fórmula:

$$\forall x p(x, x) \quad (\text{reflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\exists x \exists y \neg p(x, y)$$

Perquè si hi hagués només un:

$$D_I = \{e_1\}$$

tindriem

$$p_I(e_1, e_1) = 1 \quad (\text{PER REFLEXIVITAT})$$

i no es compliria la part $\exists x \exists y \neg p(x, y)$.



Definició de la Lògica de Primer Ordre

21. (dificultat 3) Dona una fórmula F_3 tal que tot model de F_3 tingui almenys 3 elements. Generalitza-ho a n qualsevol.
Ajuda: defineix la propietat reflexiva d'un símbol de predicat binari p , i a més expressa que hi ha parells d'elements e_i i e_j en el domini tals que $p_I(e_i, e_j) = 0$.

Ho podem generalitzar a tres o més elements, així:

Sigui F la fórmula:

$$\forall x p(x, x) \quad (\text{reflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\exists x \exists y \exists z (\neg p(x, y) \wedge \neg p(x, z) \wedge \neg p(y, z))$$



Definició de la Lògica de Primer Ordre

21. (dificultat 3) Dona una fórmula F_3 tal que tot model de F_3 tingui almenys 3 elements. Generalitza-ho a n qualsevol.
Ajuda: defineix la propietat reflexiva d'un símbol de predicat binari p , i a més expressa que hi ha parells d'elements e_i i e_j en el domini tals que $p_I(e_i, e_j) = 0$.

I en general per a mínim n elements en el domini:

$$\forall x p(x, x) \quad (\text{reflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\exists x_1 \dots \exists x_n (\neg p(x_1, x_2) \wedge \neg p(x_1, x_3) \wedge \dots \wedge \neg p(x_{n-1}, x_n))$$

(una fórmula de mida quadràtica)



Definició de la Lògica de Primer Ordre

22. (dificultat 5) Escribeu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació "ser estrictament menor que" i expressa (entre altres coses) que "no hi ha màxim" tal com ocorre en els naturals.

Definició: un **ordre estricte** és una relació binària irreflexiva i transitiva.Useu un símbol binari p que té aquestes dues propietats.Sigui F la fórmula:

$$\forall x \neg p(x, x) \quad (\text{irreflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\forall x \forall y \forall z (p(x, y) \wedge p(y, z) \rightarrow p(x, z)). \quad (\text{transitivitat})$$

equivalentment: $\forall x \forall y \forall z (\neg p(x, y) \vee \neg p(y, z) \vee p(x, z))$



Definició de la Lògica de Primer Ordre

22. (dificultat 5) Escribeu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació "ser estrictament menor que" i expressa (entre altres coses) que "no hi ha màxim" tal com ocorre en els naturals.

Sigui F la fórmula:

$$\forall x \neg p(x, x) \quad (\text{irreflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\forall x \forall y \forall z (p(x, y) \wedge p(y, z) \rightarrow p(x, z)). \quad (\text{transitivitat})$$

En qualsevol model I de F , tenim que p_I és una relació d'ordre estricte sobre D_I .Això fa que necessitem que D_I sigui infinit en qualsevol model I de F ?No, perquè tindriem el model de F :

$$D_I = \{a\}$$

$$p_I(a, a) = 0$$



Definició de la Lògica de Primer Ordre

22. (dificultat 5) Escribeu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació "ser estrictament menor que" i expressa (entre altres coses) que "no hi ha màxim" tal com ocorre en els naturals.

Per això afegim: $\forall x \exists y p(x, y)$ a la nostra F :

$$\forall x \neg p(x, x) \quad (\text{irreflexivitat})$$

$$\wedge$$

$$\forall x \forall y \forall z (p(x, y) \wedge p(y, z) \rightarrow p(x, z)) \quad (\text{transitivitat})$$

$$\wedge$$

$$\forall x \exists y p(x, y) \quad (\text{"existència de successors"})$$

Per què aquesta F només té models infinits?

► Reducció a l'absurd.



22. (dificultat 5) Escriu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació “ser estrictament menor que” i expressa (entre altres coses) que “no hi ha màxim” tal com ocorre en els naturals.

Suposem que existís un model finit I , amb:

$$D_I = \{e_1 \dots e_k\}$$

Per la part $\forall x \exists y p(x, y)$, necessito que

$p_I(e_1, e) = 1$ per a algun element “ e ” de D_I . Diguem-li e_2 a aquest element e .

També necessito

$p_I(e_2, e) = 1$ per a algun element “ e ” de D_I . No pot ser e_2 , ni tampoc e_1 : tindriem $p_I(e_1, e_2)$ i $p_I(e_2, e_1)$ i per transitivitat tindriem $p_I(e_1, e_1)$ que contradiu la irreflexivitat. Per tant, el successor de e_2 ha de ser un element al qual podem anomenar e_3 .



22. (dificultat 5) Escriu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació “ser estrictament menor que” i expressa (entre altres coses) que “no hi ha màxim” tal com ocorre en els naturals.

Suposem que existís un model finit I , amb:

$$D_I = \{e_1 \dots e_k\}$$

També necessito

$p_I(e_3, e) = 1$ per a algun element “ e ” de D_I . Per les mateixes raons, no pot ser e_3 ni e_2 , ni tampoc e_1 .



22. (dificultat 5) Escriu una fórmula F tal que si $I \models F$ llavors D_I té infinits elements. Ajuda: pensa en la relació “ser estrictament menor que” i expressa (entre altres coses) que “no hi ha màxim” tal com ocorre en els naturals.

Suposem que existís un model finit I , amb:

$$D_I = \{e_1 \dots e_k\}$$

Una vegada hem entès això, (per inducció) podem demostrar (no ho farem aquí) que no podem introduir “cicles” en la relació p_I , del tipus:

$$p_I(e_1, e_2) \wedge p_I(e_2, e_3) \wedge \dots \wedge p_I(e_n, e_1)$$

La qual cosa ens porta a una contradicció, perquè... qui serà el successor de e_k ?

Ningú!



Definició de la Lògica de Primer Ordre

23. (dificultat 5) Demostra que si una fórmula té models amb n elements, també té models amb m elements per a qualsevol $m \geq n$ i fins i tot models infinits.

Això és una altra manera de dir que NO podem expressar amb una fórmula F , que els models de F tindran com a màxim 2 elements, o com a màxim k elements, per a alguna k .



Definició de la Lògica de Primer Ordre

23. (dificultat 5) Demostra que si una fórmula té models amb n elements, també té models amb m elements per a qualsevol $m \geq n$ i fins i tot models infinits.

Exemple de com “clonar” un element “ a ” de D_I : tinc p de aritat 2, i tinc la interpretació I amb:

$$D_I = \{a, b\}$$

$$p_I(a, a) = 1$$

$$p_I(a, b) = 0$$

$$p_I(b, a) = 1$$

$$p_I(b, b) = 0$$



Definició de la Lògica de Primer Ordre

23. (dificultat 5) Demostra que si una fórmula té models amb n elements, també té models amb m elements per a qualsevol $m \geq n$ i fins i tot models infinits.

Sigui F qualsevol fórmula tal que $I \models F$.

Clonar l'element a , afegint el seu clon a' obtenint una I' de manera que $I' \models F$:

$$D_{I'} = \{a, b, a'\}$$

$$p_{I'}(a, a) = 1$$

$$p_{I'}(a, b) = 0$$

$$p_{I'}(a, a') = 1$$

$$p_{I'}(b, a) = 1$$

$$p_{I'}(b, b) = 0$$

$$p_{I'}(b, a') = 1$$

$$p_{I'}(a', a) = 1$$

$$p_{I'}(a', b) = 0$$

$$p_{I'}(a', a') = 1$$

F pot ser per exemple:

$$\forall x \exists y (p(x, y) \vee p(y, x))$$



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

- En els exercicis 21 i 22 vam veure que en LPO podem expressar que hi ha ALMENYS k elements en el domini.
- Però en l'exercici 23, veiem que en LPO NO podem expressar que hi ha COM A MOLT k elements en el domini.
- Això és el que ens motiva a introduir una lògica més expressiva, la LPOI.



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

Expressivitat d'una lògica: quines situacions de la vida real podem descriure o distingir?

Per exemple, en LProp $\mathcal{P} = \{plou, fa_sol, esta_ennuvolat\}$ cada I “modela” una situació de la vida real: per exemple, NO *plou*, NO *fa_sol* i SÍ *esta_ennuvolat*. Una F el que fa és distingir un subconjunt de les I 's: els MODELS de F .



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

Expressivitat d'una lògica: quines situacions de la vida real podem descriure o distingir?

En LPO el mateix, però les interpretacions són molt més complexes: quin domini hi ha, com s'interpreten els símbols.

Amb una F podem distingir les I 's que tenen almenys 2 elements en el seu D_I . O infinits elements.

Però NO podem expressar que hi ha com a màxim 2 (o k) elements (exercici 23).

Això ens motiva a introduir una altra lògica que estén la LPO, que és la LPOI, que sí que permet expressar aquest tipus de coses.



Què és la LPOI?

Sintaxi: F : és com LPO, però hi ha un símbol de predicat "predefinit" binari eq^2

Semantica: I : és com LPO, però eq_I sempre serà "ser el mateix element del domini"

$$eq_I(e_1, e_1) = 1 \quad \text{per a tot element } e_1 \text{ de } D_I$$

$$eq_I(e_1, e_2) = 0 \quad \text{si } e_1 \text{ i } e_2 \text{ són elements diferents de } D_I$$

$$I \models F \quad (eval_I(F)) \quad \text{com LPO.}$$

Exercicis de LPOI

- Exercici 24 Expressar límit superior de la mida dels models
- Exercici 26 Expressar mida exacta dels models
- Exercici 27 Monoide. Exemples de monoides
- Exercici 28 Grup. Exemples de grups
- Exercici 32 Fórmula que discrimina dues interpretacions

24. (dificultat 2) Escriu una fórmula F de LPOI que expressi que per a tot model I de F :

a) hi ha com a màxim 1 element en el domini d' I

Tres maneres alternatives de fer-ho:

$$\forall x \forall y \, eq(x, y) \quad \text{amb l'altra notació:} \quad \forall x \forall y \, x = y$$

$$\forall x \, eq(x, a) \quad \forall x \, x = a$$

$$\exists x \forall y \, eq(x, y) \quad \exists x \forall y \, x = y$$



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

24. (dificultat 2) Escriu una fórmula F de LPOI que expressi que per a tot model I de F :

b) hi ha com a màxim 2 elements en el domini d' I

Tres maneres alternatives de fer-ho:

$$\forall x \forall y \forall z \, (eq(x, y) \vee eq(x, z) \vee eq(y, z))$$

$$\forall x \, (eq(x, a) \vee eq(x, b))$$

$$\exists x \exists y \forall z \, (eq(x, z) \vee eq(y, z))$$



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

26. (dificultat 2)

a) Sigui p un símbol de predicat unari. Escriu una fórmula F de LPOI que expressi que hi ha un únic element que compleix p . (en mates a vegades s'escriu $\exists! x \, p(x)$). Això vol dir: que expressi que per a tot model I de F hi ha un únic element a en D_I amb $p_I(a) = 1$.

$$\exists x \, (p(x) \wedge \forall y \, (\neg eq(x, y) \rightarrow \neg p(y)))$$

Una altra manera, amb una constant a :

$$p(a) \wedge \forall x \, (\neg eq(a, x) \rightarrow \neg p(x))$$



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

24. (dificultat 2) Escriu una fórmula F de LPOI que expressi que per a tot model I de F :

c) hi ha com a màxim n elements en el domini d' I , per a una n donada

Tres maneres alternatives de fer-ho:

$$\forall x_1 \dots \forall x_{n+1} \, (\bigvee_{1 \leq i < j \leq n+1} eq(x_i, x_j))$$

(una fórmula de mida quadràtica)

$$\forall x \, (eq(x, a_1) \vee \dots \vee eq(x, a_n))$$

(una fórmula de mida lineal)

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y \, (eq(y, x_1) \vee \dots \vee eq(y, x_n))$$

(una fórmula de mida lineal)



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

26. (dificultat 2)

b) Escriu una altra F expressant que hi ha exactament 2.

$$p(a) \wedge p(b) \wedge \neg eq(a, b) \wedge \forall x \, (\neg eq(a, x) \wedge \neg eq(b, x) \rightarrow \neg p(x))$$



Lògica de Primer Ordre amb Igualtat (LPOI)

27. (dificultat 2) Un *monoid* és un model de la següent fórmula:

$$\forall x \forall y \forall z \, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad [\cdot \text{ es associatiu}]$$

$$\forall x \, x \cdot e = x \quad [e \text{ és l'element neutre per la dreta}]$$

$$\forall x \, e \cdot x = x \quad [e \text{ és l'element neutre per l'esquerra}]$$

on \cdot és un símbol de funció binària i e és un símbol de constant. Observa que hem usat notació infix (com fem amb el símbol $=$ per a la igualtat). Amb la notació habitual (i amb f en comptes de \cdot) la fórmula $\forall x \forall y \forall z \, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ s'escriuria $\forall x \forall y \forall z \, f(f(x, y), z) = f(x, f(y, z))$.



32. Per als conjunts de símbols i parells d'interpretacions següents, escriu una fórmula F de LPOI sobre el vocabulari (els símbols) donat, tal que F és una certa en una d'elles i falsa en l'altra.

c) (dificultat 4) $\{f^2, g^2\}$,

I_1 té domini els reals \mathbb{R}

I_2 té domini els racionals \mathbb{Q}

En tots dos casos f i g s'interpreten com la suma i el producte respectivament.

Ajuda: fabrica el dos i expressa que arrel de dos existeix.

$\exists x \forall y g(x, y) = y$ (això expressa que x és el 1,
i per això $f(x, x)$ serà 2)

Afegim alguna cosa i tenim:

Si F és la fórmula $\exists x \exists z (\forall y g(x, y) = y \wedge g(z, z) = f(x, x))$

llavors $I_1 \models F$ però $I_2 \not\models F$



Per al proper dia de classe:

- Comença a estudiar el capítol 5: Deducció en LPO.

📄 p5.pdf

