

Seja P um número definido com.

$$\alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2 + \gamma \cdot 3 + \delta \cdot 5 + \epsilon \cdot 7 + \varphi \cdot 11 \dots \text{Com todos os primos}$$

$$\text{onde } \alpha \in [0,1], \beta \in [0,2], \gamma \in [0,3], \delta \in [0,5]$$

$$\eta_P = \sum \alpha_i \lambda_i \text{ onde } \alpha_i \in [0, \lambda_i] \text{ e } \lambda_i \text{ é primo}$$

De tal forma que

Base: 10	P
1	1
2	10
3	100, 11
4	101, 20
5	1000, 21, 110
6	1001, 111, 200
7	10000, 201, 1010, 120
8	10001, 1011, 210, 1100, 121
9	10010, 1020, 211, 1101, 300
10	10011, 1021, 220, 1110, 301, 2000
11	10020, 1111, 221, 1200, 310, 2001, ...

Não foi
calculado
Todos 11

Defina-se soma como λ

$$\alpha + \beta = \sum \alpha_i \lambda_i + \sum \beta_i \lambda_i = \sum \lambda_i (\alpha_i + \beta_i) \text{ se } \eta_P$$

se $x_i > \lambda_i$ subtra-se λ_i de x_i até $x_i \leq \lambda_i$ e adiciona-se à x_{i-1} e x_{i+1} a unidade. Número de vezes que o subtração foi efetuada

$$\sum x_i \lambda_i + \sum y_i \lambda_i = \sum \lambda_i (x_i + y_i)$$

$$\sum \lambda_i (x_i + y_i) \xrightarrow{\text{Gauss}} \sum \lambda_i (x_i + y_i) \rightarrow \sum \lambda_i (x_i + y_i)$$

$\sum$

$$\hookrightarrow (x_i + y_i) - \lambda_i$$

$$\lfloor (x_i + y_i) / \lambda_i \rfloor$$

$$(x_i + y_i) / \lambda_i$$

$$1 \leftarrow 4 / 2 \rightarrow 2$$

$$1 \leftarrow 3 / 2 \rightarrow 1$$

$$\leftarrow 5 / 2 \rightarrow 1$$

Propriedade se $\exists \gamma_d$ correspondem a ele $\gamma_{p(ij)}$ e para qualquer

para α_d e β_d

$$\alpha_{p(ij)} + \beta_{p(k)} = \gamma_{p(l)}$$

$$\forall j, k, \gamma_{p(l)} = \gamma_d$$

$$\bullet 9_d + 10_d = 19_d$$

$$\underbrace{10010}_{20021} + \underbrace{10011}_{11120} \stackrel{d}{=} \underbrace{1020 + 10011}_{1311} \stackrel{d}{=} \underbrace{300 + 301}_{1311}$$


$$20021 \stackrel{d}{=} 11120 \stackrel{d}{=} 1311 = (19)_{10}$$

$$\begin{array}{r} 10011 \\ 1020 \\ \hline 11031 \\ \downarrow \\ 11112 \\ \downarrow \\ 11120 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0300 \\ 0301 \\ 0601 \\ \downarrow \\ 1311 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{2}{10} + s \\ 21 \\ \hline 31 \\ \downarrow \\ 112 \\ \downarrow \\ 120 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ 21 \\ \hline 41 \\ \downarrow \\ 122 \\ \downarrow \\ 130 \\ \downarrow \\ 211 \end{array}$$

$$xe^t$$

n	p
1	1
2	10
3	100, 11
4	101, 20
5	1000, 21, 110
6	1001, 111, 200
7	10000, 201, 1010, 120
8	10001, 1011, 210, 1100, 121
9	10010, 1020, 211, 1101, 300
10	10011, 1021, 220, 1110, 301, 2000
11	10020, 1111, 221, 1200, 310, 2001



1	2	3	5	7	11	13
0	0	0	0			
1	1	1	1			
	2	2	2			
		3	3			
			4			
			5			


1	1		
2	10		
3	100	11	
4	20	101	

10	p
1	1


2	10
3	100, 11
4	101, 20
5	1000, 21, 110
6	1001, 111, 200
7	10000, 201, 1010, 120
8	10001, 1011, <u>210</u> , 1100, 121
9	10010, 1020, 211, 1101, 300
10	10011, 1021, <u>220</u> , 1110, 301, 2000
11	10020, 1111, 221, 1200, 310, 2001

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 210 \rightarrow 8 \\
 220 \rightarrow 10 \\
 \hline
 430 \\
 12 \downarrow \rightarrow 6 \\
 811 \\
 \downarrow \\
 1321
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c}
 \curvearrowright 5 \\
 \curvearrowright 3 \\
 \curvearrowright 2
 \end{array} \\
 1110 \rightarrow 0 \rightarrow 10 \\
 20 \\
 \hline
 1130
 \end{array}$$



$$Q = C\varepsilon$$





$$\frac{Q'}{V} = C$$

$$\frac{Q''}{V} = Ck$$

$$Q' = CV$$



$$Q'' = CkV$$

$$Q' + Q'' = 2Q$$

$$CV + CkV = 2C\epsilon$$

$$V = \frac{2\epsilon}{1+k}$$

$$V = \frac{Q}{C}$$



$$-Q_2 + Q_3 = 0$$

$$\frac{QV}{2}$$