

Домашня контрольна робота
з Методів математичної фізики
студента групи ОФ-91
Сухова Олександра Сергійовича
Варіант 10

Задача 1

Умова:

$$\begin{cases} U_{tt} = \Delta U = U_{xx} + U_{yy} \\ U|_{t=0} = x \cdot y \cdot (6-x) \cdot (3-y) \\ U_t|_{t=0} = 0 \\ U|_{x=0} = U|_{y=0} = U|_{x=6} = U|_{y=3} = 0 \end{cases}$$

Шукатимемо розв'язок у вигляді добутку:

$$U(x, y, t) = X(x) \cdot Y(y) \cdot T(t)$$

Тоді:

$$\frac{T_{tt}}{T} = \frac{Y_{yy}}{Y} + \frac{X_{xx}}{X}$$

Методом розділення змінних:

$$\frac{X_{xx}}{X} = -\alpha, \quad \frac{Y_{yy}}{Y} = -\beta, \quad \frac{T_{tt}}{T} = -\alpha - \beta$$

З межових умов:

$$U|_{x=0} = X(0) \cdot Y(y) \cdot T(t) = 0 \rightarrow X(0) = 0$$

$$U|_{y=0} = X(x) \cdot Y(0) \cdot T(t) = 0 \rightarrow Y(0) = 0$$

$$U|_{x=6} = X(6) \cdot Y(y) \cdot T(t) = 0 \rightarrow X(6) = 0$$

$$U|_{y=3} = X(x) \cdot Y(3) \cdot T(t) = 0 \rightarrow Y(3) = 0$$

Маємо 2 однакові задачі Штурма Ліувілля:

$$\begin{cases} X_{xx} + \alpha X = 0 \\ X(0) = 0 \\ X(6) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} Y_{yy} + \beta Y = 0 \\ Y(0) = 0 \\ Y(3) = 0 \end{cases}$$

Їх розв'язки наступні:

$$X_n = \sin\left(\frac{\pi n x}{6}\right), \quad \alpha_n^2 = \left(\frac{\pi n}{6}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$Y_m = \sin\left(\frac{\pi m y}{3}\right), \quad \beta_m^2 = \left(\frac{\pi m}{3}\right)^2, \quad m = 1, 2, \dots$$

Тоді:

$$T_{tt} = -\mu_{nm}^2 \cdot T, \quad \mu_{nm}^2 = \left(\frac{\pi n}{6}\right)^2 + \left(\frac{\pi m}{3}\right)^2$$

Маємо:

$$T_{nm}(t) = A_{nm} \cdot \sin(\mu_{nm} \cdot t) + B_{nm} \cdot \cos(\mu_{nm} \cdot t)$$

$$U(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} T_{nm}(t) \cdot X_n(x) \cdot Y_m(y)$$

Знайдемо A_{nm} та B_{nm} з початкових умов:

$$U_t(x, y, 0) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \mu_{nm} \cdot A_{nm} \cdot X_n(x) \cdot Y_m(y) \rightarrow A_{nm} = 0, \forall n, m = 1, 2, \dots$$

$$\left(A_{nm} = \frac{1}{\mu_{nm}} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{3} \int_0^6 \int_0^3 0 \cdot \sin\left(\frac{\pi nx}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi my}{3}\right) dx dy = 0 \right)$$

Оскільки:

$$U(x, y, 0) = x \cdot y \cdot (6 - x) \cdot (3 - y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} B_{nm} \cdot X_n(x) \cdot Y_m(y)$$

$$B_{nm} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{3} \int_0^6 \int_0^3 x \cdot y \cdot (6 - x) \cdot (3 - y) \cdot \sin\left(\frac{\pi nx}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi my}{3}\right) dx dy$$

Розглянемо інтеграл:

$$I(a, l) = \frac{2}{a} \int_0^a z \cdot (a - z) \cdot \sin\left(\frac{\pi lz}{a}\right) dz \quad (1)$$

Тоді:

$$B_{nm} = I(6, n) \cdot I(3, m)$$

Знайдемо 1 проінтегрувавши частинами:

$$\begin{aligned} I(a, l) &= \frac{2}{a} \cdot \frac{a \cdot \left((-2a^2 - \pi^2 a l^2 z + \pi^2 l^2 z^2) \cos\left(\frac{\pi lz}{a}\right) + \pi a l \cdot (a - 2z) \sin\left(\frac{\pi lz}{a}\right) \right)}{\pi^3 \cdot l^3} \Bigg|_0^a = \\ &= \frac{4 \cdot a^2 (1 - (-1)^l)}{\pi^3 \cdot l^3} \end{aligned}$$

Маємо:

$$B_{nm} = \frac{144 \cdot (1 - (-1)^n)}{\pi^3 \cdot n^3} \cdot \frac{36 \cdot (1 - (-1)^m)}{\pi^3 \cdot m^3} = \frac{5184 \cdot (1 - (-1)^n) \cdot (1 - (-1)^m)}{\pi^6 \cdot n^3 \cdot m^3}$$

Відповідь:

$$\begin{aligned} U(x, y, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{5184 \cdot (1 - (-1)^n) \cdot (1 - (-1)^m)}{\pi^6 \cdot n^3 \cdot m^3} \sin\left(\frac{\pi nx}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi my}{3}\right) \cdot \\ &\quad \cdot \cos\left(\pi \cdot t \sqrt{\left(\frac{n}{6}\right)^2 + \left(\frac{m}{3}\right)^2}\right) \end{aligned}$$

Задача 2

Умова:

$$\begin{cases} U_{tt} = 10\Delta U = 10 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) U \\ 0 \leq r < 16 \\ 0 < t < \infty \\ U(16, t) = 0 \\ U(r, 0) = \frac{1}{8} \left(1 - \left(\frac{r}{16} \right)^2 \right) \\ U_t(r, 0) = 0 \end{cases}$$

Шукатимемо розв'язок у вигляді добутку:

$$U(r, t) = R(r) \cdot T(t)$$

З межевої умови:

$$U(16, t) = 0 = R(16) \cdot T(t) \rightarrow R(16) = 0$$

Методом розділення змінних:

$$\frac{T_{tt}}{10T} = \left(\frac{R'' + \frac{1}{r}R'}{R} \right) = -\lambda$$

Маємо рівняння:

$$r^2 R'' + rR' + \lambda r^2 R = 0$$

Зробимо заміну $\sqrt{\lambda}r = \rho$, маємо рівняння Бесселя 0-го порядку:

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (\rho^2 - 0^2) R = 0$$

Розв'язком якого є:

$$R = A \cdot J_0(\rho) + B \cdot N_0(\rho) = A \cdot J_0(\sqrt{\lambda}r) + B \cdot N_0(\sqrt{\lambda}r)$$


Оскільки $|U(r, t)| < \infty \rightarrow |R(r)| < \infty, \forall r : 0 \leq r < 16$:

$$B = 0 \left(\lim_{r \rightarrow +0} N_0(r) = -\infty \right)$$

З межевої умови:

$$R(16) = A \cdot J_0(\sqrt{\lambda} \cdot 16) = 0 \rightarrow \sqrt{\lambda_n} = \frac{\chi_n}{16}, n = 1, 2, \dots$$

Нулі функції Бесселя 0-го порядку(χ_n) показані на рисунку нижче:



Тоді:

$$T_{tt} = -10 \left(\frac{\chi_n}{16} \right)^2 T$$

$$T_n = A_n \cdot \sin \left(\frac{\sqrt{10} \chi_n t}{16} \right) + B_n \cos \left(\frac{\sqrt{10} \chi_n t}{16} \right)$$

Маємо:

$$U(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cdot \sin \left(\frac{\sqrt{10} \chi_n t}{16} \right) + B_n \cos \left(\frac{\sqrt{10} \chi_n t}{16} \right) \right) J_0 \left(\frac{\chi_n r}{16} \right)$$

Знайдемо A_n та B_n з початкових умов:

$$U_t(r, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{10} \chi_n}{16} \cdot A_n \right) J_0 \left(\frac{\chi_n r}{16} \right) = 0 \rightarrow A_n = 0, \forall n = 1, 2, \dots$$

$$\left(A_n = \frac{2}{16 \cdot \chi_n \cdot \sqrt{10} (J'_0(\chi_n))^2} \int_0^{16} r \cdot 0 \cdot J_0 \left(\frac{\chi_n r}{16} \right) dr = 0 \right)$$

Оскільки:

$$U(r, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot J_0 \left(\frac{\chi_n r}{16} \right) = \frac{1}{8} \left(1 - \left(\frac{r}{16} \right)^2 \right)$$

Маємо:

$$B_n = \frac{2}{256 (J'_0(\chi_n))^2} \int_0^{16} r \cdot \frac{1}{8} \left(1 - \left(\frac{r}{16}\right)^2\right) \cdot J_0\left(\frac{\chi_n r}{16}\right) dr$$

Використаємо наступні властивості інтегралів з функціями Бесселя:

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\int x \cdot J_0(x) \cdot x^2 dx = x^3 \cdot J_1(x) - 2 \cdot x^2 J_2(x) + C$$

Маємо:

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{1}{4 \cdot \chi_n (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \int_0^{\chi_n} \frac{z}{\chi_n} \cdot \left(1 - \left(\frac{z}{\chi_n}\right)^2\right) \cdot J_0(z) dz = \\ &= \frac{1}{4 \cdot \chi_n (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \left(\frac{z}{\chi_n} \cdot J_1(z) - \frac{1}{\chi_n^3} \cdot (z^3 \cdot J_1(z) - 2 \cdot z^2 \cdot J_2(z)) \right) \Big|_0^{\chi_n} = \\ &= \frac{1}{4 \cdot \chi_n (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \left(J_1(\chi_n) - J_1(\chi_n) + \frac{2}{\chi_n} \cdot J_2(\chi_n) \right) = \\ &= |J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2 \cdot \nu}{x} J_\nu(x), \quad \nu = 2| = \\ &= \frac{1}{4 \cdot \chi_n (J'_0(\chi_n))^2} \left(J_1(\chi_n) - \frac{2}{\chi_n} J_2(\chi_n) + J_3(\chi_n) \right) \end{aligned}$$

Відповідь:

$$U(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4 \cdot \chi_n (J'_0(\chi_n))^2} \left(J_1(\chi_n) - \frac{2}{\chi_n} J_2(\chi_n) + J_3(\chi_n) \right) \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{10} \chi_n t}{16}\right) \cdot J_0\left(\frac{\chi_n r}{16}\right)$$

Задача 3

Умова:

$$\begin{cases} U_t = \Delta U = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) U \\ 0 \leq r < 5 \\ 0 < t < \infty \\ U(r, 0) = 25 - r^2 \\ U(5, t) = 0 \end{cases}$$

Шукатимемо розв'язок у вигляді добутку:

$$U(r, t) = R(r) \cdot T(t)$$

З межевої умови:

$$U(5, t) = 0 = R(5) \cdot T(t) \rightarrow R(5) = 0$$

Методом розділення змінних:

$$\frac{T_t}{T} = \left(\frac{R'' + \frac{1}{r} R'}{R} \right) = -\lambda$$

Маємо рівняння:

$$r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0$$

Зробимо заміну $\sqrt{\lambda} r = \rho$, маємо рівняння Бесселя 0-го порядку:

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (\rho^2 - 0^2) R = 0$$

Розв'язком якого є:

$$R = A \cdot J_0(\rho) + B \cdot N_0(\rho) = A \cdot J_0(\sqrt{\lambda} r) + B \cdot N_0(\sqrt{\lambda} r)$$


Оскільки $|U(r, t)| < \infty \rightarrow |R(r)| < \infty, \forall r: 0 \leq r < 5$:

$$B = 0 \left(\lim_{r \rightarrow +0} N_0(r) = -\infty \right)$$

З межевої умови:

$$R(5) = A \cdot J_0(\sqrt{\lambda} \cdot 5) = 0 \rightarrow \sqrt{\lambda_n} = \frac{\chi_n}{5}, n = 1, 2, \dots$$

Нулі функції Бесселя 0-го порядку(χ_n) показані на рисунку нижче:



Тоді:

$$T_t = -\left(\frac{\chi_n}{5}\right)^2 T$$

$$T_n = A_n \cdot e^{-\left(\frac{\chi_n}{5}\right)^2 \cdot t}$$

Маємо:

$$U(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot e^{-\left(\frac{\chi_n}{5}\right)^2 \cdot t} J_0\left(\frac{\chi_n r}{5}\right)$$

Знайдемо A_n початкової умови:

$$U(r, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot J_0\left(\frac{\chi_n r}{5}\right) = 25 - r^2$$

Маємо:

$$A_n = \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \int_0^5 r \cdot (25 - r^2) \cdot J_0\left(\frac{\chi_n r}{5}\right) dr$$

Використаємо наступні властивості інтегралів з функціями Бесселя:

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\int x \cdot J_0(x) \cdot x^2 dx = x^3 \cdot J_1(x) - 2 \cdot x^2 J_2(x) + C$$

Маємо:

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \int_0^{\chi_n} \frac{z}{\chi_n} \cdot \left(1 - \left(\frac{z}{\chi_n}\right)^2\right) \cdot J_0(z) dz = \\
&= \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \left(\frac{z}{\chi_n} \cdot J_1(z) - \frac{1}{\chi_n^3} \cdot (z^3 \cdot J_1(z) - 2 \cdot z^2 \cdot J_2(z)) \right) \Big|_0^{\chi_n} = \\
&= \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \cdot \left(J_1(\chi_n) - J_1(\chi_n) + \frac{2}{\chi_n} \cdot J_2(\chi_n) \right) = \\
&= |J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2 \cdot \nu}{x} J_\nu(x), \quad \nu = 2| = \\
&= \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \left(J_1(\chi_n) - \frac{2}{\chi_n} J_2(\chi_n) + J_3(\chi_n) \right)
\end{aligned}$$

Відповідь:

$$U(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{25 (J'_0(\chi_n))^2} \left(J_1(\chi_n) - \frac{2}{\chi_n} J_2(\chi_n) + J_3(\chi_n) \right) \cdot e^{-\left(\frac{\chi_n}{5}\right)^2 \cdot t} \cdot J_0\left(\frac{\chi_n r}{5}\right)$$