


YÓCATL



CONSEJO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS A. C.

Subcomité Técnico Consultivo para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
de las Iguanas en México



MODELO GENERAL PARA UMA DE IGUANAS



QUE ESPECIE VAMOS A REPRODUCIR..??

ESTO DEPENDERÁ DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DE NUESTRA UMA.

❖ SI REQUERIMOS INTEGRARNOS AL MERCADO DE MASCOTAS, QUE ESPECIE ES MÁS ACEPTADA PARA SU MANEJO COMO MASCOTA.

❖ VENTA DE PIE DE CRÍA.

❖ VENTA DE CARNE.

❖ ECOTURISMO.

❖ CONSERVACIÓN.



QUE ESPECIE VAMOS A REPRODUCIR..??



Fotos: Cortesía César Casiano.



DONDE CONSEGUIMOS NUESTRO PIE DE CRÍA..??

- ✿ **UMA registrada, que cuenten con aprovechamiento. Compra.**
- ✿ **UMA registrada que cuenten con excedentes, propiedad de la nación. Traslado.**
- ✿ **Solicitud de Aprovechamiento extractivo con fines de reproducción (Art. 128 al 130 del Reglamento de la LGVS).**
- ✿ **Ejemplares producto de decomisos (Art. 38 LGVS y Art. 21 y 22 Reglamento de la LGVS).**



★ Solicitud de Aprovechamiento extractivo con fines de reproducción (Art. 128 al 130 del Reglamento de la LGVS).

Art. 128. El aprovechamiento extractivo de material parental sólo podrá autorizarse cuando dicho material no se produzca en UMA, en predios federales o en predios o instalaciones que manejan vida libre.

Art. 129. El aprovechamiento extractivo de material parental de ejemplares, partes o derivados de especies en alguna categoría de riesgo, se podrá autorizar cuando un porcentaje del material obtenido se utilice para la reintroducción o repoblación.

En este supuesto, el interesado se sujetará a los porcentajes establecidos en los programas que establezca la Secretaría o los propondrá en los programas que presente para ser avalados por dicha dependencia.

Art. 130. La Secretaría tomará en consideración los resultados del material parental autorizado en la reproducción para otorgar o negar nuevas autorizaciones.

✿ Ejemplares producto de decomisos (Art. 38 LGVS y Art. 21 y 22 Reglamento de la LGVS).

Art. 21. La Secretaría podrá entregar ejemplares que se encuentren confinados en los CIVS a las personas inscritas en el registro a que se refiere el artículo 38 de la Ley.

Para registrarse, los interesados deberán presentar al CIVS correspondiente los datos y documentos a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la información con la que se demuestre su capacidad para el mantenimiento de ejemplares de fauna silvestre en condiciones adecuadas.

Art. 22. La Secretaría a través de las Unidades Administrativas responsables de los CIVS, determinará el destino de los ejemplares que se encontraren confinados en estos centros, de acuerdo con sus programas de trabajo y las solicitudes existentes.





BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Es importante saber la biología de la especie con la que trabajamos.


- Alimentación en vida libre y cautiverio.**
 - Época reproductiva.**
 - Periodo de incubación.**
 - Cantidad de ejemplares promedio por postura. (30 a 40 huevos por temporada por hembra).**
 - Hábitos (Arborícola o cavernas).**
 - Problemas sanitarios probables al encerrarlas.**
- 

YÓCATL



CONSEJO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS A. C.

Subcomité Técnico Consultivo para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
de las Iguanas en México



INSTALACIONES MÍNIMAS NECESARIAS



✓ **Albergues y/o encierros.**

- *Área de Reproductores.
- *Área de Subadultos
- *Área de Juveniles
- *Jaulas para crías

✓ **Área de Anidación y obtención de huevos.**

- Corral de desove
- Ponederos


✓ **Caseta de Incubación controlada.**

✓ **Área de cuarentena y Medicina Veterinaria.**

✓ **Otros:** Jaulas para albergue temporal y/o transporte de ejemplares, en varios tamaños



COMO ELEGIR EL SITIO PARA UBICACIÓN DE INSTALACIONES...?



Elegir sitios con suficiente horas de luz (mínimo de 7 horas de luz).

- **Considerar que los habitantes en los encierros son plantas y animales que necesitan de agua y sol para desarrollarse.**

ÁREA DE REPRODUCTORES Y ÁREA DE SUBADULTOS



ENCIERRO GENERAL. UMA LLANO REAL , GRO.



ENCIERRO GENERAL EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.



ENCIERRO GENERAL SITIO TRANSFERENCIA EN ACAPULCO



UMA PUERTO IGUANAS, ZIHUATANEJO, GRO.



UMA CEMENTOS APASCO, ACAPULCO, GRO



UMAR, PTO. ESCONDIDO, OAX.



UMA LAS BRISAS, ACAPULCO, GRO.

ÁREA DE JUVENILES Y JAULAS PARA CRÍAS





ÁREA DE ANIDACIÓN Y OBTENCIÓN DE HUEVOS.

- CORRAL DE DESOVE
- PONEDEROS



PONEDEROS



PONEDEROS



CASETA DE INCUBACIÓN CONTROLADA.





YÓCATL



CONSEJO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS A. C.

Subcomité Técnico Consultivo para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
de las Iguanas en México



BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- CUERPO ESCAMOSO.
- CUATRO MIEMBROS BIEN DESARROLLADOS QUE TERMINAN EN AFILADAS GARRAS.
- PARPADOS MÓVILES.
- COLA GENERALMENTE LARGA.
- ASPECTO PREHISTÓRICO, DE TAMAÑO GRANDE.
- HÁBITOS ARBORÍCOLAS Y TERRESTRES.



ALIMENTACIÓN

Tipo de alimento proporciones.

80% vegetales: Hojas, Flores, Cilantro.

15% Verduras: Calabacita, Chayote, Tomate.

5% Fruta de la temporada: Papaya, Mango, jugo de naranja

Vegetales: debidamente picados.


Verduras: de preferencia rayadas.

Fruta: picada, molida o en jugo aplicado a la mezcla anterior.

Dos raciones diarias como mínimo (depende la UMA).

En comederos plásticos preferentemente y por arriba del suelo de jaula.





Alimento	Consistencia	Periodicidad semanal	Aporte nutrimental
Papaya	Rayada y/o picada en ensalada	3-4 veces/semana	Rica en calcio
Flor de Tulipán	Entera	2 veces/semana	
Flor Diente de León	Entera	2 veces/semana	
Flor de calabaza	Entera	2 veces/semana	
Alfalfa	En manojo	3-4 veces/semana	Alimento completo
Chaya	Planta en maceta	3 veces/semana	
Chile verde	Planta en maceta	3 veces/semana	
Berro	En manojo	2 veces/semana	
Germinado lenteja	En ensalada	3 veces/semana	Alto valor en proteínas
Hojas de rábano	Enteras o en manojo	2 veces/semana	
Hoja diente de León	Entera	3 veces/semana	Rica en calcio
Pera	Rayada o picada S/semilla (cianuro)	1 -2 veces/semana	
Manzana	Rayada o picada S/semilla (cianuro)	1 -2 veces/semana	
Toronja	En gajos y en tamaño digeribles	2-3 veces/semana	Buena fuente de calcio
Mandarina	En gajos y en tamaño digeribles	2-3 veces/semana	Buena fuente de calcio
Plátano	Rayado o picado en ensalada y baja proporción	1 -2 veces/semana	Pobre en calcio pero rico en otros nutrientes
Calabacita	Rayada y/o picada en ensalada	2-3 veces/semana	complementario
Chayote	Rayada y/o picada en ensalada	2-3 veces/semana	complementario
Pepino	Rayada y/o picada en ensalada	2-3 veces/semana	complementario

REPRODUCCIÓN

- ❖ **REPRODUCCIÓN ANUAL**
- ❖ **MADUREZ SEXUAL AL 2o O 3er AÑO**
- ❖ **PERIODO REPRODUCTIVO.-OCTUBRE A DICIEMBRE**
- ❖ **FECUNDACIÓN DE HUEVOS.- ENERO-FEB.**
- ❖ **PERIODO DE ANIDACIÓN Y DESOVE**
- ❖ **EXPULSIÓN DE HUEVOS**
- ❖ **COLECTA DE HUEVOS**
- ❖ **INCUBACIÓN (TÉCNICA)**
- ❖ **ECLOSIÓN**






INCUBACIÓN

VARIABLES DEL AMBIENTE DE INCUBACIÓN MÁS IMPORTANTES

- ✓ **Temperatura optima $29^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, niveles críticos a menos 25°C y a más de 35° .**
 - ✓ **Humedad requerida 15 a 20%; Deshidratación se manifiesta por contracción del huevo. Es posible que resistan pérdida de humedad del 15%.**
 - ✓ **Gases: Permitir oxigenación de los nidos a traves de perforaciones en la unidad de incubación.**
- 

RECUPERACIÓN DE HUEVOS Y DISPOSICIÓN EN EL MEDIO INCUBATORIO







CONTROL DE INCUBACIÓN

ECLOSIÓN Y MANTENIMIENTO DE NEONATOS





ASPECTOS A CONOCER

De menor tamaño en comparación con las que nacen en un periodo medio de incubación (noventa días).

Presentan saco vitelino.

Membrana húmeda: conviene dejar a las crías en su propio nido.

Nunca desprender al neonato del cascarón.

No requieren alimentarse.

Ambiente climatizado 30°C.



ASPECTOS A CUIDAR

Las crías recién nacidas que aún disponen de reservas de yema solo necesitan calor.

El calor es de vital importancia.

Temperatura más adecuada +/- 30°C.

Exposición directa al sol (albergues).

Disposición de sombra para evitar muerte por insolación.

Refugios para darles seguridad y evitar muertes por apiñamiento.

Áreas para tomar el sol: troncos, mecate, etc.



JAULAS DE SANIDAD



JAULAS DE SANIDAD PARA CRÍAS RECIEN NACIDAS.

- Periodo de 45 a 60 días de uso
 - Controla grupos por fechas de nacimiento.
 - Facilita la aplicación de medicamento
 - Evita propagación de infección a determinada población recién nacida
 - Diversas formas (tipo, materiales)
- 

JAULAS DE CRECIMIENTO.

- Periodo de 120 días de uso.
 - Por su dimensión se puede ambientizar al interior con entes vegetales.
 - Facilita un desarrollo mas rápido.
 - Permite utilizarse para selección, confinamiento y manejo de pie de cría.
 - Diversas formas (tipo, materiales).
- 





YÓCATL



CONSEJO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS A. C.

Subcomité Técnico Consultivo para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
de las Iguanas en México

