

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 17/84 HD

VARIEDADES DE MELOCOTONERO

JOSE MARIA AYALA DELGADO
Agente de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

VARIEDADES DE MELOCOTONERO

El melocotonero productor de frutos de carne dura, amarilla y hueso adherente ha estado en España desde siempre muy extendido, posiblemente por su doble uso, es decir, consumo en fresco y empleo en la industria conservera en caso de saturación de mercado.

Hasta hace pocos años la producción de este tipo de melocotones se centraba casi en su mayoría en el mes de agosto, dado que las variedades que maduraban en este mes reunían unas buenas condiciones de calidad y productividad.

Con el fin de satisfacer la demanda del mercado, que solicitaba disponer de ellos durante un período más amplio, se empezaron a introducir variedades con cierta similitud a las que cumplían estos requisitos, pero de carne blanda, ya que de este tipo existía una gama de ellas de maduración escalonada.

Sin embargo, cuando aparecían en el mercado los melocotones de carne dura, las preferencias se dirigían hacia éstos, influyendo posiblemente el gusto del consumidor, la mayor facilidad para su manipulación y transporte, su mejor uso en conservería, etc.

Debido a ello, en el año 1965, el Departamento de Pomología de la Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza programó dos trabajos paralelos, realizados por M. Cambra:

— Reunir en un mismo campo los clones de melocotonero de carne dura y amarilla existentes en la Estación Experimental, junto con los obtenidos por prospección en las provincias en que este cultivo era tradicional, como Murcia, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Teruel y Navarra.

— Introducir una serie de variedades extranjeras del mismo tipo, para su estudio comparativo y simultáneo con las variedades autóctonas españolas.

Esta Hoja Divulgadora presenta información sobre las variedades más importantes manejadas en los referidos trabajos.

En el cuadro de las páginas 12 y 13 se recogen una serie de datos relativos a las mismas:

Número de clon

Corresponde al registro de entrada del clon estudiado.

Floración

Aunque la floración de este tipo de melocotonero suele estar bastante agrupada, transcurren en el clima de la zona en cuestión, unos doce a catorce días entre la floración de las variedades que lo hacen antes y las que florecen más tardíamente.

Por esto, se han catalogado, teniendo en cuenta la media de las fechas de floración, en tres grupos:

T=de floración temprana, que afecta a 14 variedades.

M=de floración media, con 21 variedades.

R=de floración retrasada, que recoge 9 variedades.

Maduración

La mayor o menor amplitud del período de maduración indica si la recolección se puede hacer en una o más pasadas, por madurar los frutos casi a la vez o, por el contrario, se deben recolectar parte de ellos, ya maduros, y dejar los restantes unos días para que engorden y terminen la maduración.

El período de recogida de la mayor parte de las variedades es de ocho a diez días, excepto los de la serie «Babygold» que pueden recogerse todos de una vez o a lo sumo en dos, pero en fechas muy próximas.

Vigor

El vigor de la variedad se determina en función del perímetro del tronco.



Producción

Como a partir del cuarto año la cosecha es de cierta entidad, en el concepto de cosecha acumulada se ha recogido la producción de cinco años, a partir del cuarto inclusive.

En la serie «Babygold» sólo se incluyen las producciones de tres años, pues fueron plantados dos años más tarde.

Esta cosecha acumulada se ha dividido por la superficie de la sección del tronco, obteniéndose así un índice de productividad



en kilogramos de fruta por centímetro cuadrado de sección del tronco.

Necesidades de frío invernal

Se indica las necesidades de frío durante el reposo invernal, en forma de número de horas de temperatura inferior a 7°C necesaria para inducir la floración.

Caída de yemas

La caída de yemas afecta frecuentemente al melocotonero. Por ello se indica la susceptibilidad a este aspecto, clasificando las variedades en tres categorías:

3. Muy susceptibles a la caída de yemas.
2. Medianamente susceptibles a la caída de yemas.
1. Poco susceptibles a la caída de yemas.

DESCRIPCION DE LAS VARIEDADES POR ORDEN DE MADURACION

Cherryred

Es, hasta la fecha, la variedad productora de melocotones amarillos de carne dura que primero madura, aunque sea la última en florecer.

Es un árbol de vigor medio, productivo y bastante regular en su producción, siendo resistente a la caída de yemas y de frutos en premaduración.

Tiene un fruto pequeño (unos 100 g de peso medio). Su aspecto exterior es muy semejante al de «Dixired», lo que a veces dificulta su comercialización hasta que se conoce su cualidad de tener la carne dura.

No puede utilizarse para conserva, pues presenta vetas rojizas en la carne.

Brasileño

En Valencia se cultiva con este nombre y con el de «Ribarroja».

En Aragón se le conoce, además, con los nombres de «Caspolino», «del Gorro» y «Campeador».

Su producción es irregular, teniendo en su carne vetas rojizas que colorean la pulpa. Presenta algunos frutos con el hueso abierto.

Vesuvio

Es de origen italiano, procedente de la Universidad de Nápoles. Se conoce también como «Punteolana».




El árbol es vigoroso y la producción constante y regular. Se comporta, en general, muy bien en todas las zonas productoras de melocotonero, siendo resistente a la caída de yemas.

Tiene la flor rosácea y abundante. Es sensible a la «lepra».

Su fruto es ligeramente achatado, muy firme, de calibre medio (140 g), con buena coloración roja y amarilla que lo hacen muy atractivo.

Tiene, sin embargo, tendencia a presentar frutos con el hueso abierto y a que la piel y la carne próximas al pedúnculo queden verdosas.



Su carne es amarilla sin nada de coloración roja alrededor del hueso. El fruto presenta bastante buena resistencia a las manipulaciones y al transporte, así como a la caída en premaduración.

Madura unos dos o tres días antes que el «Bienvenido o Sástago». Duplica casi la producción de éste último, así como el peso de frutos por centímetro cuadrado de tronco, motivo por el cual parece aconsejable que lo sustituya. Aunque es la variedad más empleada para conserva en su país de origen, en el nuestro no se acepta por ser inferior su dureza a la correspondiente a alguna de nuestras variedades.

Bienvenido o Sástago

Se consideran estos nombres sinónimos de «Benvingut», «Duraznilla temprana de Sástago», «Duraznilla de Caspe» y «Bienvenido de Sástago», que son iguales entre sí o presentan escasas diferencias en los frutos.

El árbol tiene aspecto compacto y redondeado muy característico, siendo susceptible a la caída de yemas y al ataque de moniliosis.

Sus frutos son de tamaño pequeño o a lo sumo mediano. Tienen el borde de la cavidad del pedúnculo ondulado y un labio más desarrollado que el otro, lo que unido a las manchas y salpicaduras rojas, que dan a la chapa aspecto marmóreo, hace que sean muy característicos.

Su producción es sólo aceptable e irregular.

Maruja

Es una variedad española procedente de Murcia, que madura en Aragón unos veinte a veinticinco días más tarde que en su provincia de origen.

Es susceptible a la caída de yemas, aunque su comportamiento ha sido bueno.

Su fruto es de tamaño medio, redondeado y con labios desiguales. Aunque algo vellosa, es de aspecto bonito, tiene color amarillo y rojo y muy buen sabor.

Fortuna

Variedad originaria de Estados Unidos, cuenta con un árbol de poco vigor pero de producción alta y constante. Es resistente a la caída de yemas.

Su flor es campanulácea.

El fruto es de tamaño medio (130 a 150 g), esférico, de color amarillo y rojo, con carne muy firme y, por tanto, de buena calidad conservera.

Es sensible a la lepra y la moniliosis, tanto sobre la flor como sobre el fruto.

Su cosecha acumulada ha sido más del doble de la producida por «Maruja», por lo que mejora a esta variedad en su comportamiento en el valle medio del Ebro, así como también por su menor susceptibilidad a la caída de yemas y de frutos en pre-maduración.

Shasta

Variedad originaria de Estados Unidos que cuenta con un árbol de buen vigor y fertilidad alta.

Su flor es campanulácea y muy abundante.


Su fruto es de calibre medio, de forma redondeada, ligeramente asimétrico y con pubescencia media. Cuenta con algo menos de la cuarta parte coloreada de rojo sobre un fondo uniforme amarillo-naranja con numerosas salpicaduras rojas y amarillas.

Carne amarilla sin coloración roja alrededor del hueso, con textura muy firme. Es bastante resistente a las manipulaciones y al transporte.

Es sensible a la lepra y a la moniliosis sobre las flores, y medianamente resistente al oidio.

Se considera una variedad excelente en conjunto y buena para conserva.

Es muy semejante a «Fortuna», con maduración dos o tres días después de la de ésta.



Loadel

Procedente de una semilla recogida al azar en California (Estados Unidos).

Arbol vigoroso y de buena productividad, superior a «Shasta» por cantidad y por su regularidad de producción.

Tiene la flor campanulácea.

Su fruto es de calibre medio (140 a 150 g), tiene buena coloración. Entre la cuarta parte y la mitad de la superficie es de color rojo sobre fondo amarillo. Resiste bien a la manipulación y transporte y no tiene caída durante la premaduración.

En sus dos primeras cosechas ha presentado frutos gruesos de bonito aspecto y calidad.

Carson

Procede también de Estados Unidos y reúne las mismas características que «Loadel».

Está considerada, en Francia, entre las mejores variedades en las sesiones de degustación de frutos en almíbar.

Estas dos variedades, «Loadel» y «Carson», por madurar casi en las mismas fechas, podrían sustituir a «Fortuna» y «Shasta», si mantienen su elevada producción y el tamaño de sus frutos como en las primeras cosechas recogidas.

Babygold 5

Esta variedad, procedente de Estados Unidos, cuenta con un árbol de vigor y productividad muy buena. Necesita aclareo. Su flor es campanulácea.

El fruto es de peso medio (160 a 170 g), de buena coloración, carne medianamente jugosa y calidad gustativa bastante agradable.

Es sensible a la lepra y ligeramente sensible al oidio.

San Jaime

El clon seleccionado tiene un fruto ligeramente alargado, con dominio de coloración amarilla y chapa roja con reflejos violáceos.

Es susceptible a la caída de las yemas.



Denominaciones	Núm. de clon	Flo- ración (1)	Junio						Julio					
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Cherryred	2277	R												
Brasileño	2185	R												
Vesuvio	2288	M												
Bienvenido o Sástago	548	M												
Maruja	2261	M												
Fortuna	2279	M												
Shasta	2285	M												
Loadel	2202	T												
Carson	2957	R												
Babygold 5	2562	T												
San Jaime	2355	M												
Babygold 6	2563	T												
Jerónimo	2254	M												
Tuscan	2045	R												
Babygold 7	2564	T												
Vivian	2268	M												
Dixon	2278	M												
Cortez	2276	T												
Suncling	2805	M												
S. Lorenzo	2358	M												
Jungerman	2959	T												
Calabacero	2267	M												
Sudanell 1	2211	M												
Andora	2273	M												
Tudor	2287	M												
Sudanell 2	2349	T												
Babygold 8	2565	R												
Babygold 9	2566	T												
Carolyn	2274	M												
Guam	2284	T												
Garau	2280	R												
Gaume	2281	T												
Sudanell 3	2213	R												
Grange	2283	T												
Stanford	2033	T												
Corona	2275	M												
Amarillo de Gallur	2361	M												
Golden Queen	2282	M												
Maluenda	2375	M												
Zaragozano	533	T												
Kakamas	2801	R												
Amarillo de Calanda	2400	T												
Calanda S. Miguel	2223	R												
Calanda tardío del o Pilar	1920	M												

(1) T=floración temprana. M=Media. R=retrasada.

(2) 3=muy susceptible a la caída de yemas. 2=medianamente susceptible. 1=poco susceptible.

* Con dos años menos que las restantes, sus datos no son comparables.

Cosecha							Vigor perímetro del tronco en mm	Producción		Necesidades de frío invernal (horas bajo 7°C)	Caída de yemas (2)
Agosto	Septiem.	Octubre	Cosecha acumulada en kilos	Kg/cm ² de sección del tronco							
20	30	10	20	30	10	20					
							307,5	92,895	1,238	+ de 900	1
							329,4	37,620	0,431	700-800	1
							353,1	124,172	1,255	500-600	1
							362,0	75,900	0,729	700-800	3
							330,5	60,150	0,604	600-700	3
							267,0	117,770	2,081	600-700	1
							245,0	94,994	1,994	700-800	1
							sin datos				
							sin datos				
							*211,4	*31,377	*0,890	600-700	1
							345,5	82,810	0,979	800-900	3
							*262,2	*57,190	*1,090	700-800	1
							336,6	97,960	1,089	700-800	2
							362,0	63,053	0,605	600-700	2
							*252,0	*40,540	*0,800	700-800	1-2
							272,0	120,360	2,649	600-700	1
							325,5	156,930	1,855	600-700	1
							371,0	69,980	0,640	500-600	1
							sin datos				
							336,5	138,670	1,543	800-900	1
							sin datos				
							328,5	77,691	0,907	800-900	3
							313,5	87,500	1,122	600-700	1
							276,2	78,630	1,292	+ de 900	1
							345,0	97,820	1,035	700-800	1-2
							365,0	132,050	1,575	700-800	1-2
							*167,5	*14,485	*0,650	+ de 900	1-2
							*182,8	*36,660	*1,310	+ de 900	1
							379,0	112,425	0,986	500-600	1
							342,2	88,369	0,886	500-600	1
							356,6	99,295	0,984	800-900	2
							356,5	91,470	0,907	500-600	2
							344,5	123,180	1,383	600-700	1-2
							391,5	75,630	0,622	700-800	1
							364,0	128,320	1,223	600-700	1-2
							358,3	116,800	1,289	700-800	1-2
							320,0	135,150	1,663	800-900	1
							353,1	102,174	1,032	500-600	1
							281,0	88,188	1,407	600-700	2
							288,5	58,930	0,892	600-700	1
							sin datos				
							295,0	54,930	0,790	800-900	1
							343,5	58,250	0,607	600-700	2
							336,0	42,080	0,459	700-800	1



Babygold 6

Procede de Estados Unidos. Arbol de gran vigor y productividad muy buena. Flores campanuláceas.

Su fruto es de peso medio (160 a 180 g), con buena coloración, bella apariencia, carne bastante jugosa y buen sabor.

Jerónimo

Aunque de origen desconocido se ha recogido en Murcia, donde también se le llama «Jeromo» o «Segundo».

El árbol tiene gran vigor y buena productividad. El clima influye mucho en la cantidad de flor, la cual es rosácea. Es sensible a la lepra.

Su fruto es de tamaño medio, redondeado, de color amarillo calabaza, aspecto bonito y atractiva chapa rojo carmín, compuesta por salpicaduras y punteados. Su pubescencia es mediana y tiene buena resistencia a las manipulaciones y al transporte.

En el clon seleccionado, los frutos casi no tienen coloración

roja alrededor del hueso y algunos de ellos carecen totalmente de ella.

Es de excelente sabor y es una de las variedades que posee muy buenas cualidades conserveras.

La maduración de los frutos sobre el árbol es muy escalonada y la caída de frutos en prerrecolección es bastante importante.

Tuscán

Es una variedad de poco interés dada su escasa productividad, que es superada por la de otras variedades que maduran en los mismos días.

Babygold 7

Es una variedad procedente de Estados Unidos. Arbol de gran vigor y alta productividad. Flor campanulácea. Sus frutos son de peso medio (150 a 170 g), ligeramente oblongos y con buena coloración. Su calidad gustativa no es muy buena y tiene un hueso relativamente pequeño.



Vivian

Variedad originaria de Estados Unidos que cuenta con un árbol de gran vigor. Su fertilidad es muy buena. Tiene la flor campanulácea y muy abundante.

El fruto es de tamaño medio (140 g), redondeado, un poco achatado, de piel amarilla muy poco coloreada de rojo.

Su textura es muy firme, con carne amarilla y débil coloración roja alrededor del hueso. Es bastante resistente a las manipulaciones y transporte. Es una variedad productiva, sensible a la lepra.

Dixon

Variedad estadounidense. Árbol de gran vigor y buena productividad. Sus flores son campanuláceas.

Su fruto es de tamaño mediano a grueso (140 a 160 g) esférico y con un labio más desarrollado. El color de fondo del fruto es amarillo con estrías rojo intenso que cubren los dos tercios de la superficie de los frutos.

Recuerda el «Zaragozano encarnado». Madura en la misma época que «Vivian», aunque es más vigoroso y productivo que él.

Cortez

Es una variedad originaria de Estados Unidos, de muy escasa productividad, cualquiera que sea la zona de cultivo, por lo que no es variedad que se pueda recomendar.

Suncling

Procede de Estados Unidos. Árbol de gran vigor y productividad muy buena. Tiene la flor campanulácea.

Su fruto es de peso medio (150 a 170 g), a veces ligeramente oblongo, con buena coloración y calidad gustativa buena.

Aunque no se dispone de datos suficientes, parece que destaca tanto por su producción como por el aspecto de los frutos.

San Lorenzo

De origen español. Los frutos del clon seleccionado son redondos y gruesos, con chapa rojo granate. Es susceptible a la caída de los frutos en premaduración, pero no así a la caída de las yemas.

Con aclareo da lugar a frutos de muy buena presentación, de excelente sabor y buenas aptitudes conserveras.

Jungerman

Puede ser una variedad de interés, ya que, de la poca información que se tiene, parece que destaca tanto por su producción como por el aspecto del fruto.

Calabacero

Variedad española. Difiere bastante de «Maruja» y «Jerónimo». Se parece más a «Sudanell», por su tamaño, forma y colorido.

Los frutos del clon seleccionado tienen coloración roja alrededor del hueso, aunque esto no le impide tener buena aceptación en conservería. Son gruesos, de color amarillo pálido, sin chapa o con ella formada por salpicaduras rojas que, a lo sumo, cubren un tercio del fruto.

Es muy fino de piel, de bella apariencia y carne firme. Soporta bien las manipulaciones y el transporte.

Sudanell o Amarillo de Torres

Variedad española cuya productividad, es de mediocre a buena, según los clones empleados y la zona de cultivo, tanto en cuanto al suelo como al clima.

Produce frutos redondeados y gruesos, de coloración amarilla, con poca chapa roja y ligeramente más blandos de carne que los tipos «Jerónimo» y «Calabacero».



Su producción es buena y, con aclareo, se obtienen frutos excelentes y de buena aptitud conservera, aunque son susceptibles a la caída en premaduración.

El «Sudanell S-3359» es un clon, selección del INRA-CTIFL francés, indemne a virus conocidos.

Sudanell 1

Tiene las características del Sudanell y madura del 15 al 25 de agosto.

Andora

Coincide más o menos en maduración con el «Sudanell 1», pero no lo supera en producción, siendo variedad de poco vigor.

Es resistente a la caída de las yemas, pero susceptible a la caída de los frutos en premaduración, aunque en menor proporción que «Sudanell 1», que tiene muy acusado este inconveniente.

Tudor

Esta variedad ha sido desechada por ser menos productiva que otras que maduran en las mismas fechas.

Sudanell 2

Tiene las mismas características que el «Sudanell» y madura entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre en la zona donde está puesto el campo de clones.

Babygold 8

Procedente de Estados Unidos es árbol de gran vigor y productividad muy buena. Tiene las flores campanuláceas.

El peso medio de los frutos es de 150 a 180 g, ligeramente oblongos, con buena coloración y calidad gustativa bastante buena.

Variedad semitardía que se comporta bien en todas las zonas productoras de melocotonero. Se muestra algo resistente a las heladas de primavera.

Babygold 9

Variedad originaria de Estados Unidos. El árbol es de gran vigor y productividad muy buena.

El peso medio de los frutos es de 160 a 185 g. Estos son ligeramente oblongos, de buena coloración y calidad gustativa bastante buena.

Es una buena variedad, bastante rústica, que se comporta bien en todas las zonas aptas para el melocotonero.

Carolyn

Es una variedad vigorosa, resistente a la caída de las yemas.

Su maduración coincide aproximadamente con la de «Sudanell 2», pero no la supera en producción.

Es susceptible a la caída de los frutos en premaduración, aunque en menor proporción que «Sudanell 2», que tiene muy acusado este inconveniente.

Guam

Variedad desechada por ser menos productiva que otras variedades que maduran en las mismas fechas.

Garau

Madura aproximadamente en las mismas fechas que «Sudanell 3», pero su producción no ha superado a la de aquélla.

Gaume

Variedad poco interesante con características muy similares a las de la anterior.

Sudanell 3

Tiene las mismas características que las de «Sudanell». Su fecha de maduración está entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre en la zona en que se viene haciendo el estudio.

Grange

Variedad desechada por ser menos productiva que otras que maduran en las mismas fechas.

Stanford

Variedad que madura, aproximadamente, en la misma época que la variedad autóctona «Amarillo de Gallur». Es similar a



ésta, no superándola más que en la menor caída de frutos en pre-maduración, que es más acusada en la variedad española.

Corona

Esta variedad madura, aproximadamente, en la misma época que la variedad autóctona «Maluenda».

Estas dos variedades, «Corona» y «Maluenda», han resultado ser en todos los aspectos similares y comparables entre sí. La primera supera a la segunda solo en una menor caída de frutos en premaduración.

Amarillo de Gallur

Variedad española de fruto grueso, redondeado, aspecto atractivo y color rojo muy vivo que contrasta con el amarillo intenso de fondo.

Es una variedad de excelente presentación y sabor.

Golden Queen

Variedad de origen desconocido. El árbol es vigoroso y de producción alta y regular. Es resistente a la caída de las yemas.

Su fruto es más bien grueso, de 150 g de peso medio, redondeado, ligeramente achatado y simétrico. Su color es amarillo anaranjado, sin chapa de color.

Es variedad sensible a la lepra y a la mosca de la fruta.

Ha superado ampliamente en producción y peso de fruto por centímetro cuadrado de sección de tronco al clon seleccionado de «Amarillo de Calanda», con el que más o menos coincide en época de maduración.

Es susceptible a la caída de frutos en premaduración, aunque menos que las variedades españolas de su época de maduración.

Tiene buena aptitud conservera, si bien su entrada en el proceso de conservación puede coincidir con la llegada de las primeras peras de la variedad «Williams».

Maluenda

Es similar al «Amarillo de Gallur». Por tanto, es de fruto grueso, redondeado y de aspecto atractivo, con coloración amarilla y roja.

Zaragozano

Es también conocido como «Encarnado de Gallur».

Es variedad de fruto muy grueso, redondeado y fuertemente coloreado de rojo vivo, lo cual contrasta con el amarillo intenso del fondo. Es de excelente presentación y sabor.

Su producción es muy variable según la zona en que se cultive, siendo de poco a muy productivo.

Kakamas

Es variedad de reciente introducción, cuya maduración es ligeramente más tardía que la de la «Golden Queen». Su fruto es semejante al de ésta, es decir, de color amarillo anaranjado muy intenso y sin chapa de color.

En las cosechas recogidas parece ser menos productivo que el «Golden Queen». Cuenta con el inconveniente de tener un alto porcentaje de caída de frutos en premaduración.



Amarillo de Calanda, Calanda San Miguel y Calanda tardío o del Pilar

Son variedades poco productivas aunque en su zona de origen su productividad esté considerada como muy buena, en lo que posiblemente puede influir el microclima de la misma.

Sus frutos son redondeados, de un intenso color amarillo pajizo con muy poca chapa coloreada o carente de ella. Tienen la piel fina.

Contrariamente a lo que es normal, en cuanto al hábito de fructificación en casi todas las variedades de melocotonero, producen mejor en ramillete de mayo y ramas de fruto que en ramas mixtas, por lo que precisan por ello de una poda especial.

Su interés radica en la producción de frutos muy gruesos de bella apariencia, que, por lo tardío, no encuentran competencia alguna.

Su cultivo debe limitarse, sin embargo, a las zonas de producción tradicionales, donde sus frutos son todavía embolsados para protegerlos de parásitos y mantenerlos a salvo de la caída al suelo en premaduración, a la que son muy susceptibles. En estas condiciones, incluso los frutos desprendidos dentro de las bolsas, alcanzan extraordinaria calidad y tienen asegurada salida a los mercados de lujo.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Corazón de Maria, 8 - 28002-Madrid

Se autoriza la reproducción **integral** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».