

# **Reproducción y comercialización de la Strelitzia**

JOSE MANUEL ODRIÓZOLA AZURMENDI

JULIAN ALBERTOS GARCIA

Agentes de Extensión Agraria



## **REPRODUCCION**

La strelitzia se puede reproducir por dos medios: semilla o división de matas.

El primer método, llamado también reproducción sexual, se emplea principalmente cuando se desea plantar grandes superficies sin efectuar costosas inversiones en la compra de la planta. Sin embargo, la producción por semilla tiene los siguientes inconvenientes: se obtienen plantas desiguales por la tendencia al poliformismo de la strelitzia y hay que esperar de cuatro a cinco años para obtener producción floral.

El segundo método, por división de mata o asexual, es un método caro, ya que los hijos adultos adquieren un alto valor en el mercado, y a veces son difíciles de conseguir. Las ventajas de este método son que la plantación entra pronto en producción y las plantas son más uniformes y floríferas, en el caso de que la selección de las plantas a reproducir se haya hecho correctamente.

## **REPRODUCCION POR SEMILLA**

### **Obtención de la semilla**

El primer problema con que se cuenta para reproducir las strelitzias por este método es la obtención de la semilla, pues en nuestras latitudes la strelitzia jamás dará semilla sin la intervención del hombre. En su medio natural, la fecundación de esta planta la realiza el colibrí o pájaro mosca, por lo que la planta es autoestéril en los sitios donde no vive este pájaro.

Fig. 1. - Polinización artificial de la strelitzia. El polen recogido de los estambres de una flor con una espátula es colocado en el estigma de otra flor.



La polinización artificial puede ser directa o cruzada, aunque es preferible este último sistema, en que se toma el polen de una flor y se deposita en el estigma de otra.

Para realizarla lo primero que se debe hacer es *seleccionar las plantas que van a ser madres*, eligiendo aquellas más productivas.

Son más productivas aquellas que han dado más flores, lo que se puede saber llevando un control de la producción por plantón; no obstante, como esto generalmente no se hace, se puede recurrir al aspecto de la planta para decidir cuáles son las mejores.

Según estudios realizados por la Estación de Floricultura de San Remo, resultan más floríferas aquellas plantas que tengan:

- Hojas con limbo triangular y base alargada.
- Hojas cuyo peciolo sea una vez y media o dos veces más largo que el limbo.
- Hojas con un largo de limbo igual a dos o dos veces y media el ancho del mismo.

La *polinización* se hace con la uña o con una espátula de madera a los pocos días de haber abierto la flor.

La época ideal es cuando no son de temer lluvias durante varios meses, que producirían la pudrición de las flores; por



Fig. 2. - Flor de *S. Reginae prolifera*. Tiene dos inflorescencias sobre un mismo escapo. Este tipo de plantas no deben reproducirse, porque sus flores tienen menor valor comercial.

eso se elige el verano o final de primavera, en que, además, la flor tiene menor valor.

Al mes, aproximadamente, de haber sido polinizada la flor ya se observa un engrosamiento en la base de ésta, que indica que está fecundada.

La formación del fruto y la maduración del mismo dura aproximadamente unos ocho o diez meses.

En cada flor se formará uno, dos o tres frutos, que contendrán en su interior la semilla.

El fruto es dehiscente, debiendo recogerse la semilla cuando está abierto y antes de que caiga.

## Siembra

La semilla pierde con rapidez su poder germinativo, por lo que se debe sembrar pronto (de uno a tres meses después de recogidas).

En siembras realizadas con semillas que fueron recogidas hace diez a doce meses, se observa un porcentaje de germinación bastante bajo (40-50 por 100).

La semilla tiene una borra algodonosa cuya misión parece ser el actuar como contrapeso en su diseminación natural, de tal forma que al caer al suelo la borra queda siempre hacia el cielo y la parte opuesta hacia la tierra; este detalle nos indica la forma correcta de colocarla en el semillero.

Los semilleros se pueden hacer con diferentes compost o mezclas de tierras, aunque ha dado un magnífico resultado una capa de turba de unos 15 centímetros de altura solamente. La turba debe estar perfectamente humedecida antes de colocar las semillas, y éstas se pondrán a unos 15 centímetros unas de otras y con la pelusa hacia arriba. El semillero se hará en invernadero o cajonera.

La profundidad a que se entierra la semilla ha sido motivo de controversia durante algún tiempo; no obstante, por ensayos efectuados en la finca Viaflor, por el Perito Agrícola don Carlos Agulló Martínez, se comprobó que cuanto más superficial era ésta, tanto mayor era el porcentaje de nacimientos. Por esto es recomendable colocar las semillas sobre la turba, presionando un poco con el dedo para incrustarlas ligeramente y a continuación cernerles una ligerísima capa de turba que apenas las cubra.

Transcurridos uno o dos meses de la siembra aparecen las primeras plantitas, que continuarán naciendo escalonadamente durante mucho tiempo, incluso años. Se mantendrá durante todo el tiempo que las plantas estén en semillero una temperatura y humedad elevadas, comenzando los abonados y algún tratamiento fungicida cuando las primeras hojas tienen un par de centímetros.

Fig. 3. — Semillero nacido en el interior de un invernadero de polietileno; la plantación fue de 15 cm.; la mezcla empleada es turba, piedra pómez granulada y tierra de jardín.






Fig. 4.- Plantación de strelitzia realizada con planta procedente de división de matas. Es necesario entutorar y atar las hojas para evitar la desecación.

### Trasplante

Cuando las hojas de la planta llegan a los 10 centímetros aproximadamente, y, por tanto, su raíz, quizá algo mayor, está llegando al fondo de la plataforma de cultivo, es preciso hacer el primer trasplante.

Por el contrario, cuando el fondo de turba empleado es mayor y el marco a que se colocó la semilla es más amplio, este trasplante se puede retrasar.

La operación se efectúa regando el compost o turba y procurando descalzar las plantitas sin romper su raíz principal, trasplantándolas a continuación a macetas de polietileno negro de unos 10 centímetros de diámetro y unos 15 centímetros de profundidad.

A partir de este momento la planta sufrirá dos o tres trasplantes más, manteniéndoselas durante todo el tiempo protegidas en umbráculo o invernadero.

A partir del primer trasplante la mezcla de tierra que llevan las macetas ya no es sólo turba, sino algo más compleja; podría ser: 1/3 de turba, 1/3 de arena y 1/3 de tierra buena de

jardín, a la que se le añade un poco de abono de descomposición lenta.

El número de trasplantes que sufre la *strelitzia* depende del tamaño de las macetas a que se vaya pasando y del tiempo que se quiera mantener en éstas sin llevarla al terreno definitivo, cosa que suele ocurrir entre los dos y tres años de sembradas.



Fig. 5. - Buen ejemplar de *strelitzia* adulta. Obsérvense los numerosos hijos y el tamaño y proporción de hojas y flores.





Fig. 6. - Detalle de una planta adulta que ya ha ahijado. Cada abanico de hojas corresponde a un hijo.

## REPRODUCCION POR DIVISION DE MATAS

Este método de reproducción, también llamado asexual, se practica a final de la campaña de exportación, con el fin de no dañar a la planta cuando está produciendo flor, que tiene un precio elevado.

Para la selección de las matas que se han de dividir se seguirán las mismas normas indicadas al tratar de la reproducción por semilla, procurando, además, que las plantas a las que se les quiten hijos no queden muy despobladas.

Una vez seleccionadas las plantas, se atan las hojas de éstas y se descubren las raíces con azada y pico, procurando dañarlas lo menos posible. La separación de hijos, que se distinguen por formar grupos de hojas que adoptan la forma de un abanico, se efectúa con cuchillo grande y fuerte o, mejor aún, con la barreta de deshijar platanera.

A la planta madre se le repasan los cortes para que queden limpios, se extraen del hoyo los restos de raíces, se espolvorean las raíces y la tierra con cal apagada y se vuelve a tapar el hoyo.

Los hijos extraídos reciben análogo tratamiento de limpieza de cortes y espolvoreos con cal, disponiéndose a continuación



Fig. 7. - Reproducción de strelitzia por reproducción en mata. Se descalzan las raíces y se separan los hijos a extraer con una barreta de deshijar plátanos.



Fig. 8. - A la izquierda puede apreciarse que si se extraen varios hijos juntos, se separan con cortes limpios de cuchillo. A la derecha se muestra cómo las heridas que quedan al arrancar los hijos se espolvorean con cal para que se sequen y no se pudran.

sobre sacos secos y a la sombra mientras esperan el momento de ser trasplantados.

En estas circunstancias pueden estar varios días sin que sufran deterioro, alimentándose de sus propias reservas.

## **2) COMERCIALIZACION DE LA STRELITZIA**

Para una buena comercialización, es fundamental la tipificación y normalización del producto a vender.

Hasta hace poco tiempo, la clasificación de la strelitzia por categorías se venía haciendo según fuera de exigente el mercado consumidor. En el año 1968 se establecieron en Francia, y de acuerdo con las normas adoptadas por el Mercado Común Europeo, las normas que transcribimos a continuación:

### **CLASIFICACION**

#### **Categoría «Extra»**

Longitud comprendida entre los 120 centímetros como mínimo y 140 centímetros como máximo (comprendida la flor), con espata de 23 centímetros como mínimo.

#### **Categoría I**

Longitud comprendida entre 100 y 120 centímetros (comprendida la flor), con espata de 20 centímetros como mínimo.

#### **Categoría II**

Longitud comprendida entre 80 y 100 centímetros (comprendida la flor), con espata de 17 centímetros como mínimo.

#### **Categoría III**

Longitud obligatoriamente inferior a 60 centímetros, con espata que puede tener una longitud inferior a 17 centímetros.

### **EMBALAJE**

El embalaje preconizado es el cartón, con longitud máxima de 150 centímetros, anchura 30 centímetros y espesor variable según el número de flores y hojas que contenga.

Las flores se dispondrán en el interior de la caja en número de 5, 10 ó múltiplo de 10, yendo acompañadas por algunas

hojas de strelitzias (8 a 10 para las categorías Extra y I y 6 a 8 para las categorías II y III).

El sistema empleado normalmente por los floricultores para su embalaje es el siguiente:

Cada flor va protegida por un cucurucho plano de papel, que preserva a pétalos y sépalos del roce; dentro de la caja se acolcha el fondo con viruta de papel, sobre la que descansa la flor, y entre flores o camadas de éstas también se debe poner viruta de papel, que acaba acolchando la parte superior.

Los tallos se presionan con un listón de madera, acolchado con viruta de papel y clavado a los laterales de la caja, con el fin de impedir que la flor se mueva durante el transporte.

Por último, las cajas se flejarán con cinta plástica, para evitar su posible abertura.

Mientras la flor aguarda su momento para ser embalada, debe estar a la sombra, metida en poca altura de agua (6-7 centímetros) y, si es posible, en frigorífico a 4-7° C.

## PERSPECTIVAS DEL CULTIVO DE STRELITZIAS

Dada la novedad de su cultivo, lo exóticos que son la forma y el colorido de la flor y el que dura bastantes días en agua después de cortada, es de prever un buen porvenir para esta

Fig. 9. - Se deben suprimir las hojas viejas y secas para facilitar la emisión de las nuevas, evitar refugios a las plagas y darle visibilidad al cultivo.



flor, cuya demanda aumenta constantemente según se la va conociendo.

También incita a cultivarla el que necesita poca mano de obra, aunque el coste fuerte de implantación o la necesidad de esperar varios años para obtener las primeras flores, según la forma en que se inicie el cultivo, retrae a muchas personas a dedicarse a esta actividad.

### BIBLIOGRAFIA

- *Exótica-3*. — GRAF, A. B. Ed. Roehrf. Rutherford (USA), 1963.
- *Floricultura industriale*: Stefano Bensa. Edizioni Agricole. Bologna, 1966.
- *P. H. M.* de febrero de 1966 (autor: J. C. Cayrol, Ingeniero Hortícola).
- *Diseases and Pest of Ornamental Plants*: Pascal P. Pirone y otros.

**PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA**  
**Bravo Murillo, 101. Madrid-20**

Se autoriza la reproducción **íntegra**  
de esta publicación mencionando  
su origen: «Hojas Divulgadoras del  
Ministerio de Agricultura».