

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

复数的引入

考虑二次方程

$$Ax^2 + Bx + C = 0$$

其通解为

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

当 $4AC > B^2$ 时, 便会出现复数

$$x = \frac{-B \pm i\sqrt{4AC - B^2}}{2A}$$

Definition (虚单位)

$$i^2 = -1 \quad (1)$$

为 -1 的平方根中的一个, 称为**虚单位**

Definition (复数)

$z = x + iy$ 定义为满足以下运算规则的一对有序实数 (x, y) :

加法 $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ (2a)

乘法 $(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2,$
 $x_1y_2 - y_1x_2)$ (2b)

Definition (虚单位)

$$i^2 = -1 \quad (1)$$

为 -1 的平方根中的一个, 称为**虚单位**

Definition (复数)

$z = x + iy$ 定义为满足以下运算规则的一对有序实数 (x, y) :

$$\text{加法} \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (2a)$$

$$\begin{aligned} \text{乘法} \quad (x_1, y_1)(x_2, y_2) = & (x_1x_2 - y_1y_2, \\ & x_1y_2 - y_1x_2) \end{aligned} \quad (2b)$$

Definition (复数域)

所有复数的集合, 记为 \mathbb{C} .

Definition (实部)

$$\operatorname{Re} z = x$$

Definition (虚部)

$$\operatorname{Im} z = y$$

Definition (相等)

$$z = 0 \iff x = y = 0 \quad (3a)$$

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \ \& \ y_1 = y_2 \quad (3b)$$

Definition (复数域)

所有复数的集合, 记为 \mathbb{C} .

Definition (实部)

$$\operatorname{Re} z = x$$

Definition (虚部)

$$\operatorname{Im} z = y$$

Definition (相等)

$$z = 0 \iff x = y = 0 \quad (3a)$$

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \ \& \ y_1 = y_2 \quad (3b)$$

Definition (复数域)

所有复数的集合, 记为 \mathbb{C} .

Definition (实部)

$$\operatorname{Re} z = x$$

Definition (虚部)

$$\operatorname{Im} z = y$$

Definition (相等)

$$z = 0 \iff x = y = 0 \quad (3a)$$

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \ \& \ y_1 = y_2 \quad (3b)$$

Definition (复数域)

所有复数的集合, 记为 \mathbb{C} .

Definition (实部)

$$\operatorname{Re} z = x$$

Definition (虚部)

$$\operatorname{Im} z = y$$

Definition (相等)

$$z = 0 \iff x = y = 0 \quad (3a)$$

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \ \& \ y_1 = y_2 \quad (3b)$$

代数运算

作为代数, 复数运算遵从一般的代数运算规则

- ① 加法交换律 $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- ② 加法结合律 $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$
- ③ 乘法交换律 $z_1 z_2 = z_2 z_1$
- ④ 乘法结合律 $z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$
- ⑤ 乘法对加法的分配律 $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

加上复数虚单位 i 的性质 (1) 即可完全确定复数的运算.

代数运算

作为代数, 复数运算遵从一般的代数运算规则

- ① 加法交换律 $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- ② 加法结合律 $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$
- ③ 乘法交换律 $z_1 z_2 = z_2 z_1$
- ④ 乘法结合律 $z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$
- ⑤ 乘法对加法的分配律 $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

加上复数虚单位 i 的性质 (1) 即可完全确定复数的运算.

代数运算举例

① 加法 (減法)

$$\begin{aligned} z_1 \pm z_2 &= (x_1 + iy_1) \pm (x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2) \end{aligned} \quad (4)$$

② 乘法

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned} \quad (5)$$

代数运算举例 (cont.)

3 除法 ($z_2 \neq 0$)

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \\ &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2} \\ &= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}\end{aligned}\quad (6)$$

其中 $x_2 - iy_2$ 为 $z_2 = x_2 + iy_2$ 的复共扼



Definition (复共扼)

$$z^* = (x + iy)^* = x - iy \quad (7)$$

复共扼是一个相互关系

$$(z^*)^* = z \quad (8)$$

显然

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \quad (9a)$$

$$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^* \quad (9b)$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*} \quad (9c)$$

Definition (复共扼)

$$z^* = (x + iy)^* = x - iy \quad (7)$$

复共扼是一个相互关系

$$(z^*)^* = z \quad (8)$$

显然

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \quad (9a)$$

$$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^* \quad (9b)$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*} \quad (9c)$$

Definition (复共扼)

$$z^* = (x + iy)^* = x - iy \quad (7)$$

复共扼是一个相互关系

$$(z^*)^* = z \quad (8)$$

显然

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \quad (9a)$$

$$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^* \quad (9b)$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2} \right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*} \quad (9c)$$

Example

求 $w = \sqrt{z}$, 即 $w^2 = z$.

复数的平方根

设 $z = a + ib$, $w = x + iy$. 满足

$$(x + iy)^2 = a + ib$$

即

$$(x^2 - y^2) + i(2xy) = a + ib$$

必须

$$x^2 - y^2 = a$$

$$2xy = b$$

复数的平方根 (cont.)

解得 ($b \geq 0$)

$$w = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} + i \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \right)$$

或 ($b < 0$)

$$w = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} - i \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \right)$$



Example

求解 $z^4 + i = 0$.

Solution

令 $z^2 = w$. 则 $w^2 = -i$. 带入公式, 令 $a = 0$
及 $b = -1$

$$w = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right)$$

先考虑方程 $z^2 = (1 - i)/\sqrt{2}$. 同样, 带入公式,
令 $a = 1/\sqrt{2}$ 及 $b = -1/\sqrt{2}$, 得两解

$$z = \pm \left(\frac{\sqrt{1 + \sqrt{2}}}{2^{3/4}} - i \frac{\sqrt{-1 + \sqrt{2}}}{2^{3/4}} \right)$$

Solution (cont.)

另两解为

$$z = \pm \left(\frac{\sqrt{-1 + \sqrt{2}}}{2^{3/4}} + i \frac{\sqrt{1 + \sqrt{2}}}{2^{3/4}} \right)$$



Theorem

设 z 为复数. 则总存在另一复数 w 为其平方根, 使得 $w^2 = z$.

Note

$-w$ 为其另一个平方根.

Theorem

设 z 为复数. 则总存在另一复数 w 为其平方根, 使得 $w^2 = z$.

Note

$-w$ 为其另一个平方根.

复数不能比较大小

有序域 = $\{0, \text{正数}, \text{负数}\}$

可得,

$$\forall a \in \text{有序域}, \quad a^2 = a \cdot a \geq 0$$


但复数域 \mathbb{C} 有 $i^2 = -1$.

复变函数


- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

复数的几何表示

一个复数可用复平面 (也用 \mathbb{C} 表示) 上的一个点表示. 还可以表示为复平面的一个矢量.



根据复数的加法规则, 可以看出复数加法的几何意义: 矢量相加的平行四边形法则



直角坐标 (x, y) 到极坐标 (r, θ)

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (10)$$

得

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (11)$$

Definition (模)

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Definition (辐角)

$$\arg z = \theta$$

直角坐标 (x, y) 到极坐标 (r, θ)

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (10)$$

得

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (11)$$

Definition (模)

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Definition (辐角)

$$\arg z = \theta$$

直角坐标 (x, y) 到极坐标 (r, θ)

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (10)$$

得

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (11)$$

Definition (模)

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Definition (辐角)

$$\arg z = \theta$$

直角坐标 (x, y) 到极坐标 (r, θ)

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (10)$$

得

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (11)$$


Definition (模)

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Definition (辐角)

$$\arg z = \theta$$

辐角的多值性




$$\theta = \theta_p + 2\pi k \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Definition (主辐角)

θ_p 为辐角的主值 ($-\pi < \theta_p \leq \pi$)

辐角的多值性



$$\theta = \theta_p + 2\pi k \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Definition (主辐角)

θ_p 为辐角的主值 ($-\pi < \theta_p \leq \pi$)

Example

把下列关系用几何图形表示出来

- ① $\arg(1 - z) = 0$
- ② $\arg(1 + z) = \frac{\pi}{3}$
- ③ $\arg(z + 1 - i) = \frac{\pi}{2}$

等式的几何表示.

复数 $z = x + iy$ 代表复平面上的一点, 复数的一个等式关系则通常代表复平面上的一段曲线.

- ① $1 - z$ 为复平面上两矢量 1 和 z 之差, $1 - z$ 沿 x 轴, 所以 z 应在 x 轴上且小于 1 .
- ② $1 + z$ 则为复平面上两矢量 z 和 -1 之差, $1 + z$ 辐角 60° , 为 -1 点引出的一条射线.
- ③ $z + 1 - i$ 为 z 与 $-1 + i$ 之差, 所以为由 $-1 + i$ 引出平行 y 轴的一条射线.



等式的几何表示.

复数 $z = x + iy$ 代表复平面上的一点, 复数的一个等式关系则通常代表复平面上的一段曲线.

- ① $1 - z$ 为复平面上两矢量 1 和 z 之差, $1 - z$ 沿 x 轴, 所以 z 应在 x 轴上且小于 1 .
- ② $1 + z$ 则为复平面上两矢量 z 和 -1 之差, $1 + z$ 辐角 60° , 为 -1 点引出的一条射线.
- ③ $z + 1 - i$ 为 z 与 $-1 + i$ 之差, 所以为由 $-1 + i$ 引出平行 y 轴的一条射线.



等式的几何表示.

复数 $z = x + iy$ 代表复平面上的一点, 复数的一个等式关系则通常代表复平面上的一段曲线.

- ① $1 - z$ 为复平面上两矢量 1 和 z 之差, $1 - z$ 沿 x 轴, 所以 z 应在 x 轴上且小于 1 .
- ② $1 + z$ 则为复平面上两矢量 z 和 -1 之差, $1 + z$ 辐角 60° , 为 -1 点引出的一条射线.
- ③ $z + 1 - i$ 为 z 与 $-1 + i$ 之差, 所以为由 $-1 + i$ 引出平行 y 轴的一条射线.




等式的几何表示.


复数 $z = x + iy$ 代表复平面上的一点, 复数的一个等式关系则通常代表复平面上的一段曲线.

- ① $1 - z$ 为复平面上两矢量 1 和 z 之差, $1 - z$ 沿 x 轴, 所以 z 应在 x 轴上且小于 1 .
- ② $1 + z$ 则为复平面上两矢量 z 和 -1 之差, $1 + z$ 辐角 60° , 为 -1 点引出的一条射线.
- ③ $z + 1 - i$ 为 z 与 $-1 + i$ 之差, 所以为由 $-1 + i$ 引出平行 y 轴的一条射线.






$$\arg(1 - z) = 0$$




$$\arg(1 + z) = \frac{\pi}{3}$$



$$\arg(z + 1 - i) = \frac{\pi}{2}$$

复共扼 z^* 的几何表示



如图

$$\arg z = -\arg z^* \quad (12)$$

我们有

$$z \cdot z^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad (13)$$

复数相乘

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned} \quad (14)$$

Theorem (复数乘法)

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2| \quad (15)$$

$$\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (16)$$

Note

复数辐角可相差 2π 的整数倍

复数相乘

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned} \quad (14)$$

Theorem (复数乘法)

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2| \quad (15)$$

$$\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (16)$$

Note

复数辐角可相差 2π 的整数倍

复数相乘

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned} \quad (14)$$

Theorem (复数乘法)

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2| \quad (15)$$

$$\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (16)$$

Note

复数辐角可相差 2π 的整数倍

复数相除

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)] \quad (17)$$

Theorem (复数除法)

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (18)$$

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2 \quad (19)$$

复数相除


$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)] \quad (17)$$

Theorem (复数除法)

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (18)$$

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2 \quad (19)$$

复数乘法的几何表示



如图, 两个阴影三角形为相似三角形.

De Moirre 定理 (棣美佛 1667–1754)

几个复数相乘时

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n [\cos(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) + i \sin(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)] \quad (20)$$

令 $z_1 = z_2 = \cdots = z_n$

Theorem (De Moirre 定理)

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (21)$$

De Moirre 定理 (棣美佛 1667–1754)

几个复数相乘时

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n [\cos(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) + i \sin(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)] \quad (20)$$

令 $z_1 = z_2 = \cdots = z_n$

Theorem (De Moirre 定理)

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (21)$$

Example

复数的 n 次方根. 求 $w = \sqrt[n]{z}$ 即 $w^n = z$.

Solution

设

$$z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$$

同样

$$w = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

由 De Moirre 定理

$$w^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

比较, 得

$$\rho = r^n$$

$$\phi = n\theta$$

Solution (cont.)

即

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$\theta = \frac{\phi}{n}$$

于是

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\phi}{n} + i \sin \frac{\phi}{n} \right)$$

Solution (cont.)

考虑到辐角的多值性, 得到 n 个不同的根

$$\left(\sqrt[n]{z}\right)_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\phi_p + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\phi_p + 2\pi k}{n} \right)$$

$$-\pi < \phi_p \leq \pi, k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$



Theorem (n 次方根)

设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 它的 n 次方根为 n 个复数

$$\left(\sqrt[n]{z}\right)_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right), \\ k = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \quad (22)$$

Example

求 i 的平方根

Theorem (n 次方根)

设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 它的 n 次方根为 n 个复数

$$\left(\sqrt[n]{z}\right)_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right), \\ k = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \quad (22)$$

Example

求 i 的平方根

Solution

$$i = 1\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

所以

$$\begin{aligned} (\sqrt{i})_k &= \sqrt{1} \left(\cos \frac{\pi/2 + 2\pi k}{2} + i \sin \frac{\pi/2 + 2\pi k}{2} \right) \\ &= \cos \left(\frac{\pi}{4} + \pi k \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \pi k \right) \end{aligned}$$

Solution (cont.)

$k = 0, 1$. 两根分别为

$$(\sqrt{i})_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}$$

$$(\sqrt{i})_1 = \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}$$

即

$$\sqrt{i} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$$



Example

求解 $z^8 = 1$.

Solution.

因为

$$1 = \cos 0 + i \sin 0$$

由 n 次方根定理

$$\begin{aligned} z &= \cos \frac{k2\pi}{8} + i \sin \frac{k2\pi}{8}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 7 \\ &= 1, \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, i, \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, -1, \\ &\quad \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}, -i, \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



Example

求解 $z^8 = 1$.

Solution.

因为


$$1 = \cos 0 + i \sin 0$$

由 n 次方根定理

$$\begin{aligned} z &= \cos \frac{k2\pi}{8} + i \sin \frac{k2\pi}{8}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 7 \\ &= 1, \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, i, \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, -1, \\ &\quad \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}, -i, \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



如图, 八个根 $z = \sqrt[8]{1}$ 均匀分布在单位圆上.



复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

复变函数

与实函数定义相仿

Definition (函数)

设在复平面 \mathbb{C} 上有一点集 E , 如果对于 E 内每一个 z 值, 都有一个或多个^a复数值 w 与之对应, 则称 w 为 z 的函数. 记为 $w = f(z)$. E 为其定义域.

^a多值函数

即 $\forall z \in E, \exists w = f(z)$

复变函数

与实函数定义相仿

Definition (函数)

设在复平面 \mathbb{C} 上有一点集 E , 如果对于 E 内每一个 z 值, 都有一个或多个^a复数值 w 与之对应, 则称 w 为 z 的函数. 记为 $w = f(z)$. E 为其定义域.

^a多值函数

即 $\forall z \in E, \exists w = f(z)$

$$z = x + \mathrm{i}y$$

$$w = u + \mathrm{i}v$$

所以

$$\begin{aligned} w = f(z) &= f(x, y) \\ &= u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y) \end{aligned} \quad (23)$$

复变函数不过是两个二元实变函数的有序组合.

Example

设 $z = x + \mathrm{i}y$, 求 $\frac{z+2}{z-1}$ 的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$.

$$z = x + \mathrm{i}y$$

$$w = u + \mathrm{i}v$$

所以

$$\begin{aligned} w &= f(z) = f(x, y) \\ &= u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y) \end{aligned} \quad (23)$$

复变函数不过是两个二元实变函数的有序组合.

Example

设 $z = x + \mathrm{i}y$, 求 $\frac{z+2}{z-1}$ 的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$.

$$z = x + iy$$

$$w = u + iv$$

所以

$$\begin{aligned} w &= f(z) = f(x, y) \\ &= u(x, y) + iv(x, y) \end{aligned} \quad (23)$$

复变函数不过是两个二元实变函数的有序组合.

Example

设 $z = x + iy$, 求 $\frac{z+2}{z-1}$ 的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$.

Solution

$$\begin{aligned}\frac{z+2}{z-1} &= \frac{(x+2) + iy}{(x-1) + iy} = \frac{(x+2) + iy}{(x-1) + iy} \cdot \frac{(x-1) - iy}{(x-1) - iy} \\ &= \frac{(x+2)(x-1) + y^2 + i[y(x-1) - y(x+2)]}{(x-1)^2 + y^2}\end{aligned}$$

Solution (cont.)

这样,

$$u(x, y) = \operatorname{Re} \left(\frac{z+2}{z-1} \right) = \frac{x^2 + x - 2 + y^2}{(x-1)^2 + y^2}$$
$$v(x, y) = \operatorname{Im} \left(\frac{z+2}{z-1} \right) = \frac{-3y}{(x-1)^2 + y^2}$$



一些初等函数

除了多项式外, 基本的函数还有三角函数和指数函数.

实变函数

Taylor 展开

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (24)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad (25)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (26)$$

复变函数

三角函数和指数函数可以定义为幂级数, 且其幂级数展开式与相应实变函数的幂级数展开式相同

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (27)$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (28)$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (29)$$

令 $z = i\theta$, 即得

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

Theorem (Euler 公式)

(欧拉 1707–1783)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (30)$$

令 $z = i\theta$, 即得

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

Theorem (Euler 公式)

(欧拉 1707–1783)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (30)$$

复数的指数表示

复数 z 的极坐标表示可简单地记为

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} = |z|e^{i \arg z} \quad (31)$$

复数的乘法和除法运算简化为 (由 (15), (16) 和 (18), (19) 得)

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (32)$$

$$z_1 \cdots z_n = r_1 \cdots r_n e^{i(\theta_1 + \cdots + \theta_n)} \quad (33)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (34)$$

复数的指数表示

复数 z 的极坐标表示可简单地记为

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} = |z|e^{i \arg z} \quad (31)$$

复数的乘法和除法运算简化为 (由 (15), (16) 和 (18), (19) 得)

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (32)$$

$$z_1 \cdots z_n = r_1 \cdots r_n e^{i(\theta_1 + \cdots + \theta_n)} \quad (33)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (34)$$

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

Definition (邻域)

复平面上 $|z - a| = r$ 为一圆. 圆内 $|z - a| < r$ ($r > 0$) 称为以 a 为中心, r 为半径的圆盘或 a 的一个邻域, 或 r -邻域.

$|z - a| \leq r$ 则称为以 a 为中心, r 为半径的闭圆盘

Definition (空心邻域)

z_0 的空心邻域, 指的是以 z_0 为圆心的环域 $0 < |z - z_0| < \delta$.

Definition (邻域)

复平面上 $|z - a| = r$ 为一圆. 圆内 $|z - a| < r$ ($r > 0$) 称为以 a 为中心, r 为半径的圆盘或 a 的一个邻域, 或 r -邻域.

$|z - a| \leq r$ 则称为以 a 为中心, r 为半径的闭圆盘

Definition (空心邻域)

z_0 的空心邻域, 指的是以 z_0 为圆心的环域 $0 < |z - z_0| < \delta$.

Definition (内点)

给定集合 E , a 属于 E , 如果以点 a 为圆心作一个圆, 当半径 ϵ 足够小时, 圆内所有点 $|z - a| < \epsilon$ 都属于点集 E , 即 $z \in E$, 则称点 a 为点集 E 的一个内点.

即存在 a 的某个邻域完全包含在 E 内

Definition (孤立点)

给定集合 E , a 属于 E , 如果以点 a 为圆心作一个圆, 当半径 ϵ 足够小时, 空心邻域 $0 < |z - a| < \epsilon$ 内所有点 z 都不属于点集 E , 即 $z \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个孤立点.

Definition (内点)

给定集合 E , a 属于 E , 如果以点 a 为圆心作一个圆, 当半径 ϵ 足够小时, 圆内所有点 $|z - a| < \epsilon$ 都属于点集 E , 即 $z \in E$, 则称点 a 为点集 E 的一个内点.

即存在 a 的某个邻域完全包含在 E 内

Definition (孤立点)

给定集合 E , a 属于 E , 如果以点 a 为圆心作一个圆, 当半径 ϵ 足够小时, 空心邻域 $0 < |z - a| < \epsilon$ 内所有点 z 都不属于点集 E , 即 $z \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个孤立点.

Definition (边界点)

给定集合 E , 如果以点 a 为圆心作一个任意半径 ϵ 的圆, 圆内总有两点 z_1 和 z_2 , $|z_{1,2} - a| < \epsilon$, 其中 $z_1 \in E$ 而 $z_2 \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个边界点.

Note

边界点既不是集 E 的内点, 也不是其补集 $\mathbb{C} \setminus E$ 的内点.

Note

边界点包括 E 的孤立点.

Note

集合的边界点不一定属于集合.

Definition (边界点)

给定集合 E , 如果以点 a 为圆心作一个任意半径 ϵ 的圆, 圆内总有两点 z_1 和 z_2 , $|z_{1,2} - a| < \epsilon$, 其中 $z_1 \in E$ 而 $z_2 \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个边界点.

Note

边界点既不是集 E 的内点, 也不是其补集 $\mathbb{C} \setminus E$ 的内点.

Note

边界点包括 E 的孤立点.

Note

集合的边界点不一定属于集合.

Definition (边界点)

给定集合 E , 如果以点 a 为圆心作一个任意半径 ϵ 的圆, 圆内总有两点 z_1 和 z_2 , $|z_{1,2} - a| < \epsilon$, 其中 $z_1 \in E$ 而 $z_2 \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个边界点.

Note

边界点既不是集 E 的内点, 也不是其补集 $\mathbb{C} \setminus E$ 的内点.

Note

边界点包括 E 的孤立点.

Note

集合的边界点不一定属于集合.

Definition (边界点)

给定集合 E , 如果以点 a 为圆心作一个任意半径 ϵ 的圆, 圆内总有两点 z_1 和 z_2 , $|z_{1,2} - a| < \epsilon$, 其中 $z_1 \in E$ 而 $z_2 \notin E$, 则称点 a 为点集 E 的一个边界点.

Note

边界点既不是集 E 的内点, 也不是其补集 $\mathbb{C} \setminus E$ 的内点.

Note

边界点包括 E 的孤立点.

Note

集合的边界点不一定属于集合.

Definition (内部)

集合 E 的**内部**由所有 E 的内点组成. 记为 \mathring{E}

Definition (边界)

集合 E 的**边界**由所有 E 的边界点组成. 记为 ∂E

Definition (闭包)

集合 E 的**闭包**由 E 加上 E 的所有边界点组成.
记为 \overline{E}

显然

$$\overline{E} = E + \partial E = \mathring{E} + \partial E$$

Definition (内部)

集合 E 的**内部**由所有 E 的内点组成. 记为 \mathring{E}

Definition (边界)

集合 E 的**边界**由所有 E 的边界点组成. 记为 ∂E

Definition (闭包)

集合 E 的**闭包**由 E 加上 E 的所有边界点组成.
记为 \overline{E}

显然

$$\overline{E} = E + \partial E = \mathring{E} + \partial E$$

Definition (内部)

集合 E 的**内部**由所有 E 的内点组成. 记为 \mathring{E}

Definition (边界)

集合 E 的**边界**由所有 E 的边界点组成. 记为 ∂E

Definition (闭包)

集合 E 的**闭包**由 E 加上 E 的所有边界点组成.
记为 \overline{E}

显然

$$\overline{E} = E + \partial E = \mathring{E} + \partial E$$

Definition (内部)

集合 E 的**内部**由所有 E 的内点组成. 记为 \mathring{E}

Definition (边界)

集合 E 的**边界**由所有 E 的边界点组成. 记为 ∂E

Definition (闭包)

集合 E 的**闭包**由 E 加上 E 的所有边界点组成.
记为 \overline{E}

显然

$$\overline{E} = E + \partial E = \mathring{E} + \partial E$$

Definition (开集)

如果集 E 即它的内部, 则 E 称为开集

即开集 E 的点全部是内点: $E = \mathring{E}$

Definition (闭集)

如果集 E 即它的闭包, 则 E 称为闭集

即闭集 E 包括它的所有边界点: $E = \overline{E}$

Note

任何集合 E 的闭包 \overline{E} 必然是一闭集

Definition (开集)

如果集 E 即它的内部, 则 E 称为开集

即开集 E 的点全部是内点: $E = \mathring{E}$

Definition (闭集)

如果集 E 即它的闭包, 则 E 称为闭集

即闭集 E 包括它的所有边界点: $E = \overline{E}$

Note

任何集合 E 的闭包 \overline{E} 必然是一闭集

Definition (开集)

如果集 E 即它的内部, 则 E 称为**开集**

即开集 E 的点全部是内点: $E = \mathring{E}$

Definition (闭集)

如果集 E 即它的闭包, 则 E 称为**闭集**


即闭集 E 包括它的所有边界点: $E = \overline{E}$

Note

任何集合 E 的闭包 \overline{E} 必然是一闭集

Example

圆盘 $E : |z - a| < r$



Solution.


$\forall z_0 \in E$, 显然 $\exists \epsilon > 0$, 使得 z_0 的 ϵ -邻域 $|z - z_0| < \epsilon$ 内所有点 z 都属于圆盘即 $z \in E$. 于是圆盘 $E : |z - a| < r$ 中的点全部是它的内点. 因此圆盘 (邻域) 是一个开集.

E 的闭包 \overline{E} 即闭圆盘 $|z - a| \leq r$, 它是一个闭集
 E 的边界为 $\partial E = \overline{E} - E$ 由圆 $|z - a| = r$ 组成



Example

圆盘 $E : |z - a| < r$



Solution.


$\forall z_0 \in E$, 显然 $\exists \epsilon > 0$, 使得 z_0 的 ϵ -邻域 $|z - z_0| < \epsilon$ 内所有点 z 都属于圆盘即 $z \in E$. 于是圆盘 $E : |z - a| < r$ 中的点全部是它的内点. 因此圆盘 (邻域) 是一个开集.

E 的闭包 \overline{E} 即闭圆盘 $|z - a| \leq r$, 它是一个闭集
 E 的边界为 $\partial E = \overline{E} - E$ 由圆 $|z - a| = r$ 组成



Example

$$E : 0 < |z - a| < r$$



Solution.

E 为开集


\overline{E} 仍为闭圆盘 $|z - a| \leq r$

∂E 由圆 $|z - a| = r$ 及孤立点 $z = 0$ 组成



Example

$$E : 0 < |z - a| < r$$



Solution.

E 为开集

\overline{E} 仍为闭圆盘 $|z - a| \leq r$

∂E 由圆 $|z - a| = r$ 及孤立点 $z = 0$ 组成




Definition (区域)

区域为具有下列两个性质的点集

- ① 开集: 全部由内点组成
- ② 连通性: 点集中任意两点都可以用一条折线连接起来, 折线上的点全都属于此点集

Example


下列点集是否区域?



(a)



(b)



(c)

区域与非区域.

由区域定义来判断:


- (a) 是
- (b) 有洞也是
- (c) 自相交不是. 看似有交点, 但交点非内点




区域用不等式表示

等式代表复平面上的一段曲线, 而一个关于复数的不等式则通常代表复平面上的一个区域.


下图中, 不等式 $|z| < 2$ 和 $|z| > 2$ 都是区域 (等式 $|z| = 2$ 为闭集)



$$|z| < 2$$




$$|z| = 2$$




$$|z| > 2$$

区域用不等式表示 (cont.)

同样, 下图中, 不等式 $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2}$ 和 $1 < \operatorname{Im} z < 2$ 也是区域



$$\operatorname{Re} z > 1/2$$



$$1 < \operatorname{Im} z < 2$$

Definition (闭区域)

区域 G 的闭包 \overline{G} 即区域 G 加上边界 ∂G 构成闭区域

通常用 G 代表区域, \overline{G} 代表闭区域, C 代表边界.
则

$$\overline{G} = G + \partial G = G + C \quad (35)$$

Definition (闭区域)

区域 G 的闭包 \overline{G} 即区域 G 加上边界 ∂G 构成闭区域

通常用 G 代表区域, \overline{G} 代表闭区域, C 代表边界. 则

$$\overline{G} = G + \partial G = G + C \quad (35)$$

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

复变函数中极限和连续概念是建立在邻域概念上的

Definition (极限)

设函数在 z_0 的空心邻域内有定义. 如果存在复数 A , $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta(\epsilon) > 0$, 使当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \epsilon$, 则称 $z \rightarrow z_0$ 时, $f(z)$ 的极限存在. A 为其极限值(或极限), 表示为

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \quad (36)$$

Definition (连续)

设函数在 z_0 的邻域内有定义. 如果

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \quad (37)$$

即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon) > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - f(z_0)| < \epsilon$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点连续

Note

函数在区域 G 内的每一点都连续, 称为在 G 内连续.

函数在闭区域 \bar{G} 上的每一点都连续, 称为在 \bar{G} 内连续.

Definition (连续)

设函数在 z_0 的邻域内有定义. 如果

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \quad (37)$$

即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon) > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - f(z_0)| < \epsilon$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点连续

Note

函数在区域 G 内的每一点都连续, 称为在 G 内连续.

函数在闭区域 \overline{G} 上的每一点都连续, 称为在 \overline{G} 内连续.

Theorem

连续函数的和、差、积、商 (分母不为零), 以及复合函数仍是连续函数.

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

无穷远点

为了方便, 常引入无穷远点 (或无穷大) ∞ , 满足 $(\forall z \in \mathbb{C})$

$$z + \infty = \infty \quad (38a)$$

$$z \cdot \infty = \infty \quad (z \neq 0) \quad (38b)$$

$$\infty \cdot \infty = \infty \quad (38c)$$

Note

与实数域不同 (它有两个无穷大 $+\infty$ 和 $-\infty$), 复数域只有一个无穷远点. 原因是复数域不是一个有序域.

无穷远点

为了方便, 常引入无穷远点 (或无穷大) ∞ , 满足 $(\forall z \in \mathbb{C})$

$$z + \infty = \infty \quad (38a)$$

$$z \cdot \infty = \infty \quad (z \neq 0) \quad (38b)$$

$$\infty \cdot \infty = \infty \quad (38c)$$

Note

与实数域不同 (它有两个无穷大 $+\infty$ 和 $-\infty$), 复数域只有一个无穷远点. 原因是复数域不是一个有序域.


Definition

扩充的复数域 和扩充的复平面

$$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} + \infty$$

Riemann 球表示

可以用 **Riemann 球表示** 来理解扩充的复平面.



Definition (无穷远点的邻域)

定义为 $|z| > M$ ($M > 0$).

Definition (无穷远点的极限)

设函数在 ∞ 的邻域内有定义. 如果存在复数 A , $\forall \epsilon > 0, \exists M(\epsilon) > 0$, 使当 $|z| > M$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \epsilon$, 则称 $z \rightarrow \infty$ 时, $f(z)$ 的极限存在. A 为其极限值(或极限), 表示为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \quad (39)$$

Definition (无穷远点的邻域)

定义为 $|z| > M$ ($M > 0$).

Definition (无穷远点的极限)

设函数在 ∞ 的邻域内有定义. 如果存在复数 A , $\forall \epsilon > 0, \exists M(\epsilon) > 0$, 使当 $|z| > M$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \epsilon$, 则称 $z \rightarrow \infty$ 时, $f(z)$ 的极限存在. A 为其极限值(或极限), 表示为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \quad (39)$$

Definition (无穷远点的函数值)

设函数在 ∞ 的极限存在. 定义

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty) \quad (40)$$

并称 $f(z)$ 在 ∞ 点连续

无穷远点只不过是一个极限过程. 若令 $z = \frac{1}{w}$, 则

无穷远点的邻域 $|z| > M$ 便是 $|w| < \frac{1}{M}$,

为 $w = 0$ 点的邻域. 所以

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{w}\right) \quad (41)$$

Definition (无穷远点的函数值)

设函数在 ∞ 的极限存在. 定义

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty) \quad (40)$$

并称 $f(z)$ 在 ∞ 点连续

无穷远点只不过是一个极限过程. 若令 $z = \frac{1}{w}$, 则

无穷远点的邻域 $|z| > M$ 便是 $|w| < \frac{1}{M}$,

为 $w = 0$ 点的邻域. 所以

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{w}\right) \quad (41)$$

复变函数

- 复数及其运算规则
- 复数的几何表示
- 复变函数
- 复平面的拓扑简介
- 极限和连续
- 无穷远点
- 有界区域

Definition (有界)

若存在正实数 $M > 0$, 所有点集 E 的点 z 都满足 $|z| < M$, 则称点集 E 有界

Theorem (连续函数有界性)

在有界闭区域 \overline{G} 上连续的函数 $f(z)$, $|f(z)|$ 在 \overline{G} 中有界, 并达到它的上下界.

Definition (有界)

若存在正实数 $M > 0$, 所有点集 E 的点 z 都满足 $|z| < M$, 则称点集 E 有界

Theorem (连续函数有界性)

在有界闭区域 \overline{G} 上连续的函数 $f(z)$, $|f(z)|$ 在 \overline{G} 中有界, 并达到它的上下界.

在引入扩充的复平面后, 连续函数的有界性定理可表为

Theorem (推广的连续函数有界性)

在扩充的复平面内, 闭区域 \overline{G} 上连续的函数 $f(z)$, $|f(z)|$ 在 \overline{G} 中有界, 并达到它的上下界.

这是因为在扩充的复平面, 我们可以将闭区域 \overline{G} 拆为两部分: $|z| \leq M$ 和 $|z| \geq M$. 第一部分为有界闭区域, 而第二部分在变换 $z = \frac{1}{w}$ 后, 也是 w 平面的一个有界闭区域.