Analízis 2.
Programtervező informatikus A. szakirány

Definíciók és tételek

2022-2023. tanév 1. félév

Petrányi Bálint

2022. október 24.

Remélem nem írtam el semmit illetve hogy jól értelmeztem a kérdéseket ha mégis írjatok hogy mit hibáztam és kijavítom.

Tartalomjegyzék

2. Gyakorlat elméleti kérdései **2**

3. Gyakorlat elméleti kérdései **4**

4. Gyakorlat elméleti kérdései **6**

5. Gyakorlat elméleti kérdései **8**

6. Gyakorlat elméleti kérdései **10**

7. Gyakorlat elméleti kérdései **11**

2. Gyakorlat elméleti kérdései

1. Mi a belső pont definíciója?

Legyen $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az $a \subset \mathbb{R}$ pont az A halmaz egyes belső pontja, ha $\exists \delta > 0$ olyan, hogy $k_\delta \subset A$.

Emlékeztető: $k_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$

jelölés: az A belső pontjainak halmazát az A belsejének hívjuk és int A-val jelöljük.

2. Mikor mondjuk azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$

Akkor ha

$$\exists \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

Jelölése: $f \in \mathcal{D}\{a\}$

3. Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és a folytonosság között?

$$f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f \in D\{a\} \quad \Longrightarrow \quad f \in C\{a\}$$

Szóban: Ha egy valós-valós függvény differenciálható egy pontban, akkor folytonos abban a pontban.

4. Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra lineáris közelítéssel?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\}$$
$$\Updownarrow$$
$$\exists A \in \mathbb{R}, \text{ és } \epsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}, \lim_a \epsilon = 0 \quad \text{úgy, hogy} \quad f(x) - f(a) = A(x-a) + \epsilon(x)(x-a)$$

5. Mi az érintő definíciója?

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor az

$$e_a f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad e_a f(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$$

egyenesest az f függvény a pontbeli érintőjének hívjuk .

6. Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

$$f, g \in D\{a\} \quad \Longrightarrow \quad f \cdot g \in D\{a\}, \text{ és } (f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

7. Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

$$f, g \in D\{a\} \text{ és } g(a) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{f}{g} \in D\{a\}, \text{ és } \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

8. Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Legyen $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, Tegyük fel, hogy az a int $\mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor:

$$f \circ g \in D\{a\}, \text{ és } (f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

9. Mi az exp, sin, cos függvények derivált függvénye?

- $(e^x)' = e^x$
- $\sin' = \cos$
- $\cos' = -\sin$

3. Gyakorlat elméleti kérdései

1. Írja fel az exp, $\ln x$, sin, cos, tg, $a^x (a > 0, x \in \mathbb{R})$ függvények derivált függvényét.

- $(e^x)' = e^x$
- $\ln x' = \frac{1}{x}$
- $\sin' = \cos$
- $\cos' = -\sin$
- $\mathrm{tg}\ x' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $a^{x'} = a \cdot \ln a$

2. Adjon példát olyan függvényre, ami az $a \in \mathbb{R}$ pontban folytonos, de nem differenciálható!

Az abszolút érték függvény folytonos a 0 pontban, de nem differenciálható 0-ban.

3. Mi a jobb oldali derivált definíciója?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, a \in \mathcal{D}_f$ és tegyük fel hogy az f függvény jobbról deriválható (differenciálható), ha

$$\exists \quad \text{és véges a} \quad \lim_{x \to a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{határérték}$$

Ezt a határértéket nevezzük az f függvény a pontbeli jobb oldal deriváltjának és $f'_+(a)$-val jelöljük

4. Mi az érintő definíciója?

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor az

$$e_a f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad e_a f(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$$

egyenesest az f függvény a pontbeli érintőjének hívjuk .

5. Írja le az inverz függvény differenciálszámításáról szóló tételt!

Legyen $I \in \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

1. f szigorúan monoton és folytonos I-n,
2. f differenciálható az $a \in I$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az f^{-1} inverz függvény deriválható a $b := f(a)$ pontban, és

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

6. Milyen tételt hatványsor összegfüggvényének differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Tegyük fel, hogy a $\sum(\alpha_n(x-a)^n)$ $(x \in \mathbb{R})$ hatványsor R konvergenciasugara pozitív. Legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n \quad (x \in K_R(a))$$

a hatványsor összegfügevénye.
Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\alpha_n (x-a)^{n-1} \quad (\forall x \in K_R(a))$$

4. Gyakorlat elméleti kérdései

1. Milyen szükséges és elégséges feltételt ismer differenciálható függvény monoton növekedésével kapcsolatban?[1]

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel hogy $f : I \to \mathbb{R},\ f \in D(I)$
Ekkor:

$$f \nearrow \iff f' \geq 0.$$

Megjegyzés: az $f' \geq 0$ feltétel azt jelenti, hogy minden $x \in I$ pontban $f'(x) \geq 0$, aminek geometriai interpretációja az, hogy az érintő meredeksége minden pontban nem negatív.

2. Milyen elégséges feltételt ismer differenciálható függvény szigorú monoton növekedésével kapcsolatban?[1]

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel hogy $f : I \to \mathbb{R},\ f \in D(I)$
Ekkor:

$$f' > 0 \quad \Rightarrow \quad f \uparrow$$

Megjegyzés: Az állítás fordítottja nem igaz. Az $f(x) = x^3$ $(x \in \mathbb{R})$ függvény szigorúan monoton növekedő, de $f'(0) = 0$

3. Mit ért azon hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény valamely helyen lokális minimuma van?

Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban lokális minimuma van ha

$$\exists K(a), \quad \text{hogy} \quad \forall x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f \quad \text{esetén} \quad f(x) \geq f(a)$$

Ekkor az $a \in \mathcal{D}_f$ pontot az f lokális minimumhelyének nevezzük, $f(a)$ pedig az f lokális minimuma.

4. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel?

Tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban lokális szélsőértéke van és $f \in D\{a\}$
Ekkor:

$$f'(a) = 0$$

5. Adjon példát olyan $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényre, amelyre valamely $a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in D\{a\}, f'(a) = 0$ teljesül, de az f függvénynek az a pontjában nincs lokális szélsőértéke

$f(x) = x^3 \quad (x \in \mathbb{R})$ esetén $f'(x) = 3x^2$ derivált csak a 0 pontban 0 ami viszont egyértelműen nem lokális szélsőértékhely $x < 0$ esetén $x^3 < 0$ és $x > 0$ esetén $x^3 > 0$

[1] (Ha nem jó valaki javítson ki mert nem tudom ere mi lenne a pontos válasz)

6. Mit ért azon, hogy egy függvény valamely helyen jelet vált?

Azt mondjuk hogy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (-,+) előjelet vált ha $f(a) = 0$, és van olyan $\delta > 0$, hogy

$$f(x) < 0 \, (a - \delta < x < a), \quad f(x) > 0 \, (a < x < a + \delta)$$

A (+,-) jelváltás értelem szerűen definiálható

7. Hogyan szól a lokális maximumra vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, és a $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$.
Tegyük fel hogy $\exists \delta > 0$, amelyre $f \in D((a - \delta, a + \delta))$ és f' előjelet vált a-ban
Ekkor f-nek szigorú lokális szélsőértéke van az a-ban
$(+, -)$ jelváltás esetén maximum.
Megjegyzés: $(-, +)$ jelváltás esetén minimum,

8. Írja le a lokális minimumra vonatkozó másodrendű elégséges feltételt.

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$
Tegyük fel hogy:

1. $f \in D^2\{a\}$
2. $f'(a) = 0 \quad \text{és} \quad f''(a) \neq 0$

Ekkor az a pont a szigorú lokális szélsőértékhelye az f. függvénynek $f''(a) > 0$ esetén minimum
Megjegyzés: $f''(a) < 0$ esetén maximum

9. Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt!
Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Tegyük fel hogy

1. $f \in C[a, b]$
2. $f \in D(a, b)$

Ekkor:

$$\exists \varepsilon \in (a, b) \quad \text{hogy} \quad f'(\varepsilon) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

10. Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt!
Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Tegyük fel hogy

1. $f, g \in C[a, b]$
2. $f, g \in D(a, b)$
3. $g'(x) \neq 0 (x \in (a, b))$

Ekkor:

$$\exists \varepsilon \in (a, b), \quad \text{hogy} \quad \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

5. Gyakorlat elméleti kérdései

1. Definiálja az inflexiós pont fogalmát.
Legyen I nyílt intervallumon, $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, I \subset \mathcal{D}_f$
Azt mondjuk hogy az $a \in I$ pont az f függvénynek inflexiós pontja ha:

$$\exists \delta > 0 \; k_\delta(a) \subset I \text{ olyan hogy}$$
$$f \text{ konvex az } (a-\delta, a] \text{ intervallumon és}$$
$$\text{konkáv az } [a, a+\delta)\text{-n intervallumon vagy fordítva}$$

2. Mondja ki az inflexiós pont létezésére vonatkozó másodrendű szükséges feltételt.
Legye $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$
Ha $f \in C^2\{a\}$ és f-nek az a pontjában inflexiója van akkor $f''(a) = 0$

3. Mikor mondjuk, hogy egy függvénynek aszimptotája van a $+\infty$-ben?
Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$. Azt mondjuk hogy f-nek van aszimptotája $(+\infty)$-ben, ha:

$$\exists l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre:

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - l(x)) = 0$$

Ekkor az $l(x)$ $(x \in \mathbb{R})$ egyenes az f aszimptotája $(+\infty)$-ben

4. Hogyan szól a $(+\infty)$-beli aszimptota létezésére vonatkozó tétel?
Az $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$-ben, ha léteznek és végesek az alábbi határértékek:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \qquad \lim_{x \to +\infty} (f(x) - Ax) =: B \in \mathbb{R}$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

Egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$-ben

5. Írja le a jobboldali határérték $\frac{0}{0}$ esetére vonatkozó L'Hospital-szabályt.
Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f, g \in D(a, b)$. Tegyük fel hogy:

- $\exists \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0$
- $g(x) \neq 0$ és $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- $\exists \lim\limits_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$

Ekkor

$$\exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$$

6. Írja le a baloldali határérték $\frac{+\infty}{+\infty}$ esetére vonatkozó L'Hospital-szabályt.
Legyen $-\infty < a < b \leq +\infty$ és $f, g \in D(a,b)$ Tegyük fel hogy:

- $\exists \lim\limits_{a-0} f = \lim\limits_{a-0} g = +\infty$
- $g(x) \neq 0$ és $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a,b)$
- $\exists \lim\limits_{a-0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$

Ekkor

$$\exists \lim_{a-0} \frac{f}{g} \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad \lim_{a-0} \frac{f}{g} = \lim_{a-0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$$

6. Gyakorlat elméleti kérdései

7. Gyakorlat elméleti kérdései

1. Definiálja a primitív függvény fogalmát!

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon és $f : I \to \mathbb{R}$ egy adott függvény.
Azt mondjuk, hogy a $F : I \to \mathbb{R}$ függvény az f egy primitív függvénye ha,

$$F \in D(i) \text{ és } F'(x) = f(x) \quad (\forall x \in i)$$

2. Mit nevezünk egy függvény határozatlan integráljának?

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon és $f : I \to \mathbb{R}$
Az f függvény primitív függvényeinek halmazát az f határozatlan integráljának nevezzük.
Jelölések : $\int f, \int f(x)dx$

3. Mikor mondjuk, hogy egy függvény Darboux-tulajdonságú?

Legyen I nyílt intervallumon, $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad I \subset \mathcal{D}_f$

Azt mondjuk, hogy az f függvény Daroux-tulajdonságú az I intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I, a < b$ és bármely $f(a)$ és $f(b)$ közé eső c esetén van olyan $\varepsilon \in [a, b]$, hogy $f(\varepsilon) = c$

Megjegyzés: Ha $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos akkor f Daroux-tulajdonságú az I-n

4. Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás tétele?

Legyen I nyílt intervallum.

Tegyük fel, hogy $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik függvénye I-n
Ekkor az fg' függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx \quad (x \in I)$$

5. Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?

Legyenek adottak az I, J nyílt intervallumok és a $g : I \to \mathbb{R}, f : J \to \mathbb{R}$ függvények.

Tegyük fel hogy $g \in D(I), \mathcal{R}_g \subset J$ és az f függvénynek van primitív függvénye.
Ekkor az $(f \circ g) \cdot g'$ függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = F(g(x)) + C \quad (x \in I)$$

ahol F a f függvénynek egy primitív függvénye

6. Adja meg az alábbi függvények egy primitív függvényét:
exp, x^a $(x > 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$, sin, $\frac{1}{1+x^2}$ $(x \in \mathbb{R})$

- $f(x) = e^x, F(x) = e^x$
- $f(x) = x^a, F(x) = \frac{x^{a+1}}{a+1}$
- $f(x) = \sin x, F(x) = -\cos x$
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, F(x) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|$