

# GATE 2021 EE 43

EE23BTECH11022 - G DILIP REDDY

**Question:**

Consider a continuous-time signal  $x(t)$  defined by  $x(t) = 0$  for  $|t| > 1$ , and  $x(t) = 1 - |t|$  for  $|t| \leq 1$ . Let the Fourier transform of  $x(t)$  be defined as  $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ . The maximum magnitude of  $X(\omega)$  is \_\_\_\_\_ .  
(GATE 2021 EE 43)

**Solution:**

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \quad (1)$$

$$X(f) = \int_{-1}^1 (1 - |t|) e^{-j2\pi f t} dt \quad (2)$$

$$X(f) = \int_{-1}^1 e^{-j2\pi f t} dt - \int_{-1}^1 |t| e^{-j2\pi f t} dt \quad (3)$$

$$X(f) = 2 \int_0^1 \cos(2\pi f t) dt - 2 \int_0^1 t \cos(2\pi f t) dt \quad (4)$$

$$X(f) = 2 \frac{\sin(2\pi f)}{2\pi f} - 2 \left[ \frac{\sin(2\pi f)}{2\pi f} + \frac{\cos(2\pi f)}{(2\pi f)^2} - \frac{1}{(2\pi f)^2} \right] \quad (5)$$

$$X(f) = 2 \frac{1 - \cos(2\pi f)}{(2\pi f)^2} \quad (6)$$

$$X(f) = 2 \frac{2 \sin^2\left(\frac{2\pi f}{2}\right)}{(2\pi f)^2} \quad (7)$$

$$X(f) = \frac{\sin^2(\pi f)}{(\pi f)^2} \quad (8)$$

$$f \rightarrow 0 \implies X(f) \rightarrow 1 \quad (9)$$

Maximum of magnitude of  $X(f) = 1$




Fig. 1: plot of  $X(f)$