



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

Vigilancia de Eventos Adversos posteriores a la
vacunación contra el COVID-19 en Ecuador
Periodo de reporte

Ministerio de Salud Pública

ARCSA Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

DNVE Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

MSP Ministerio de Salud Pública

OPS Organización Panamericana de la Salud

Tabla de contenidos

1	Antecedentes	6
2	Desarrollo	7
3	Conclusiones	8
	Bibliografía	9

Lista de Figuras

Lista de Tablas

1.1	Tasa de reporte de ESAVI no grave y grave en la Región de las Américas . . .	6
-----	--	---

1 Antecedentes

El 31 de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en China, y el 7 de enero de 2020 se conoció por primera vez un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en humanos [1]. El primer caso de esta enfermedad en Ecuador fue reportado el 29 de febrero de 2020 [2].

El 21 de enero de 2021 inició el proceso de vacunación en el Ecuador. Al momento, en el Ecuador se aplican las vacunas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y la vacuna Cansino. Todas las vacunas fueron aprobadas por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ([ARCSA](#)) [2].

En la tabla se evidencia la tasa de reporte de ESAVI NO GRAVE Y ESAVI GRAVE en la Región de las Américas, las cuales son reportadas a la Organización Mundial de la Salud.

Tabla 1.1: Tasa de reporte de ESAVI no grave y grave en la Región de las Américas

Vacunas	Ecuador		Chile		Colombia		Canadá	
	G_Ec	NG_Ec	G_Ch	NG_Ch	G_C	NG_C	G_Cd	NG_Cd
Pfizer	6,8	36,8	122,8	36,2	0,0	29,2	46,2	NA
Sinovac	0,2	1,6	3,4	11,4	0,6	1,8	2,6	NA

2 Desarrollo

En el período comprendido del 01 de enero del 2022 al 07 de mayo del 2022, Los signos y síntomas que se presentan en los casos que se reportan como ESAVI NO GRAVE con mayor frecuencia son fiebre, cefalea, malestar general, dolor en el sitio de la punción, mialgia, artralgia, náusea, diarrea, escalofrío, vómito.

3 Conclusiones

1. Las tasas reportadas de los ESAVI GRAVES, están dentro lo esperable, son similares en otros países de la región y corresponde al reporte de la región de las Américas. El reporte de los ESAVI está dentro de los parámetros, en otros lugares de las Américas no hay señales de alarma con respecto a la seguridad de las vacunas.
2. La tasa de reporte de ESAVI GRAVE por tipo de vacuna es similar en los cuatro grupos, encontrándose dentro del rango de la ficha técnica del fabricante.
3. Actualizado

Bibliografía

- [1] SALUD, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA: *Marco de valores del SAGE de laOMS para la asignación y priorización de la vacunación contrala COVID-19* : OMS, 2014
- [2] [Se registra el primer caso de coronavirus en Ecuador – Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.](#)